Unité mixte de recherche en santé n° 1136 (UMR-S 1136)
Directeur : Pr Fabrice Carrat

https://anrs-co4.fhdh.fr

https://aquivih-na.fr

Indicateurs de prise en charge des PVVIH dans les CoReSS en France en 2024

25/09/2026

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 4
METHODE 5
REFUS DE CONSENTEMENT 8
Répartition géographique des hôpitaux qui participent aux cohortes ANRS CO3-AquiVIH-NA et ANRS CO4-FHDH en 2024 9
EFFECTIFS 10
Nouveaux patients par années 11
Patients suivis par années 12
Carte des files actives par CoReSS en 2024 13
1. France 14
2. ÎLE-DE-FRANCE 25
3. CORESS ARC ALPIN 36
4. CORESS AUVERGNE-LOIRE 46
5. CORESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 57
6. CORESS BRETAGNE 67
7. CORESS CENTRE-VAL DE LOIRE 77
8. CORESS GRAND EST 88
9. CORESS GUADELOUPE 99
10. CORESS GUYANE 109
11. CORESS HAUTS-DE-FRANCE 120
12. CORESS ÎLE-DE-FRANCE CENTRE ESSONNE 131
13. CORESS ÎLE-DE-FRANCE EST 142
14. CORESS ÎLE-DE-FRANCE NORD OUEST 153
15. CORESS ÎLE-DE-FRANCE SUD 164
16. CORESS LYON – VALLÉE DU RHÔNE 175
17. CORESS MARTINIQUE 186
18. CORESS MAYOTTE 196
19. CORESS NORMANDIE 203
20. CORESS NOUVELLE-AQUITAINE 214
21. CORESS OCCITANIE 225
22. CORESS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 240
23. CORESS PAYS DE LA LOIRE 251
24. CORESS REUNION 261
LISTE DES CENTRES ET FILE ACTIVE PAR CoReSS ET COREVIH 271
Répartition des files actives selon les hôpitaux en 2024 282

ANNEXE _____ *283*
Diagramme de flux : processus de traitement _____ *283*
Synthèse des traitements de données _____ *284*

REMERCIEMENTS

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l'obtention des données en particulier les personnes vivant avec le VIH acceptant d'être suivies dans une cohorte, les techniciens d'études cliniques contribuant à la collecte des données et les cliniciens prenant en charge les PVVIH et participant activement aux inclusions et au suivi des cohortes ANRS CO4-FHDH et ANRS CO3-AquiVIH-NA.

METHODE

DONNEES ANALYSEES :

Le rapport a été réalisé à partir des données combinant les deux cohortes hospitalières ANRS CO4-FHDH et ANRS CO3-AquiVIH-NA. Cette mise en commun permet une analyse homogène avec une méthodologie commune des données des PVVIH (personnes vivant avec le VIH) prises en charge annuellement entre 2020 et 2024 dans tous les CoReSS. Les données sont présentées à l'échelle nationale, ainsi que séparément pour chaque CoReSS et pour l'Ile-de-France

Seules les PVVIH adultes de 18 ans ou plus au 1er janvier de l'année du 1er suivi ont été incluses dans les analyses. Les PVVIH sont décrites selon trois groupes : les personnes nouvellement prises en charge, les personnes nouvellement prises en charge à un stade avancé de l'infection VIH défini par « CD4<200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection », et les PVVIH suivies au cours de l'année considérée.

Les effectifs par CoReSS décrits dans ce rapport peuvent différés des effectifs transmis par chaque CoReSS en raison des doublons et des contrôles de cohérence (voir annexe à la fin du rapport).

Nouveautés du rapport :

Les données sont présentées par CoReSS (et non plus par COREVIH) afin de tenir compte du nouveau découpage des centres intervenu par la réforme des CoReSS, décret n°2024-670 du 3 juillet 2024 relatif à la coordination de la santé sexuelle qui a remplacé les COREVIH par les CoReSS, à compter du 15 mars 2025. Les données historiques ont été affectées rétrospectivement au nouveau découpage. Les données du CoReSS Corse n'apparaissent pas car la transmission des données n'a pas encore été mise en place dans ce CoReSS.

Les tableaux présentent désormais un descriptif du pays de naissance séparément chez les hommes cis et les femmes cis.

Cas particulier de certains centres :

- *Centres de Nouvelle Aquitaine : doublon entre la cohorte ANRS CO4-FHDH et la cohorte ANRS CO3-AquiVIH-NA :*

  La cohorte ANRS CO3-AquiVIH-NA a progressivement intégré les données de 7 hôpitaux du CoReSS Nouvelle Aquitaine qui auparavant étaient transmises exclusivement à la cohorte ANRS CO4-FHDH. Afin de ne pas comptabiliser deux fois les personnes prises en charge, les règles suivantes ont été appliquées :

  - Pour les centres hospitaliers de Poitiers, Angoulême, Saintes, Jonzac et St-Jean d'Angely, seuls les recours enregistrés dans ANRS CO4-FHDH ont été pris en compte pour 2020, tandis que ceux enregistrés dans ANRS CO3-AquiVIH-NA ont été retenus pour les années 2021 à 2024.
  - Pour les centres hospitaliers de Royan et de Châtellerault, seuls les recours enregistrés dans ANRS CO4-FHDH ont été pris en compte pour les années 2020 et, 2021, tandis que ceux enregistrés dans ANRS CO3-AquiVIH-NA ont été retenus à partir de 2022.

Critères d'inclusion dans les cohortes :

- Être infecté par le VIH-1 (ANRS C04 FHDH et ANRS CO3 Aquivih-NA) ou par le VIH-2 (ANRS CO4 FHDH) ;
- Être suivi dans un centre participant à l'une des deux cohortes ;
- Avoir signé un consentement.

Critères de sélection et définitions :

Patients suivis :

- Avoir au moins un recours l'année de suivi ;
- Avoir 18 ans ou plus au 1er janvier de l'année de suivi ;
- Avoir au moins un recours postérieur à l'inclusion ou une date de décès renseignée.

Patients naïfs à l'inclusion :

- Patients dont l'infection VIH a été diagnostiquée moins de 3 mois avant l'inclusion ou dont le diagnostic a été fait après l'inclusion, n'ayant pas été traités ou traités après le diagnostic VIH.
- Les patients ne satisfaisant pas ce premier critère sont considérés naïfs à l'inclusion si l'initiation du 1er traitement antirétroviral (ARV) est strictement postérieure à l'inclusion ou si aucun traitement n'est renseigné.
- Les patients qui initient un traitement ARV à l'inclusion sont naïfs à l'inclusion si la charge virale mesurée à ± 15 jours de l'inclusion n'est pas contrôlée (CV <50 copies/mL).

Nouvelles PVVIH prises en charge (et jamais prises en charge ailleurs antérieurement) :

Les personnes nouvellement prises en charge sont les personnes naïves à l'inclusion, sans antécédent de SIDA, ou SIDA depuis moins de 3 mois avant l'inclusion, pour lesquelles aucune mesure de charge virale n'était disponible plus de 3 mois avant l'inclusion.

Nouvelles PVVIH prises en charge à un stade avancé de l'infection VIH :

Les personnes nouvellement prises en charge à un stade avancé de l'infection VIH qui est défini par « CD4<200/mm^3 ou SIDA et en l'absence de primo-infection ».

ANALYSES STATISTIQUES :

Les pourcentages sont calculés sur les données disponibles (hors données manquantes). Le dénominateur peut ainsi varier selon les variables décrites.

Pour les personnes nouvellement prises en charge, les délais entre la prise en charge et l'initiation d'un traitement ARV et entre l'initiation des traitements ARV et l'obtention d'une charge virale indétectable (CV<50 copies/mL) ont été estimés par la méthode de Kaplan Meier.

- Le délai entre la première prise en charge et l'initiation d'un traitement ARV a été calculé comme la différence entre la date de prise en charge et la date d'initiation du 1er traitement ARV ou la date de la dernière CV renseignée pour les personnes qui n'avaient pas initié de traitement (censure). Les probabilités cumulées d'initiation du traitement dans les 7 jours, entre 8-30 jours, entre 1-3 mois et après 3 mois de leur prise en charge suivants ont été estimés par la méthode de Kaplan Meier.
- Le délai entre l'initiation du 1er traitement ARV et l'obtention d'une CV indétectable (<50 copies/mL) a été calculé comme la différence entre la date d'initiation du 1er traitement ARV et la date de 1ère CV <50 copies/mL ou la date de la dernière CV

renseignée pour les personnes n'ayant pas obtenu une CV <50 copies/mL (censure). Les probabilités cumulées d'obtention d'une charge virale <50 copies/mL après avoir initié un traitement ARV ont été estimées par la méthode de Kaplan-Meier aux périodes suivantes ≤ 3 mois, entre 3-6 mois, 6-9 mois, 9-12 mois et après 12 mois. De même, la probabilité d'obtenir une CV <50 copie/mL dans les 6 mois suivant l'initiation du traitement a été estimée selon la CV à l'initiation du traitement (<100 000, 100 000-500 000 ou >=500 000 copies/mL).

Le rapport est téléchargeable à l'adresse https://anrs-co4.fhdh.fr/rapports-des-indicateurs-de-prise-en-charge-des-pvvih-dans-les-corevih-en-france/

REFUS DE CONSENTEMENT

Données sur le refus de consentement analysées :


Au 10 avril 2026, 3119 personnes ont refusé leur consentement de participation dans la cohorte hospitalière ANRS CO4-FHDH. Parmi ces 3119 personnes, 1543 personnes avaient refusé leur consentement dès l'inclusion, et 1576 personnes ont retiré leur consentement a posteriori.

Le tableau ci-dessous présente les effectifs de refus de consentement par COREVIH et non par CoReSS car les données étaient souvent transmises agrégées par Corevih.

Répartition géographique des COREVIH des sujets ayant retiré leur consentement (n=3119)

	Refus immédiat N=1543		Refus a posteriori N=1576		Total N=3119	
	n	%	n	%	n	%
COREVIH						
ARC ALPIN	0	0.0	1	0.1	1	0.0
AUVERGNE LOIRE	88	5.7	86	5.5	174	5.6
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	0	0.0	18	1.1	18	0.6
GRAND EST	316	20.5	149	9.5	465	14.9
GUADELOUPE	17	1.1	23	1.5	40	1.3
GUYANE	317	20.5	119	7.6	436	14.0
HAUTS DE FRANCE	18	1.2	28	1.8	46	1.5
ILE-DE-FRANCE-CENTRE	82	5.3	428	27.2	510	16.4
ILE-DE-FRANCE-EST	0	0.0	1	0.1	1	0.0
ILE-DE-FRANCE-NORD	94	6.1	43	2.7	137	4.4
ILE-DE-FRANCE-OUEST	4	0.3	59	3.7	63	2.0
ILE-DE-FRANCE-SUD	290	18.8	269	17.1	559	17.9
LYON VALLEE DU RHONE	85	5.5	72	4.6	157	5.0
NORMANDIE	19	1.2	17	1.1	36	1.2
NOUVELLE AQUITAINE	29	1.9	142	9.0	171	5.5
OCCITANIE	140	9.1	32	2.0	172	5.5
OCEAN INDIEN	12	0.8	3	0.2	15	0.5
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR	32	2.1	85	5.4	117	3.8

Répartition géographique des hôpitaux qui participent aux cohortes ANRS CO3-AquiVIH-NA et ANRS CO4-FHDH en 2024



EFFECTIFS

Les personnes analysées ont été suivies dans **194 hôpitaux en 2020**, **194 en 2021, 192 en 2022**, **188 en 2023, et 188 en 2024**. En 2022, deux hôpitaux étaient sans file active renseignée. Six hôpitaux étaient sans file active renseignée en 2023 et 2024. Le tableau suivant indique la file active de ces six hôpitaux par année :

Hôpitaux sans file active soit en 2020, et/ou 2021, et/ou 2022, et/ou 2023, et/ou 2024	2020	2021	2022	2023	2024
Belfort (Bourgogne Franche Comté)	218	209	201	-	-
Macon (Bourgogne Franche Comté)	113	114	-	-	-
Vesoul (Bourgogne Franche Comté)	22	18	11	-	-
Montélimar (Lyon Vallée du Rhône)	8	16	15	-	-
Médipôle Lyon Villeurbanne (Lyon Vallée du Rhône)	22	20	21	-	-
Bron (Lyon Vallée du Rhône)	29	20	-	-	-


Nouveaux patients par années

	2020	2021	2022	2023	2024	Variation 2020-2024		Variation 2021-2024		Variation 2022-2024		Variation 2023-2024	
						Effectif	Relative	Effectif	Relative	Effectif	Relative	Effectif	Relative
FRANCE	**2392**	**2263**	**2481**	**2766**	**2447**	**55**	**2,3%**	**184**	**8,1%**	**-34**	**-1,4%**	**-319**	**-11,5%**
ÎLE-DE-FRANCE	970	914	950	999	892	-78	-8,0%	-22	-2,4%	-58	-6,1%	-107	-10,7%
CORESS ARC ALPIN	76	47	61	78	62	-14	-18,4%	15	31,9%	1	1,6%	-16	-20,5%
CORESS AUVERGNE-LOIRE	46	57	57	77	49	3	6,5%	-8	-14,0%	-8	-14,0%	-28	-36,4%
CORESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	19	28	34	55	33	14	73,7%	5	17,9%	-1	-2,9%	-22	-40,0%
CORESS BRETAGNE	72	59	85	99	116	44	61,1%	57	96,6%	31	36,5%	17	17,2%
CORESS CENTRE-VAL DE LOIRE	75	67	87	124	88	13	17,3%	21	31,3%	1	1,1%	-36	-29,0%
CORESS GRAND EST	127	130	132	149	178	51	40,2%	48	36,9%	46	34,8%	29	19,5%
CORESS GUADELOUPE	66	66	71	60	46	-20	-30,3%	-20	-30,3%	-25	-35,2%	-14	-23,3%
CORESS GUYANE	86	111	97	86	98	12	14,0%	-13	-11,7%	1	1,0%	12	14,0%
CORESS HAUTS-DE-FRANCE	108	106	114	141	141	33	30,6%	35	33,0%	27	23,7%	0	0,0%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE CENTRE ESSONNE	219	182	193	241	209	-10	-4,6%	27	14,8%	16	8,3%	-32	-13,3%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE EST	250	276	282	314	241	-9	-3,6%	-35	-12,7%	-41	-14,5%	-73	-23,2%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE NORD OUEST	315	273	283	288	267	-48	-15,2%	-6	-2,2%	-16	-5,7%	-21	-7,3%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE SUD	199	193	200	168	186	-13	-6,5%	-7	-3,6%	-14	-7,0%	18	10,7%
CORESS LYON – VALLÉE DU RHÔNE	99	104	108	107	70	-29	-29,3%	-34	-32,7%	-38	-35,2%	-37	-34,6%
CORESS MARTINIQUE	29	24	26	40	32	3	10,3%	8	33,3%	6	23,1%	-8	-20,0%
CORESS MAYOTTE	31	43	77	86	70	39	125,8%	27	62,8%	-7	-9,1%	-16	-18,6%
CORESS NORMANDIE	57	58	87	85	75	17	29,3%	17	29,3%	-12	-13,8%	-10	-11,8%
CORESS NOUVELLE AQUITAINE	83	37	48	64	52	-31	-37,3%	15	40,5%	4	8,3%	-12	-18,8%
CORESS OCCITANIE	170	158	178	189	165	-5	-2,9%	7	4,4%	-13	-7,3%	-24	-12,7%
CORESS PACA	179	163	177	218	175	-4	-2,2%	12	7,4%	-2	-1,1%	-43	-19,7%
CORESS PAYS DE LA LOIRE	98	81	80	93	85	-13	-13,3%	4	4,9%	5	6,3%	-8	-8,6%
CORESS REUNION	25	29	36	46	55	30	120,0%	26	89,7%	19	52,8%	9	19,6%

Patients suivis par années

	2020	2021	2022	2023	2024	Variation 2020-2024		Variation 2021-2024		Variation 2022-2024		Variation 2023-2024	
						Effectif	Relative	Effectif	Relative	Effectif	Relative	Effectif	Relative
FRANCE	**112054**	**113257**	**114105**	**115932**	**115970**	**3916**	**3,5%**	**2713**	**2,4%**	**1865**	**1,6%**	**38**	**0,0%**
ÎLE-DE-FRANCE	46 163	46 010	45 922	46 227	45 994	-169	-0,4%	-16	0,0%	72	0,2%	-233	-0,5%
CORESS ARC ALPIN	3002	3026	3038	3056	3078	76	2,5%	52	1,7%	40	1,3%	22	0,7%
CORESS AUVERGNE-LOIRE	2073	2140	2199	2306	2308	235	11,3%	168	7,9%	109	5,0%	2	0,1%
CORESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	1921	1949	1842	1679	1726	-195	-10,2%	-223	-11,4%	-116	-6,3%	47	2,7%
CORESS BRETAGNE	3556	3603	3761	3863	4022	466	13,1%	419	11,6%	261	6,9%	159	4,0%
CORESS CENTRE-VAL DE LOIRE	2918	3133	3296	3433	3490	572	19,6%	357	11,4%	194	5,9%	57	1,6%
CORESS GRAND EST	5101	5176	5264	5427	5727	626	12,3%	551	10,6%	463	8,8%	300	5,2%
CORESS GUADELOUPE	1835	1824	1896	1966	1969	134	7,3%	145	7,9%	73	3,9%	3	0,2%
CORESS GUYANE	1646	1852	1902	1967	2051	405	24,6%	199	10,7%	149	7,8%	84	4,1%
CORESS HAUTS-DE-FRANCE	3741	3827	3935	4061	4160	419	11,2%	333	8,7%	225	5,7%	99	2,4%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE CENTRE ESSONNE	11228	11255	11256	11366	11113	-115	-1,0%	-142	-1,3%	-143	-1,3%	-253	-2,3%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE EST	9928	9990	10163	10422	10495	567	5,7%	505	5,1%	332	3,3%	73	0,7%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE NORD OUEST	14526	14354	14280	14383	14390	-136	-0,9%	36	0,3%	110	0,8%	7	0,0%
CORESS ÎLE-DE-FRANCE SUD	10858	10708	10565	10298	10205	-653	-6,0%	-503	-4,7%	-360	-3,4%	-93	-0,9%
CORESS LYON – VALLÉE DU RHÔNE	5162	5150	5188	5031	5019	-143	-2,8%	-131	-2,5%	-169	-3,3%	-12	-0,2%
CORESS MARTINIQUE	1072	1079	1053	1083	1068	-4	-0,4%	-11	-1,0%	15	1,4%	-15	-1,4%
CORESS MAYOTTE	296	323	392	473	500	204	68,9%	177	54,8%	108	27,6%	27	5,4%
CORESS NORMANDIE	2742	2782	2874	2943	2900	158	5,8%	118	4,2%	26	0,9%	-43	-1,5%
CORESS NOUVELLE AQUITAINE	7957	7958	7909	8082	7640	-317	-4,0%	-318	-4,0%	-269	-3,4%	-442	-5,8%
CORESS OCCITANIE	8681	8888	9042	9219	9201	520	6,0%	313	3,5%	159	1,8%	-18	-0,2%
CORESS PACA	9170	9431	9438	9741	9647	477	5,2%	216	2,3%	209	2,2%	-94	-1,0%
CORESS PAYS DE LA LOIRE	4662	4755	4844	4939	4985	323	6,9%	230	4,8%	141	2,9%	46	0,9%
CORESS REUNION	1001	1007	1026	1071	1103	102	10,2%	96	9,5%	77	7,5%	32	2,9%

Carte des files actives par CoReSS en 2024



1. France

1.1 Tableau des nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	2 392	2 263	2 481	2 766	2 447
Age					
Médiane	37,1	37,0	36,6	36,3	37,2
q_{25} - q_{75}	28,8 - 47,8	28,5 - 47,6	28,8 - 48,0	28,2 - 48,0	29,3 - 48,3
≥ 60 ans	7,6%	8,1%	8,9%	8,0%	8,8%
≥ 75 ans	0,5%	0,8%	0,6%	0,5%	0,8%
Genre					
Homme cis	67,5%	68,3%	66,3%	63,5%	66,9%
Femme cis	31,1%	30,1%	31,9%	34,5%	31,2%
Transgenre	1,5%	1,6%	1,9%	2,0%	1,9%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	39,8%	40,8%	35,0%	34,4%	36,5%
Femme cis France	6,7%	6,4%	5,5%	6,0%	6,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	12,9%	12,6%	14,6%	15,0%	14,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	19,1%	17,2%	19,6%	23,4%	20,2%
Homme cis Autres pays	14,8%	15,0%	16,7%	14,1%	15,7%
Femme cis Autres pays	5,3%	6,5%	6,8%	5,2%	4,9%
Autres	1,5%	1,6%	1,9%	2,0%	1,9%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	59,0%	59,7%	52,9%	54,2%	54,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	19,1%	18,4%	22,0%	23,6%	22,0%
Homme cis Autres pays	21,9%	21,9%	25,2%	22,3%	23,4%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	21,5%	21,3%	17,3%	17,4%	19,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	61,4%	57,1%	61,4%	67,6%	64,9%
Femme cis Autres pays	17,1%	21,6%	21,2%	15,0%	15,6%
Groupe d'acquisition					
HSH	40,4%	41,8%	38,5%	36,3%	38,7%
UDI	1,3%	0,9%	1,0%	1,2%	0,9%
Hétérosexuel	49,5%	48,7%	50,4%	50,0%	46,6%
Hémophilie/Transfusion	0,4%	0,1%	0,2%	0,4%	0,2%
Périnatal	0,1%	0,5%	0,3%	0,3%	0,5%
Autre ou inconnu	8,4%	8,0%	9,6%	11,7%	13,1%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	14,6%	14,5%	13,1%	12,9%	14,1%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	25,1%	23,6%	26,8%	29,2%	24,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,4%	2,3%	2,0%	1,7%	2,3%
Hétérosexuel Autres pays	8,4%	8,3%	8,5%	6,3%	5,4%
HSH France	28,0%	29,4%	23,7%	22,9%	23,8%

HSH Afrique subsaharienne	3,6%	3,3%	4,4%	4,5%	4,9%
HSH Afrique du Nord	2,0%	1,9%	2,5%	2,4%	2,7%
HSH Autre pays	6,9%	7,2%	7,7%	6,5%	7,2%
Autre France	4,3%	3,8%	4,1%	5,1%	5,2%
Autre Afrique subsaharienne	3,3%	2,8%	3,0%	4,7%	5,3%
Autre Afrique du Nord	0,4%	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%
Autre Autres pays	2,2%	2,6%	3,4%	3,2%	3,7%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	25,8%	22,8%	20,8%	17,1%	19,2%
Médiane	2018	2019	2021	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2012-2019	2012 -2021	2015 -2022	2017 -2023	2017 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	43,9%	44,8%	45,7%	45,4%	47,1%
Médiane	23,0	23,4	23,5	23,5	23,5
q_{25} - q_{75}	20,6 - 26,1	20,8 - 26,6	20,8 - 26,6	21,0 - 26,8	20,9 - 26,3
Maigre (<18.5)	9,8%	7,3%	8,5%	8,2%	8,5%
Normal [18.5-25[	57,5%	57,6%	56,4%	56,3%	57,2%
Surpoids [25-30[	23,4%	23,2%	24,5%	22,8%	22,7%
Obèse (≥ 30)	9,3%	11,9%	10,6%	12,7%	11,6%
Statut fumeur					
Inconnu	52,1%	52,2%	53,4%	54,2%	57,5%
Non-fumeur	27,1%	25,7%	27,7%	31,8%	29,7%
Ex-fumeur	40,5%	44,3%	41,5%	39,3%	39,6%
Fumeur actuel	32,4%	30,0%	30,9%	28,9%	30,7%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	7,6%	4,3%	6,2%	7,1%	5,3%
Médiane	15,0	10,0	7,0	10,0	10,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	10,4%	9,2%	9,0%	8,6%	8,6%
Stade SIDA	12,5%	13,8%	12,1%	11,4%	9,9%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	18,1%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	17,4%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	13,7%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	7,0%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	7,0%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	5,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	16,9%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	15,7%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	14,7%	–	–	–

Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	7,4%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	6,4%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	6,1%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	16,4%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	13,4%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	11,4%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	9,4%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	7,7%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	5,7%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	23,2%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	14,9%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	14,3%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	7,6%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	7,0%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	5,4%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	24,5%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	14,5%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	10,4%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	5,8%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	5,8%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	5,8%
Ag HBs +	4,2%	2,9%	3,9%	3,9%	2,6%
Ac VHC +	3,4%	2,5%	3,0%	2,4%	2,4%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,5%	0,1%	0,3%	1,8%	1,1%
0 jour	24,4%	24,8%	26,3%	24,4%	24,9%
1 - 7 jours	28,5%	27,4%	27,6%	30,1%	29,2%
8 - 15 jours	17,7%	19,3%	17,2%	18,5%	18,8%
16 - 30 jours	10,8%	11,6%	10,3%	10,5%	10,3%
1 - 3 mois	7,4%	7,0%	7,4%	6,0%	6,4%
> 3 mois	11,2%	9,9%	11,2%	10,5%	10,4%
Statut à la prise en charge					
Manquant	5,6%	5,9%	6,7%	7,9%	6,5%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	33,1%	33,0%	33,2%	34,9%	34,6%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	16,1%	17,1%	17,0%	16,6%	18,8%

200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	18,8%	18,6%	19,7%	20,1%	19,0%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	32,0%	31,3%	30,0%	28,4%	27,7%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	6,9%	7,0%	8,3%	9,6%	7,9%
Médiane	330	335	345	350	360
q_{25} - q_{75}	159 - 520	166 - 520	175 - 540	181 - 546	190 - 543
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	14,3%	14,2%	16,0%	17,2%	15,3%
%	10,9%	11,2%	11,6%	11,2%	11,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	2,3%	1,2%	2,1%	2,6%	3,3%
Médiane	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
q_{25} - q_{75}	3,9- 5,5	3,7- 5,5	3,6- 5,5	3,7- 5,5	3,7- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	15,5%	13,4%	9,9%	7,6%	5,7%
%	0,2%	0,3%	0,2%	0,7%	0,4%
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	15,6%	13,6%	10,0%	8,2%	6,2%
%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%
Traitement ARV initié	97,4%	97,5%	97,1%	96,6%	95,3%
Type de traitement					
Monothérapie	0,4%	0,1%	0,3%	0,3%	0,1%
Bithérapie	5,3%	8,0%	5,5%	5,0%	6,6%
Trithérapie	91,4%	89,4%	92,4%	93,0%	91,6%
Plus de 3 ARVs	1,9%	1,7%	1,3%	1,0%	1,1%
Inconnu	1,0%	0,8%	0,5%	0,6%	0,6%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	45,7%	45,1%	50,4%	55,8%	56,2%
8 - 30 jours	37,9%	39,4%	35,0%	32,3%	33,8%
1 - 3 mois	11,3%	11,1%	10,3%	8,2%	7,2%
> 3 mois	5,2%	4,4%	4,3%	3,7%	2,8%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	55,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	14,4%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	6,9%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	3,2%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	3,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	2,6%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	1,5%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	1,0%	–	–	–	–

Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	59,4%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	9,4%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,2%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	6,7%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	3,4%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	2,4%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	2,4%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,5%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	1,3%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,1%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	65,1%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	7,9%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	7,2%	–	–
3TC/DTG	–	–	4,9%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	3,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,5%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	2,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	1,5%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,1%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	0,8%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	70,6%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	8,9%	–
3TC/DTG	–	–	–	4,3%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	3,8%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	2,9%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,3%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,9%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,0%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	0,9%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	0,6%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	72,1%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	9,4%
3TC/DTG	–	–	–	–	6,2%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	3,2%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	2,0%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,9%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	1,0%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	0,8%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	0,8%

EFV/FTC/TDF	–	–	–	–	0,3%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	53,7%	55,6%	56,2%	59,0%	67,9%
3 - 6 mois	22,2%	22,6%	21,0%	21,8%	21,5%
6 - 9 mois	10,1%	8,9%	9,7%	8,3%	7,4%
9 - 12 mois	4,6%	4,1%	4,6%	4,4%	3,3%
> 12 mois	9,5%	8,9%	8,4%	6,4%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	75,9%	78,1%	77,2%	80,8%	89,3%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	87,1%	90,6%	89,7%	89,8%	96,8%
[100 000 - 500 000[copies/ml	72,7%	74,7%	72,5%	78,5%	87,0%
≥500 000 copies/ml	52,9%	52,6%	55,9%	60,8%	70,8%

1.2 Tableau des nouveaux patients avec prise en charge avancée (CD4<200 ou SIDA) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	721	666	695	724	633
Age					
Médiane	43,0	42,6	41,4	42,1	41,3
q_{25} - q_{75}	33,8 - 52,4	33,8 - 53,9	34,2 - 53,0	32,8 - 51,9	33,4 - 51,7
≥ 60 ans	11,2%	13,4%	14,7%	11,5%	12,5%
≥ 75 ans	0,8%	1,8%	1,4%	0,1%	1,1%
Genre					
Homme cis	66,7%	67,7%	66,5%	61,9%	62,9%
Femme cis	33,2%	31,5%	32,5%	36,9%	36,0%
Transgenre	0,1%	0,8%	1,0%	1,2%	1,1%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	34,5%	33,8%	30,5%	29,6%	29,2%
Femme cis France	5,7%	5,9%	5,6%	5,3%	6,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	15,5%	17,6%	17,7%	18,5%	17,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	20,4%	20,6%	19,1%	25,0%	23,4%
Homme cis Autres pays	16,6%	16,4%	18,3%	13,8%	16,3%
Femme cis Autres pays	7,1%	5,1%	7,8%	6,6%	6,2%
Autres	0,1%	0,8%	1,0%	1,2%	1,1%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	51,8%	49,9%	45,9%	47,8%	46,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	23,3%	25,9%	26,6%	29,9%	27,6%
Homme cis Autres pays	25,0%	24,2%	27,5%	22,3%	25,9%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	17,2%	18,6%	17,3%	14,2%	18,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	61,5%	65,2%	58,9%	67,8%	64,9%
Femme cis Autres pays	21,3%	16,2%	23,9%	18,0%	17,1%

Groupe d'acquisition					
HSH	25,4%	27,9%	25,3%	25,3%	23,5%
UDI	2,1%	0,6%	1,6%	1,8%	1,3%
Hétérosexuel	58,4%	59,0%	59,3%	58,4%	55,6%
Hémophilie/Transfusion	0,7%	0,2%	0,1%	0,4%	0,2%
Périnatal	0,3%	1,4%	0,3%	0,6%	0,2%
Autre ou inconnu	13,2%	11,0%	13,4%	13,5%	19,3%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	27,8%	26,3%	15,9%	19,2%	19,3%
Médiane	2018	2018	2021	2022	2022
q_{25} - q_{75}	2012 - 2019	2010 -2021	2015 -2022	2015 -2023	2017 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	44,8%	41,9%	44,3%	44,2%	49,0%
Médiane	22,3	22,3	22,1	22,1	22,3
q_{25} - q_{75}	19,6 - 25,5	19,9 - 25,4	19,4 - 25,3	19,7 - 25,4	19,5 - 24,8
Maigre (<18.5)	16,1%	11,1%	18,4%	16,8%	14,9%
Normal [18.5-25[	56,3%	62,0%	55,6%	56,2%	61,6%
Surpoids [25-30[	21,6%	19,4%	17,8%	19,1%	14,9%
Obèse (≥ 30)	6,0%	7,5%	8,3%	7,9%	8,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3%	1,3%
0 jour	34,0%	34,1%	34,2%	32,3%	30,7%
1 - 7 jours	25,8%	28,1%	26,6%	31,0%	25,9%
8 - 15 jours	13,9%	15,2%	14,5%	13,3%	17,0%
16 - 30 jours	8,2%	7,8%	7,9%	7,1%	8,3%
1 - 3 mois	6,5%	6,6%	6,0%	5,8%	6,7%
> 3 mois	11,7%	8,3%	10,7%	10,5%	11,4%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,0%	0,5%	1,2%	1,0%	2,1%
Médiane	5,3	5,4	5,4	5,4	5,3
q_{25} - q_{75}	4,8- 5,9	4,8- 6,0	4,6- 6,0	4,8- 5,9	4,7- 5,9
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	39,2%	41,9%	41,7%	43,4%	52,9%
3 - 6 mois	26,4%	27,2%	24,9%	27,8%	26,6%
6 - 9 mois	14,4%	11,8%	12,5%	12,0%	12,8%
9 - 12 mois	6,1%	6,6%	7,3%	5,7%	7,7%
> 12 mois	14,0%	12,6%	13,5%	11,1%	0,0%

1.3 Tableau des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	112 054	113 257	114 105	115 932	115 970
Age					
Médiane	52,5	53,1	53,6	54,1	54,8
q_{25} - q_{75}	43,1 - 59,8	43,6 - 60,6	43,9 - 61,2	44,2 - 61,9	44,6 - 62,6
≥ 60 ans	24,5%	26,6%	28,7%	31,0%	33,3%
≥ 75 ans	2,9%	3,2%	3,6%	4,1%	4,5%
Genre					
Homme cis	64,3%	64,1%	64,1%	63,8%	63,6%
Femme cis	34,8%	34,9%	34,9%	35,2%	35,4%
Transgenre	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	45,2%	45,1%	44,5%	44,0%	43,4%
Femme cis France	12,1%	12,1%	11,9%	11,7%	11,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	9,3%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	17,6%	17,7%	17,8%	18,2%	18,6%
Homme cis Autres pays	9,7%	9,9%	10,2%	10,2%	10,4%
Femme cis Autres pays	5,1%	5,2%	5,3%	5,3%	5,3%
Autres	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	70,4%	70,3%	69,4%	68,9%	68,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	14,5%	14,4%	14,6%	15,0%	15,4%
Homme cis Autres pays	15,1%	15,4%	15,9%	16,1%	16,3%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	34,9%	34,6%	34,0%	33,2%	32,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	50,5%	50,6%	51,0%	51,8%	52,5%
Femme cis Autres pays	14,7%	14,8%	15,0%	15,0%	15,0%
Groupe d'acquisition					
HSH	36,9%	37,2%	37,3%	37,2%	37,2%
UDI	6,4%	6,1%	5,8%	5,6%	5,4%
Hétérosexuel	49,9%	49,7%	49,6%	49,7%	49,8%
Hémophilie/Transfusion	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%
Périnatal	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%
Autre ou inconnu	4,4%	4,5%	4,8%	4,9%	5,2%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	18,4%	18,3%	18,0%	17,8%	17,5%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	23,5%	23,4%	23,5%	23,9%	24,1%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,9%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%
Hétérosexuel Autres pays	6,1%	6,1%	6,3%	6,3%	6,3%
HSH France	30,4%	30,5%	30,3%	30,0%	29,6%
HSH Afrique subsaharienne	1,2%	1,3%	1,3%	1,5%	1,6%
HSH Afrique du Nord	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%

HSH Autre pays	4,2%	4,3%	4,6%	4,7%	4,8%
Autre France	8,7%	8,6%	8,3%	8,2%	8,0%
Autre Afrique subsaharienne	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%	2,7%
Autre Afrique du Nord	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Autre Autres pays	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	1,8%
IMC kg/m²					
Manquant	27,8%	23,7%	23,6%	22,1%	23,5%
Médiane	25,2	25,2	25,2	25,4	25,6
q_{25} - q_{75}	22,3 - 28,7	22,4 - 28,7	22,4 - 28,7	22,5 - 28,9	22,7 - 29,1
Maigre (<18.5)	3,9%	3,8%	4,0%	3,8%	3,6%
Normal [18.5-25[	44,8%	44,2%	44,0%	43,3%	41,8%
Surpoids [25-30[	32,5%	33,0%	32,9%	33,1%	33,5%
Obèse (≥ 30)	18,8%	19,0%	19,1%	19,8%	21,1%
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,3%
Stade SIDA	19,9%	19,7%	19,5%	19,4%	19,2%
Ag HBs +	5,7%	5,6%	5,6%	5,6%	5,5%
Ac VHC +	11,8%	11,5%	11,3%	11,0%	10,8%
Année de diagnostic					
Médiane	2004	2005	2005	2006	2006
q_{25} - q_{75}	1995 - 2012	1996 - 2013	1996 - 2013	1996 - 2014	1997 -2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
≤ 1996	27,6%	26,8%	25,9%	25,0%	24,2%
1997-2004	23,2%	22,7%	22,2%	21,6%	21,2%
2005-2012	25,3%	24,9%	24,4%	24,1%	23,7%
≥ 2013	24,0%	25,5%	27,5%	29,3%	30,9%
Traitement ARV					
En cours	97,2%	97,2%	97,3%	97,4%	97,6%
Antécédents	2,2%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%
Jamais traité	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Type de traitement					
Monothérapie	1,7%	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%
Bithérapie	15,4%	19,7%	25,0%	28,0%	30,6%
Trithérapie	80,3%	76,5%	71,5%	68,6%	66,2%
Plus de 3 ARVs	2,6%	2,4%	2,1%	1,9%	1,7%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	17,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	14,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	12,7%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	9,1%	–	–	–	–
DTG/RPV	5,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	5,0%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	4,3%	–	–	–	–

DRV/FTC/RTV/TDF	4,2%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,9%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	20,3%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	13,5%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	11,1%	–	–	–
3TC/DTG	–	9,0%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	7,4%	–	–	–
DTG/RPV	–	5,6%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	4,1%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,4%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,3%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,2%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	23,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	12,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	12,0%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,3%	–	–
DTG/RPV	–	–	5,9%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	5,5%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	3,7%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,2%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,7%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,4%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	25,4%	–
3TC/DTG	–	–	–	14,1%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	11,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	8,2%	–
DTG/RPV	–	–	–	5,9%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	4,3%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,0%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	3,7%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	3,4%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,1%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	26,9%
3TC/DTG	–	–	–	–	15,9%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,4%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	7,5%
DTG/RPV	–	–	–	–	5,9%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	4,6%

3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,6%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	3,4%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	3,1%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,7%
Charge virale					
Manquant	9,9%	8,0%	8,4%	8,1%	9,5%
< 200 copies/mL	96,0%	96,3%	96,2%	96,5%	96,8%
< 50 copies/mL	92,0%	92,8%	92,4%	93,4%	93,6%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,5%	96,7%	96,6%	96,8%	97,0%
< 50 copies/mL	92,5%	93,3%	92,9%	93,7%	93,8%
CD4(/mm³)					
Manquant	10,8%	9,5%	9,9%	10,4%	11,7%
Médiane	654	654	664	676	685
q_{25} - q_{75}	470 - 873	470 - 871	476 - 883	486 - 900	492 - 910
CD4>500/mm³	71,1%	71,1%	71,9%	73,2%	74,0%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	17,4%	16,5%	16,7%	16,6%	18,0%
%	43,7%	45,4%	46,4%	47,5%	48,2%

2. ÎLE-DE-FRANCE

2.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 - Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	970	914	950	999	892
Age					
Médiane	36,5	37,0	36,6	36,2	35,8
q_{25} - q_{75}	28,7 - 47,0	29,1 - 47,3	28,9 - 47,5	28,9 - 47,1	28,6 - 47,4
≥ 60 ans	6,5%	6,9%	8,3%	6,9%	7,3%
≥ 75 ans	0,2%	1,0%	0,5%	0,6%	0,5%
Genre					
Homme cis	63,9%	65,4%	65,7%	63,2%	68,5%
Femme cis	33,9%	31,5%	31,0%	33,5%	28,0%
Transgenre	2,2%	3,1%	3,4%	3,3%	3,5%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	29,8%	32,2%	27,3%	26,8%	29,9%
Femme cis France	5,4%	4,4%	2,8%	3,6%	3,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	17,8%	17,4%	19,3%	19,3%	18,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	24,6%	22,3%	23,5%	26,4%	19,4%
Homme cis Autres pays	16,3%	15,9%	19,2%	17,0%	19,8%
Femme cis Autres pays	3,9%	4,8%	4,6%	3,5%	4,7%
Autres	2,2%	3,1%	3,4%	3,3%	3,5%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	46,6%	49,2%	41,5%	42,5%	43,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	27,9%	26,6%	29,3%	30,6%	27,3%
Homme cis Autres pays	25,5%	24,3%	29,2%	26,9%	29,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	15,8%	13,9%	9,2%	10,8%	14,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	72,6%	70,8%	75,9%	78,8%	69,2%
Femme cis Autres pays	11,6%	15,3%	15,0%	10,5%	16,8%
Groupe d'acquisition					
HSH	38,9%	40,6%	40,7%	40,5%	43,4%
UDI	1,2%	0,9%	0,3%	0,7%	0,7%
Hétérosexuel	52,9%	53,5%	51,9%	51,0%	47,2%
Hémophilie/Transfusion	0,4%	0,1%	0,1%	0,4%	0,0 %
Périnatal	0,1%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%
Autre ou inconnu	6,5%	4,6%	6,5%	6,9%	8,2%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	11,1%	10,5%	8,8%	8,2%	10,5%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	34,2%	33,4%	34,5%	35,8%	27,6%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,7%	3,1%	2,7%	2,6%	3,1%
Hétérosexuel Autres pays	5,9%	6,6%	5,8%	4,3%	5,9%
HSH France	21,7%	24,8%	19,7%	20,6%	20,6%

HSH Afrique subsaharienne	5,0%	3,8%	5,3%	6,2%	7,1%
HSH Afrique du Nord	3,4%	2,3%	4,2%	3,6%	4,9%
HSH Autre pays	8,9%	9,6%	11,6%	10,1%	10,8%
Autre France	2,6%	2,0%	2,3%	2,3%	3,0%
Autre Afrique subsaharienne	3,4%	2,6%	3,1%	3,7%	3,6%
Autre Afrique du Nord	0,3%	0,1%	0,5%	0,5%	0,9%
Autre Autres pays	2,0%	1,2%	1,5%	2,0%	1,9%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	26,3%	23,4%	19,8%	13,8%	15,0%
Médiane	2018	2018	2020	2021	2022
q_{25} - q_{75}	2007 - 2019	2007 - 2020	2013-2022	2011-2023	2014 -2023
IMC kg/m²					
Manquant	46,6%	45,4%	47,4%	45,9%	46,1%
Médiane	23,4	23,6	23,6	23,5	23,1
q_{25} - q_{75}	21,1 - 26,3	21,1 - 26,7	21,2 - 26,5	21,5 - 27,3	20,9 - 25,9
Maigre (<18.5)	7,7%	6,0%	6,8%	5,2%	9,4%
Normal [18.5-25[	57,7%	58,3%	59,6%	57,7%	58,0%
Surpoids [25-30[	23,9%	24,3%	22,8%	23,7%	22,5%
Obèse (≥ 30)	10,6%	11,4%	10,8%	13,5%	10,2%
Statut fumeur					
Inconnu	56,9%	56,3%	54,2%	55,1%	60,5%
Non-fumeur	42,2%	43,0%	46,8%	49,0%	43,2%
Ex-fumeur	26,4%	25,4%	22,5%	24,3%	25,3%
Fumeur actuel	31,4%	31,7%	30,8%	26,7%	31,5%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	16,0%	9,5%	7,5%	10,0%	11,7%
Médiane	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	9,9%	8,6%	9,7%	9,1%	10,7%
Stade SIDA	10,2%	14,3%	10,4%	10,9%	8,9%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	20,2%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	12,1%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	11,1%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	11,1%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	6,1%	–	–	–	–
Sarcome de Kaposi	6,1%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	16,8%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	16,0%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	14,5%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	9,2%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	8,4%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	6,1%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	17,2%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	12,1%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	10,1%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	8,1%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	6,1%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	6,1%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	21,1%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	19,3%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	13,8%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	5,5%	–
Sarcome de Kaposi	–	–	–	5,5%	–
Autres infections bactériennes	–	–	–	4,6%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	25,3%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	19,0%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	11,4%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	8,9%
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	3,8%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	–	3,8%
Ag HBs +	5,4%	3,4%	4,6%	4,3%	2,4%
Ac VHC +	3,9%	3,6%	2,1%	2,2%	2,1%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,5%	0,0 %	0,1%	0,3%	0,3%
0 jour	28,7%	25,9%	30,2%	26,6%	25,7%
1 - 7 jours	25,3%	26,8%	26,3%	29,8%	27,1%
8 - 15 jours	16,0%	18,6%	16,8%	18,7%	18,2%
16 - 30 jours	9,6%	11,3%	7,0%	8,5%	10,0%
1 - 3 mois	8,3%	6,4%	7,7%	5,1%	5,7%
> 3 mois	12,1%	11,1%	12,0%	11,2%	13,3%
Statut à la prise en charge					
Manquant	5,2%	5,8%	5,3%	6,8%	7,4%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	31,3%	33,3%	34,1%	34,7%	34,4%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	17,5%	17,3%	17,7%	15,4%	18,0%

200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	20,3%	17,8%	18,8%	20,8%	20,2%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	30,9%	31,6%	29,4%	29,1%	27,4%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	6,3%	6,7%	7,0%	9,1%	9,0%
Médiane	330	339	355	335	349
q_{25} - q_{75}	168 - 510	163 - 536	173 - 545	173 - 545	189 - 530
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	13,8%	14,8%	15,9%	17,9%	15,5%
%	12,7%	10,7%	10,8%	10,1%	10,7%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	3,8%	1,6%	3,3%	1,6%	3,5%
Médiane	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
q_{25} - q_{75}	3,8- 5,4	3,8- 5,5	3,7- 5,5	3,7- 5,5	3,8- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	26,3%	23,3%	18,1%	12,5%	9,5%
%	0,3%	0,6%	0,0 %	1,2%	0,7%
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	26,6%	23,8%	18,3%	13,7%	10,2%
%	0,0 %	0,4%	0,1%	0,7%	1,0%
Traitement ARV initié	96,1%	97,3%	96,5%	97,3%	94,7%
Type de traitement					
Monothérapie	0,5%	0,1%	0,4%	0,8%	0,1%
Bithérapie	4,8%	9,3%	6,7%	5,8%	9,7%
Trithérapie	90,2%	87,0%	90,1%	91,0%	87,8%
Plus de 3 ARVs	2,3%	2,0%	1,6%	1,0%	1,3%
Inconnu	2,2%	1,6%	1,2%	1,4%	1,0%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	46,9%	46,3%	52,3%	58,3%	59,7%
8 - 30 jours	36,0%	39,1%	32,7%	31,7%	30,8%
1 - 3 mois	11,9%	10,5%	10,1%	6,8%	6,7%
> 3 mois	5,2%	4,0%	4,9%	3,3%	2,8%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	50,6%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	19,1%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	9,0%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,3%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	2,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	2,6%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,1%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	1,3%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	1,1%	–	–	–	–

Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	51,5%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	12,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,8%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	7,8%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	3,0%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	2,7%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,5%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	2,4%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,7%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,7%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	57,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	11,3%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	10,3%	–	–
3TC/DTG	–	–	6,0%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	2,7%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,2%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	2,1%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	2,0%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	1,0%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	0,8%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	63,8%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	14,4%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	6,0%	–
3TC/DTG	–	–	–	5,2%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,2%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,4%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	1,2%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,0%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	0,8%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	0,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	64,0%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	13,3%
3TC/DTG	–	–	–	–	9,4%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	4,4%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,2%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	1,3%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,0%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	0,8%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	0,5%

3TC/DTG/TDF	–	–	–	–	0,4%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	48,4%	49,5%	50,0%	55,1%	65,7%
3 - 6 mois	23,1%	23,7%	21,7%	22,9%	22,5%
6 - 9 mois	11,8%	9,4%	11,0%	9,9%	7,9%
9 - 12 mois	4,7%	4,6%	5,8%	4,8%	4,0%
> 12 mois	12,1%	12,8%	11,5%	7,4%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	71,5%	73,2%	71,7%	77,9%	88,2%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	84,1%	87,2%	86,9%	89,0%	98,3%
[100 000 - 500 000[copies/ml	68,9%	68,1%	62,9%	74,5%	81,3%
≥500 000 copies/ml	45,4%	45,6%	52,4%	58,1%	70,1%

2.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	284	272	265	271	226
Age					
Médiane	42,1	41,5	40,1	41,7	41,8
q_{25} - q_{75}	33,2 - 51,2	33,7 - 52,4	34,5 - 50,7	33,0 - 50,3	33,7 - 52,8
≥ 60 ans	8,5%	11,4%	12,5%	10,0%	12,8%
≥ 75 ans	0,4%	1,8%	1,9%	0,0 %	0,4%
Genre					
Homme cis	62,0%	65,1%	63,0%	60,2%	65,9%
Femme cis	38,0%	33,5%	35,1%	38,0%	32,7%
Transgenre	0,0 %	1,5%	1,9%	1,9%	1,3%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	21,8%	24,3%	18,9%	19,9%	20,8%
Femme cis France	4,2%	2,6%	1,9%	2,6%	4,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	21,5%	25,7%	23,4%	25,1%	25,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	27,8%	26,5%	26,0%	30,6%	23,0%
Homme cis Autres pays	18,7%	15,1%	20,8%	15,1%	19,5%
Femme cis Autres pays	6,0%	4,4%	7,2%	4,8%	5,8%
Autres	0,0 %	1,5%	1,9%	1,9%	1,3%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	35,2%	37,3%	29,9%	33,1%	31,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	34,7%	39,6%	37,1%	41,7%	38,9%
Homme cis Autres pays	30,1%	23,2%	32,9%	25,2%	29,5%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	11,1%	7,7%	5,4%	6,8%	12,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	73,2%	79,1%	74,2%	80,6%	70,3%
Femme cis Autres pays	15,7%	13,2%	20,4%	12,6%	17,6%

Groupe d'acquisition					
HSH	22,9%	25,0%	20,8%	24,7%	22,6%
UDI	2,5%	0,7%	0,8%	1,5%	1,3%
Hétérosexuel	65,5%	69,1%	66,8%	60,9%	63,7%
Hémophilie/Transfusion	0,7%	0,0 %	0,4%	0,7%	0,0 %
Périnatal	0,4%	0,7%	0,8%	0,7%	0,0 %
Autre ou inconnu	8,1%	4,4%	10,6%	11,4%	12,4%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	27,6%	30,5%	17,7%	14,4%	13,5%
Médiane	2017	2016	2019	2019	2021
q_{25} - q_{75}	2004-2019	2005-2020	2011-2022	2005-2022	2013-2023
IMC kg/m²					
Manquant	49,3%	42,3%	49,1%	45,0%	47,8%
Médiane	23,1	22,6	22,6	22,5	22,3
q_{25} - q_{75}	20,5 - 25,7	20,2 - 5,7	19,8 - 24,8	20,3 - 26,2	19,5 - 24,4
Maigre (<18.5)	11,8%	7,6%	16,3%	11,4%	17,0%
Normal [18.5-25[	58,3%	62,4%	60,0%	59,7%	61,9%
Surpoids [25-30[	22,2%	21,7%	14,8%	20,8%	13,6%
Obèse (≥ 30)	7,6%	8,3%	8,9%	8,1%	7,6%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	36,3%	34,2%	39,6%	34,0%	32,3%
1 - 7 jours	23,2%	28,7%	21,9%	32,5%	23,9%
8 - 15 jours	12,3%	15,1%	14,3%	13,7%	15,9%
16 - 30 jours	8,5%	7,0%	6,4%	5,9%	7,5%
1 - 3 mois	6,3%	5,9%	5,7%	4,1%	7,1%
> 3 mois	13,4%	9,2%	12,1%	10,0%	13,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,8%	1,1%	1,1%	0,4%	1,8%
Médiane	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
q_{25} - q_{75}	4,8- 5,9	4,9- 6,0	4,7- 5,9	4,9- 5,9	4,8- 6,0
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	35,1%	40,0%	36,3%	38,3%	53,7%
3 - 6 mois	26,8%	24,9%	23,7%	30,6%	21,8%
6 - 9 mois	15,8%	11,5%	14,3%	13,2%	14,8%
9 - 12 mois	5,0%	6,4%	7,5%	6,5%	9,7%
> 12 mois	17,3%	17,3%	18,2%	11,4%	0,0%

2.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	46 163	46 010	45 922	46 227	45 994
Age					
Médiane	51,6	52,1	52,7	53,4	53,9
q_{25} - q_{75}	42,6 - 59,1	43,1 - 59,8	43,4 - 60,5	43,8 - 61,2	44,2 - 61,9
≥ 60 ans	22,4%	24,3%	26,4%	28,8%	30,9%
≥ 75 ans	2,3%	2,6%	2,9%	3,3%	3,8%
Genre					
Homme cis	60,1%	59,8%	59,9%	59,5%	59,2%
Femme cis	38,3%	38,5%	38,3%	38,6%	38,9%
Transgenre	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	1,9%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	33,6%	33,3%	32,8%	32,1%	31,5%
Femme cis France	8,1%	8,0%	7,8%	7,7%	7,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	14,8%	14,7%	14,8%	15,1%	15,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	24,9%	25,1%	25,2%	25,6%	26,0%
Homme cis Autres pays	11,7%	11,8%	12,3%	12,3%	12,4%
Femme cis Autres pays	5,3%	5,4%	5,3%	5,4%	5,4%
Autres	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	1,9%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	55,9%	55,7%	54,8%	54,0%	53,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	24,6%	24,6%	24,7%	25,4%	25,9%
Homme cis Autres pays	19,5%	19,8%	20,5%	20,6%	21,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	21,1%	20,8%	20,3%	19,8%	19,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	65,1%	65,3%	65,9%	66,3%	66,8%
Femme cis Autres pays	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,8%
Groupe d'acquisition					
HSH	33,1%	33,3%	33,7%	33,3%	33,2%
UDI	5,1%	4,8%	4,5%	4,3%	4,2%
Hétérosexuel	55,4%	55,4%	55,2%	55,6%	55,8%
Hémophilie/Transfusion	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%
Périnatal	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
Autre ou inconnu	4,1%	4,2%	4,3%	4,4%	4,4%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	11,5%	11,4%	11,1%	11,0%	10,9%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	35,3%	35,3%	35,3%	35,8%	36,1%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,5%
Hétérosexuel Autres pays	6,2%	6,2%	6,3%	6,3%	6,4%
HSH France	24,0%	23,9%	23,7%	23,1%	22,6%
HSH Afrique subsaharienne	1,7%	1,7%	1,8%	2,0%	2,1%
HSH Afrique du Nord	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,6%

HSH Autre pays	6,0%	6,2%	6,7%	6,8%	6,8%
Autre France	6,4%	6,2%	5,9%	5,9%	5,7%
Autre Afrique subsaharienne	2,8%	2,8%	2,9%	3,0%	3,1%
Autre Afrique du Nord	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%
Autre Autres pays	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
IMC kg/m²					
Manquant	32,8%	29,1%	28,0%	25,5%	26,1%
Médiane	25,6	25,7	25,7	25,8	26,1
q_{25} - q_{75}	22,7 - 29,4	22,8 - 29,4	22,8 - 29,4	22,9 - 29,6	23,1 - 29,8
Maigre (<18.5)	3,0%	2,9%	3,1%	3,0%	2,7%
Normal [18.5-25[	41,8%	41,1%	41,0%	40,0%	39,0%
Surpoids [25-30[	33,2%	33,9%	34,0%	34,0%	33,8%
Obèse (≥ 30)	21,9%	22,2%	22,0%	22,9%	24,5%
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,2%
Stade SIDA	21,4%	21,2%	21,0%	20,9%	20,7%
Ag HBs +	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%
Ac VHC +	10,9%	10,7%	10,4%	10,1%	10,0%
Année de diagnostic					
Médiane	2004	2005	2005	2006	2006
q_{25} - q_{75}	1997 -2012	1997 -2013	1997 - 2013	1998 - 2014	1998 - 2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
≤ 1996	24,7%	24,0%	23,0%	22,3%	21,5%
1997-2004	25,5%	25,0%	24,5%	23,9%	23,5%
2005-2012	25,9%	25,6%	25,2%	24,8%	24,3%
≥ 2013	23,9%	25,4%	27,3%	29,0%	30,7%
Traitement ARV					
En cours	97,0%	96,9%	97,1%	97,2%	97,4%
Antécédents	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%
Jamais traité	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%
Type de traitement					
Monothérapie	1,8%	1,5%	1,6%	1,7%	1,9%
Bithérapie	14,4%	17,6%	21,6%	24,0%	26,4%
Trithérapie	80,6%	77,9%	74,2%	71,8%	69,4%
Plus de 3 ARVs	3,2%	3,0%	2,7%	2,5%	2,3%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	16,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	11,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	11,1%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	7,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	6,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	5,9%	–	–	–	–
DTG/RPV	4,5%	–	–	–	–

EFV/FTC/TDF	4,0%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,0%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,1%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	19,8%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	10,8%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	10,7%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,2%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	6,5%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	5,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	5,0%	–	–	–
DTG/RPV	–	4,9%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,5%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	22,6%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	10,2%	–	–
3TC/DTG	–	–	9,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,1%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	5,4%	–	–
DTG/RPV	–	–	5,2%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	5,1%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	4,1%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,3%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	2,9%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	24,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	11,4%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	9,7%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	8,1%	–
DTG/RPV	–	–	–	5,2%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	5,0%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	4,1%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,0%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	3,5%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	2,9%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	26,3%
3TC/DTG	–	–	–	–	13,2%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	9,3%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	7,5%
DTG/RPV	–	–	–	–	5,3%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	4,7%

3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,6%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	3,7%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	3,4%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	2,8%
Charge virale					
Manquant	12,6%	9,8%	10,0%	9,7%	10,4%
< 200 copies/mL	95,6%	95,8%	95,7%	96,1%	96,6%
< 50 copies/mL	90,8%	91,8%	91,0%	92,3%	93,0%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,0%	96,1%	96,0%	96,3%	96,7%
< 50 copies/mL	91,3%	92,2%	91,3%	92,6%	93,1%
CD4(/mm^3)					
Manquant	11,8%	8,9%	9,4%	9,6%	10,7%
Médiane	638	636	652	660	670
q_{25} - q_{75}	459 - 850	460 - 845	469 - 865	476 - 877	483 - 888
CD4>500/mm^3	69,6%	69,6%	70,9%	71,8%	72,7%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	19,4%	17,6%	17,2%	16,3%	17,1%
%	42,1%	43,7%	44,8%	46,4%	46,9%

3. CORESS ARC ALPIN

3.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	76	47	61	78	62
Age					
Médiane	41,3	35,8	36,1	38,0	35,9
q_{25} - q_{75}	31,4 - 51,4	28,9 - 51,0	27,5 - 47,0	27,4 - 47,3	29,9 - 44,4
≥ 60 ans	5,3%	10,6%	11,5%	7,7%	8,1%
≥ 75 ans	0,0 %	6,4%	0,0 %	0,0 %	3,2%
Genre					
Homme cis	71,1%	76,6%	59,0%	62,8%	66,1%
Femme cis	29,0%	21,3%	41,0%	37,2%	33,9%
Transgenre	0,0 %	2,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	50,0%	44,7%	24,6%	35,9%	33,9%
Femme cis France	1,3%	2,1%	6,6%	6,4%	4,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	9,2%	6,4%	21,3%	10,3%	17,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	21,1%	14,9%	27,9%	28,2%	25,8%
Homme cis Autres pays	11,8%	25,5%	13,1%	16,7%	14,5%
Femme cis Autres pays	6,6%	4,3%	6,6%	2,6%	3,2%
Autres	0,0 %	2,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	70,4%	58,3%	41,7%	57,1%	51,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,0%	8,3%	36,1%	16,3%	26,8%
Homme cis Autres pays	16,7%	33,3%	22,2%	26,5%	22,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	4,6%	10,0%	16,0%	17,2%	14,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	72,7%	70,0%	68,0%	75,9%	76,2%
Femme cis Autres pays	22,7%	20,0%	16,0%	6,9%	9,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	38,2%	36,2%	27,9%	29,5%	29,0%
UDI	1,3%	2,1%	0,0 %	1,3%	0,0 %
Hétérosexuel	47,4%	38,3%	59,0%	61,5%	59,7%
Hémophilie/Transfusion	1,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	11,8%	23,4%	13,1%	7,7%	11,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	15,8%	12,8%	11,5%	18,0%	19,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	21,1%	14,9%	41,0%	34,6%	35,5%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,6%	6,4%	3,3%	0,0 %	3,2%
Hétérosexuel Autres pays	7,9%	4,3%	3,3%	9,0%	1,6%

HSH France	34,2%	21,3%	13,1%	19,2%	16,1%
HSH Afrique subsaharienne	2,6%	2,1%	6,6%	2,6%	3,2%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	4,3%	1,6%	2,6%	1,6%
HSH Autre pays	1,3%	8,5%	6,6%	5,1%	8,1%
Autre France	1,3%	12,8%	6,6%	5,1%	3,2%
Autre Afrique subsaharienne	6,6%	4,3%	1,6%	1,3%	4,8%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %	1,6%
Autre Autres pays	6,6%	8,5%	3,3%	2,6%	1,6%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	35,1%	24,0%	19,1%	11,1%	7,9%
Médiane	2019	2019	2022	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2018 -2020	2009 -2021	2018 -2022	2019 -2023	2021 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	34,2%	29,8%	37,7%	38,5%	29,0%
Médiane	22,1	23,4	23,1	23,0	22,8
q_{25} - q_{75}	19,3 - 25,0	21,6 - 26,3	19,4 - 27,0	19,8 - 24,9	19,4 - 25,5
Maigre (<18.5)	18,0%	9,1%	15,8%	16,7%	20,5%
Normal [18.5-25[	56,0%	54,6%	50,0%	60,4%	47,7%
Surpoids [25-30[	20,0%	24,2%	26,3%	14,6%	25,0%
Obèse (≥ 30)	6,0%	12,1%	7,9%	8,3%	6,8%
Statut fumeur					
Inconnu	50,0%	36,2%	52,5%	59,0%	59,7%
Non-fumeur	29,0%	43,3%	51,7%	34,4%	40,0%
Ex-fumeur	21,1%	23,3%	6,9%	6,3%	12,0%
Fumeur actuel	50,0%	33,3%	41,4%	59,4%	48,0%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	5,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	15,0	15,0	15,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,6%	10,6%	13,1%	7,7%	8,1%
Stade SIDA	15,8%	25,5%	13,1%	12,8%	12,9%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	33,3%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	25,0%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	25,0%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	8,3%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	8,3%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	16,7%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	16,7%	–	–	–

Candidose de l'œsophage	–	8,3%	–	–	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	8,3%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	8,3%	–	–	–
Infections multiples	–	8,3%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumopathie bactérienne récurrente	–	–	25,0%	–	–
Candidose	–	–	12,5%	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	12,5%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	12,5%	–	–
Infections multiples	–	–	12,5%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	12,5%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	30,0%	–
Sarcome de Kaposi	–	–	–	20,0%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	10,0%	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	10,0%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	10,0%	–
Infections multiples	–	–	–	10,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Autres infections bactériennes	–	–	–	–	12,5%
Autres infections virales	–	–	–	–	12,5%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	12,5%
Infection mycobactérienne	–	–	–	–	12,5%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	12,5%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	12,5%
Ag HBs +	7,9%	0,0 %	8,2%	2,6%	3,2%
Ac VHC +	4,0%	0,0 %	3,3%	5,1%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	30,3%	34,0%	26,2%	29,5%	35,5%
1 - 7 jours	38,2%	34,0%	27,9%	43,6%	33,9%
8 - 15 jours	13,2%	23,4%	18,0%	11,5%	17,7%
16 - 30 jours	9,2%	2,1%	11,5%	12,8%	6,5%
1 - 3 mois	1,3%	0,0 %	9,8%	1,3%	4,8%
> 3 mois	7,9%	6,4%	6,6%	1,3%	1,6%
Statut à la prise en charge					
Manquant	2,6%	0,0 %	4,9%	3,9%	1,6%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	32,4%	29,8%	32,8%	41,3%	32,8%

350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	4,1%	17,0%	19,0%	14,7%	24,6%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	23,0%	10,6%	17,2%	14,7%	18,0%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	40,5%	42,6%	31,0%	29,3%	24,6%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	2,6%	0,0 %	4,9%	3,9%	1,6%
Médiane	237	330	342	378	418
q_{25} - q_{75}	100 - 520	100 - 539	101 - 570	186 - 610	238 - 590
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	7,9%	2,1%	6,6%	14,1%	8,1%
%	5,7%	13,0%	8,8%	14,9%	14,0%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,3%	0,0 %	1,6%	0,0 %	1,6%
Médiane	5,1	5,0	4,7	4,9	4,6
q_{25} - q_{75}	4,1- 5,8	3,5- 5,6	4,0- 5,5	4,2- 5,3	3,8- 5,3
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	6,6%	2,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	6,6%	2,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	98,7%	97,9%	100,0%	96,2%	98,4%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	2,7%	0,0 %	0,0 %	2,7%	0,0 %
Trithérapie	96,0%	100,0%	100,0%	96,0%	98,4%
Plus de 3 ARVs	1,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,6%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3%	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	38,7%	47,6%	58,3%	59,0%	55,0%
8 - 30 jours	52,0%	50,3%	36,7%	31,8%	30,0%
1 - 3 mois	5,3%	2,2%	5,0%	4,0%	11,7%
> 3 mois	4,0%	0,0%	0,0%	5,3%	3,3%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	70,7%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	14,7%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	5,3%	–	–	–	–
3TC/DTG	2,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	1,3%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	1,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	1,3%	–	–	–	–

Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	82,6%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	8,7%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	6,5%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	2,2%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	86,9%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	4,9%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	3,3%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	1,6%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	1,6%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	1,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	89,2%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	2,7%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	1,4%	–
3TC/DTG	–	–	–	1,4%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,4%	–
DRV/FTC/TDF	–	–	–	1,4%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	1,4%	–
DTG/RPV	–	–	–	1,4%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	83,6%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	8,2%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	3,3%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	1,6%
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	–	–	–	–	1,6%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,6%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	53,0%	50,6%	57,5%	67,6%	73,2%
3 - 6 mois	20,0%	38,2%	23,8%	22,6%	18,0%
6 - 9 mois	10,0%	5,2%	13,6%	6,6%	8,8%
9 - 12 mois	5,7%	0,0%	1,7%	.	0,0%
> 12 mois	11,4%	6,0%	3,4%	.	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	72,9%	88,8%	81,3%	90,1%	91,2%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	87,1%	88,9%	89,7%	97,1%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	76,5%	92,8%	83,1%	84,8%	70,0%
≥500 000 copies/ml	50,0%	71,4%	58,3%	66,7%	100,0%

3.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	30	20	18	22	15
Age					
Médiane	45,2	46,5	38,4	44,3	43,8
q_{25} - q_{75}	39,1 -52,7	35,0 -61,0	33,0 - 60,9	28,9 - 49,3	28,2 - 58,5
≥ 60 ans	3,3%	25,0%	27,8%	4,6%	13,3%
≥ 75 ans	0,0 %	15,0%	0,0 %	0,0 %	6,7%
Genre					
Homme cis	73,3%	75,0%	66,7%	59,1%	66,7%
Femme cis	26,7%	25,0%	33,3%	40,9%	33,3%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	43,3%	55,0%	27,8%	22,7%	20,0%
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	5,6%	9,1%	6,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	16,7%	5,0%	27,8%	13,6%	26,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	20,0%	20,0%	27,8%	31,8%	20,0%
Homme cis Autres pays	13,3%	15,0%	11,1%	22,7%	20,0%
Femme cis Autres pays	6,7%	5,0%	0,0 %	0,0 %	6,7%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	59,1%	73,3%	41,7%	38,5%	30,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	22,7%	6,7%	41,7%	23,1%	40,0%
Homme cis Autres pays	18,2%	20,0%	16,7%	38,5%	30,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	16,7%	22,2%	20,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	75,0%	80,0%	83,3%	77,8%	60,0%
Femme cis Autres pays	25,0%	20,0%	0,0 %	0,0 %	20,0%
Groupe d'acquisition					
HSH	30,0%	30,0%	5,6%	13,6%	33,3%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,6%	0,0 %
Hétérosexuel	40,0%	35,0%	55,6%	72,7%	46,7%
Hémophilie/Transfusion	3,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	26,7%	35,0%	38,9%	9,1%	20,0%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	41,2%	22,2%	0,0 %	20,0%	0,0 %
Médiane	2018	2020	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2012-2020	2018-2021	2019 -2022	2020 -2023	2020 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	33,3%	20,0%	33,3%	22,7%	40,0%
Médiane	21,9	22,7	21,9	21,5	17,3

q_{25} - q_{75}	19,0 - 24,6	19,4 - 25,1	18,2 - 25,8	18,0 - 25,0	16,3 - 19,8
Maigre (<18.5)	20,0%	18,8%	25,0%	29,4%	55,6%
Normal [18.5-25[	55,0%	56,3%	50,0%	47,1%	44,4%
Surpoids [25-30[	15,0%	12,5%	16,7%	17,7%	0,0 %
Obèse (≥ 30)	10,0%	12,5%	8,3%	5,9%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	46,7%	40,0%	38,9%	50,0%	53,3%
1 - 7 jours	23,3%	35,0%	27,8%	18,2%	26,7%
8 - 15 jours	10,0%	20,0%	16,7%	18,2%	13,3%
16 - 30 jours	10,0%	0,0 %	11,1%	9,1%	0,0 %
1 - 3 mois	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,7%
> 3 mois	10,0%	5,0%	5,6%	4,6%	0,0 %
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,7%
Médiane	5,7	5,4	5,6	5,4	5,1
q_{25} - q_{75}	5,1- 6,0	4,9- 5,7	5,2- 5,8	5,0- 5,6	4,6- 5,8
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	45,5%	35,0%	52,4%	52,2%	45,3%
3 - 6 mois	23,4%	55,0%	17,9%	33,5%	32,8%
6 - 9 mois	15,6%	0,0%	23,8%	9,6%	21,9%
9 - 12 mois	3,9%	0,0%	0,0%	.	0,0%
> 12 mois	11,7%	10,0%	6,0%	.	0,0%

3.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	3 002	3 026	3 038	3 056	3 078
Age					
Médiane	52,5	53,3	54,0	54,3	55,0
q_{25} - q_{75}	43,0 - 59,7	43,9 - 60,6	44,3 - 61,4	44,0 - 61,9	44,1 - 62,6
≥ 60 ans	24,3%	26,8%	29,4%	31,1%	33,5%
≥ 75 ans	3,4%	3,9%	4,3%	4,6%	5,0%
Genre					
Homme cis	65,2%	65,1%	65,3%	65,3%	64,8%
Femme cis	34,6%	34,5%	34,3%	34,3%	34,9%
Transgenre	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	49,8%	49,8%	49,2%	48,3%	47,3%
Femme cis France	14,7%	14,4%	13,8%	13,5%	13,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	6,7%	6,2%	6,7%	7,0%	7,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	16,1%	16,2%	16,3%	16,7%	17,4%
Homme cis Autres pays	8,7%	9,2%	9,4%	10,1%	10,2%
Femme cis Autres pays	3,8%	3,9%	4,2%	4,2%	4,1%

Autres	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	76,4%	76,4%	75,3%	74,0%	73,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	10,2%	9,4%	10,3%	10,7%	11,2%
Homme cis Autres pays	13,4%	14,2%	14,4%	15,4%	15,8%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	42,5%	41,8%	40,3%	39,3%	38,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	46,4%	46,8%	47,6%	48,6%	49,8%
Femme cis Autres pays	11,1%	11,4%	12,2%	12,1%	11,7%
Groupe d'acquisition					
HSH	36,5%	36,9%	36,3%	36,8%	36,2%
UDI	7,7%	7,6%	7,4%	6,9%	6,8%
Hétérosexuel	47,3%	46,7%	47,5%	47,3%	48,1%
Hémophilie/Transfusion	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,5%
Périnatal	0,8%	1,2%	1,1%	1,3%	1,4%
Autre ou inconnu	5,9%	5,9%	6,0%	6,1%	6,1%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	23,0%	22,5%	22,5%	21,9%	21,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	18,4%	18,2%	18,8%	19,3%	20,1%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,7%	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%
Hétérosexuel Autres pays	4,2%	4,1%	4,3%	4,3%	4,4%
HSH France	31,6%	31,7%	30,7%	30,4%	29,6%
HSH Afrique subsaharienne	0,9%	0,8%	1,0%	1,2%	1,1%
HSH Afrique du Nord	0,7%	0,8%	0,8%	1,0%	1,0%
HSH Autre pays	3,4%	3,6%	3,9%	4,2%	4,5%
Autre France	10,1%	10,2%	10,0%	9,6%	9,4%
Autre Afrique subsaharienne	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%	3,4%
Autre Afrique du Nord	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%
Autre Autres pays	2,0%	2,2%	2,1%	2,3%	2,1%
IMC kg/m²					
Manquant	34,6%	25,7%	24,9%	22,8%	22,7%
Médiane	24,8	24,9	24,8	24,8	25,0
q_{25} - q_{75}	21,9 - 28,1	22,0 - 28,0	22,0 - 27,8	22,1 - 28,1	22,2 - 28,4
Maigre (<18.5)	5,6%	4,6%	5,1%	4,8%	5,0%
Normal [18.5-25[	46,3%	46,4%	47,0%	47,2%	45,2%
Surpoids [25-30[	33,3%	33,9%	32,2%	32,6%	33,3%
Obèse (≥ 30)	14,9%	15,0%	15,6%	15,5%	16,5%
Prise en charge au stade de la primo-infection	7,6%	7,9%	8,0%	8,1%	7,9%
Stade SIDA	15,7%	16,2%	16,3%	16,3%	15,9%
Ag HBs +	6,0%	5,7%	5,7%	5,6%	5,5%
Ac VHC +	12,6%	12,3%	12,1%	11,9%	11,7%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2005	2006	2007	2007

q_{25} - q_{75}	1995 - 2013	1996 - 2013	1996 - 2014	1996 - 2015	1997 - 2015
Période de diagnostic					
Manquant	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
≤ 1996	27,7%	27,4%	26,3%	25,3%	24,3%
1997-2004	20,1%	20,3%	19,9%	18,8%	19,0%
2005-2012	25,7%	25,0%	24,6%	24,2%	23,7%
≥ 2013	26,6%	27,3%	29,2%	31,8%	33,0%
Traitement ARV					
En cours	98,3%	97,4%	96,8%	97,3%	97,4%
Antécédents	1,3%	2,1%	2,8%	2,4%	2,2%
Jamais traité	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Type de traitement					
Monothérapie	1,6%	1,1%	0,9%	0,7%	0,6%
Bithérapie	10,8%	13,3%	19,7%	20,4%	22,4%
Trithérapie	86,1%	84,3%	78,4%	78,0%	76,1%
Plus de 3 ARVs	1,5%	1,3%	1,0%	0,9%	0,9%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	17,6%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	17,5%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	13,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	10,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	5,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	3,2%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,1%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,1%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,4%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,2%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	22,0%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	17,2%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	12,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	10,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	5,3%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	4,7%	–	–	–
DTG/RPV	–	3,7%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	2,1%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,8%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	1,8%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	27,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	15,0%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,4%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	9,4%	–	–

3TC/DTG	–	–	7,2%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	5,2%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	3,7%	–	–
DTG/RPV	–	–	3,4%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	1,7%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,4%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	32,8%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	14,7%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	8,5%	–
3TC/DTG	–	–	–	8,3%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	6,8%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	5,7%	–
DTG/RPV	–	–	–	3,4%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	3,1%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,2%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,1%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	35,6%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	14,1%
3TC/DTG	–	–	–	–	9,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	8,2%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	6,2%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	5,7%
DTG/RPV	–	–	–	–	3,5%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,6%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	2,6%
DRV/DTG/RTV	–	–	–	–	1,0%
Charge virale					
Manquant	8,3%	7,6%	6,9%	5,2%	6,0%
< 200 copies/mL	97,2%	97,4%	97,4%	97,7%	98,3%
< 50 copies/mL	93,8%	93,9%	94,1%	94,7%	95,5%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,5%	97,6%	97,8%	98,0%	98,6%
< 50 copies/mL	94,1%	94,4%	94,6%	95,1%	95,8%
CD4(/mm³)					
Manquant	9,0%	7,0%	7,1%	7,5%	8,9%
Médiane	706	702	718	727	740
q_{25} - q_{75}	510 - 945	502 - 940	520 - 960	522 - 969	520 - 970
CD4>500/mm³	76,0%	75,1%	77,1%	77,5%	76,9%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	14,3%	10,6%	10,5%	10,7%	12,5%
%	44,4%	47,2%	48,1%	48,9%	49,0%

4. CORESS AUVERGNE-LOIRE

4.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	46	57	57	77	49
Age					
Médiane	39,5	35,4	35,8	36,1	33,5
q_{25} - q_{75}	28,3 - 51,8	29,7 - 44,3	29,6 - 42,3	26,3 - 49,5	27,2 - 49,0
≥ 60 ans	8,7%	7,0%	10,5%	6,5%	10,2%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	1,8%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	84,8%	80,7%	66,7%	63,6%	57,1%
Femme cis	15,2%	19,3%	31,6%	32,5%	40,8%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	1,8%	3,9%	2,0%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	69,6%	57,9%	45,6%	41,6%	28,6%
Femme cis France	2,2%	5,3%	5,3%	3,9%	12,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	4,4%	10,5%	10,5%	11,7%	18,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	10,9%	8,8%	22,8%	26,0%	26,5%
Homme cis Autres pays	10,9%	12,3%	10,5%	10,4%	10,2%
Femme cis Autres pays	2,2%	5,3%	3,5%	2,6%	2,0%
Autres	0,0 %	0,0 %	1,8%	3,9%	2,0%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	82,1%	71,7%	68,4%	65,3%	50,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,1%	13,0%	15,8%	18,4%	32,1%
Homme cis Autres pays	12,8%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	14,3%	27,3%	16,7%	12,0%	30,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	71,4%	45,5%	72,2%	80,0%	65,0%
Femme cis Autres pays	14,3%	27,3%	11,1%	8,0%	5,0%
Groupe d'acquisition					
HSH	58,7%	50,9%	50,9%	36,4%	30,6%
UDI	2,2%	1,8%	1,8%	3,9%	0,0 %
Hétérosexuel	26,1%	45,6%	47,4%	46,8%	55,1%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	13,0%	1,8%	0,0 %	11,7%	14,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	13,0%	22,8%	14,0%	10,4%	18,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	8,7%	14,0%	28,1%	31,2%	36,7%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	1,8%	0,0 %	2,6%	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	4,4%	7,0%	5,3%	2,6%	0,0 %

HSH France	50,0%	38,6%	36,8%	24,7%	18,4%
HSH Afrique subsaharienne	2,2%	3,5%	5,3%	3,9%	2,0%
HSH Afrique du Nord	4,4%	3,5%	1,8%	1,3%	0,0 %
HSH Autre pays	2,2%	5,3%	7,0%	6,5%	8,2%
Autre France	8,7%	1,8%	0,0 %	10,4%	6,1%
Autre Afrique subsaharienne	4,4%	1,8%	0,0 %	2,6%	6,1%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	2,2%	0,0 %	1,8%	3,9%	4,1%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	23,1%	0,0 %	17,9%	16,7%	21,4%
Médiane	2020	2021	2022	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2018 -2020	2019-2021	2016-2022	2022 -2023	2022 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	39,1%	24,6%	29,8%	42,9%	38,8%
Médiane	23,0	22,5	22,5	23,1	24,2
q_{25} - q_{75}	19,7 - 26,7	20,8 - 25,7	20,5 - 25,0	20,8 - 25,1	21,4 - 28,0
Maigre (<18.5)	17,9%	0,0 %	10,0%	6,8%	0,0 %
Normal [18.5-25[	46,4%	69,8%	65,0%	63,6%	53,3%
Surpoids [25-30[	25,0%	16,3%	20,0%	22,7%	23,3%
Obèse (≥ 30)	10,7%	14,0%	5,0%	6,8%	23,3%
Statut fumeur					
Inconnu	37,0%	12,3%	31,6%	33,8%	26,5%
Non-fumeur	13,8%	0,0 %	7,7%	2,0%	13,9%
Ex-fumeur	51,7%	54,0%	64,1%	76,5%	69,4%
Fumeur actuel	34,5%	46,0%	28,2%	21,6%	16,7%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	10,0	15,0	5,0	15,0	15,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	15,0 - 25,0	15,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,5%	8,8%	14,0%	9,1%	8,2%
Stade SIDA	21,7%	10,5%	8,8%	9,1%	4,1%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	30,0%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	20,0%	–	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	10,0%	–	–	–	–
Candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire	10,0%	–	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	10,0%	–	–	–	–
Infections multiples	10,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	33,3%	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	16,7%	–	–	–

Infection à mycobactérie, identifiée ou non disséminée ou extrapulmonaire	–	16,7%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	16,7%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	16,7%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	40,0%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	20,0%	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	20,0%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	20,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	14,3%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	14,3%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	14,3%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	14,3%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	14,3%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	14,3%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	100,0%
Ag HBs +	6,5%	1,8%	1,8%	1,3%	0,0 %
Ac VHC +	2,2%	0,0 %	3,5%	3,9%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,5%	0,0 %
0 jour	21,7%	21,1%	15,8%	23,6%	24,5%
1 - 7 jours	37,0%	22,8%	33,3%	26,4%	24,5%
8 - 15 jours	21,7%	26,3%	19,3%	20,8%	10,2%
16 - 30 jours	10,9%	14,0%	14,0%	5,6%	18,4%
1 - 3 mois	6,5%	5,3%	7,0%	11,1%	16,3%
> 3 mois	2,2%	10,5%	10,5%	12,5%	6,1%
Statut à la prise en charge					
Manquant	8,7%	3,5%	3,5%	11,7%	8,2%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	42,9%	30,9%	29,1%	42,7%	33,3%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	9,5%	25,5%	21,8%	16,2%	11,1%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	2,4%	12,7%	20,0%	17,7%	26,7%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	45,2%	30,9%	29,1%	23,5%	28,9%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	10,9%	3,5%	5,3%	13,0%	12,2%
Médiane	358	382	338	406	311
q_{25} - q_{75}	61 - 567	166 - 507	175 - 452	208 - 615	175 - 543

CD4/CD8 >= 1					
Manquant	15,2%	5,3%	8,8%	15,6%	16,3%
%	12,8%	11,1%	9,6%	12,3%	4,9%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,2%	0,0 %
Médiane	4,8	4,8	4,7	4,4	4,4
q_{25} - q_{75}	4,0- 5,2	3,9-5,2	4,0- 5,7	2,1- 5,1	2,2- 4,9
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3%	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3%	2,0%
Traitement ARV initié	100,0%	100,0%	96,5%	94,8%	85,7%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	2,2%	5,3%	0,0 %	2,7%	2,4%
Trithérapie	95,7%	94,7%	96,4%	97,3%	95,2%
Plus de 3 ARVs	2,2%	0,0 %	3,6%	0,0 %	2,4%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	59,5%	55,6%	74,1%	63,6%	66,7%
8 - 30 jours	38,1%	27,8%	16,7%	30,6%	16,6%
1 - 3 mois	2,4%	16,7%	9,3%	4,4%	3,3%
> 3 mois	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	13,3%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	67,4%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	13,0%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	6,5%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	6,5%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG/FTC/TDF	2,2%	–	–	–	–
3TC/AZT/DTG	2,2%	–	–	–	–
DRV/DTG/RTV	2,2%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	75,4%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	5,3%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	3,5%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	3,5%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,8%	–	–	–
3TC/DTG	–	1,8%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	1,8%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,8%	–	–	–
DRV/RAL/RTV	–	1,8%	–	–	–

DTG/RPV	–	1,8%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	83,6%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,6%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	3,6%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	3,6%	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	1,8%	–	–
FTC/RAL/RPV/TDF	–	–	1,8%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	1,8%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	82,2%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	5,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,1%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	4,1%	–
FTC/TDF	–	–	–	2,7%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,4%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	88,1%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	4,8%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	2,4%
3TC/DTG	–	–	–	–	2,4%
BIC/DRV/DTG/FTC/RTV/TAF	–	–	–	–	2,4%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	63,0%	79,8%	53,7%	66,1%	74,0%
3 - 6 mois	19,6%	16,6%	24,1%	20,8%	18,3%
6 - 9 mois	8,7%	1,8%	10,1%	6,6%	7,7%
9 - 12 mois	6,5%	1,8%	2,0%	3,3%	0,0%
> 12 mois	2,2%	0,0%	10,1%	3,3%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	82,6%	96,3%	77,8%	86,9%	92,3%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	90,9%	100,0%	86,4%	91,2%	88,8%
[100 000 - 500 000[copies/ml	85,7%	81,8%	90,9%	.	.
≥500 000 copies/ml	55,6%	100,0%	57,1%	55,6%	100,0%

4.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	19	17	16	16	13
Age					
Médiane	51,8	41,5	39,3	44,1	33,5
q_{25} - q_{75}	35,6 - 58,3	29,0 - 55,1	35,1 - 58,9	31,0 - 54,9	27,8 - 49,0

≥ 60 ans	21,1%	11,8%	25,0%	6,3%	15,4%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	6,3%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	100,0%	70,6%	75,0%	68,8%	69,2%
Femme cis	0,0 %	29,4%	25,0%	31,3%	23,1%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,7%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	89,5%	52,9%	43,8%	37,5%	38,5%
Femme cis France	0,0 %	11,8%	6,3%	6,3%	7,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,3%	5,9%	18,8%	31,3%	23,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	5,9%	6,3%	18,8%	7,7%
Homme cis Autres pays	5,3%	11,8%	12,5%	0,0 %	7,7%
Femme cis Autres pays	0,0 %	11,8%	12,5%	6,3%	7,7%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,7%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	89,5%	75,0%	58,3%	54,6%	55,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,3%	8,3%	25,0%	45,5%	33,3%
Homme cis Autres pays	5,3%	16,7%	16,7%	0,0 %	11,1%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	0,0 %	40,0%	25,0%	20,0%	33,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	20,0%	25,0%	60,0%	33,3%
Femme cis Autres pays	0,0 %	40,0%	50,0%	20,0%	33,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	57,9%	29,4%	37,5%	25,0%	23,1%
UDI	5,3%	0,0 %	6,3%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	21,1%	70,6%	56,3%	62,5%	38,5%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	15,8%	0,0 %	0,0 %	12,5%	38,5%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	0,0 %	0,0 %	12,5%	11,1%	16,7%
Médiane	2017	2021	2022	2021	2022
q_{25} - q_{75}	2013 -2020	2019 -2021	2020 - 2022	2013 -2023	2017 - 2023
IMC kg/m²					
Manquant	42,1%	17,7%	37,5%	56,3%	46,2%
Médiane	21,9	21,4	20,9	21,2	22,6
q_{25} - q_{75}	17,7 - 25,5	20,2 -24,7	17,3 - 22,7	21,1 - 24,4	21,1 - 24,6
Maigre (<18.5)	27,3%	0,0 %	30,0%	14,3%	0,0 %
Normal [18.5-25[	45,5%	78,6%	50,0%	71,4%	85,7%
Surpoids [25-30[	27,3%	14,3%	20,0%	14,3%	14,3%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	7,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3%	0,0 %

0 jour	36,8%	23,5%	6,3%	40,0%	38,5%
1 - 7 jours	36,8%	17,7%	56,3%	33,3%	7,7%
8 - 15 jours	5,3%	35,3%	12,5%	13,3%	7,7%
16 - 30 jours	10,5%	5,9%	12,5%	0,0 %	30,8%
1 - 3 mois	5,3%	5,9%	6,3%	0,0 %	7,7%
> 3 mois	5,3%	11,8%	6,3%	13,3%	7,7%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3%	0,0 %
Médiane	5,7	5,1	5,6	5,6	5,0
q_{25} - q_{75}	4,7- 6,2	4,9- 5,8	5,1- 6,2	5,2- 6,2	4,7- 5,3
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	26,3%	68,5%	43,8%	50,0%	55,6%
3 - 6 mois	36,8%	25,2%	25,0%	21,4%	22,2%
6 - 9 mois	15,8%	6,3%	12,5%	21,4%	22,2%
9 - 12 mois	15,8%	0,0%	6,3%	0,0%	0,0%
> 12 mois	5,3%	0,0%	12,5%	7,1%	0,0%

4.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	2 073	2 140	2 199	2 306	2 308
Age					
Médiane	53,0	53,6	53,8	54,2	55,1
q_{25} - q_{75}	43,4 -61,2	43,3 - 61,5	43,0 - 61,9	43,1 - 62,7	43,8 - 63,5
≥ 60 ans	27,6%	29,7%	30,2%	31,5%	33,9%
≥ 75 ans	3,4%	3,9%	4,2%	4,8%	5,4%
Genre					
Homme cis	70,8%	70,2%	70,0%	68,7%	68,5%
Femme cis	28,6%	29,1%	29,2%	30,3%	30,5%
Transgenre	0,7%	0,7%	0,9%	1,0%	1,0%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	59,3%	58,7%	57,8%	56,1%	55,6%
Femme cis France	13,1%	13,0%	12,5%	12,6%	12,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	4,7%	4,6%	5,0%	5,4%	5,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,3%	12,7%	13,1%	14,3%	14,6%
Homme cis Autres pays	6,8%	6,9%	7,2%	7,2%	7,4%
Femme cis Autres pays	3,2%	3,4%	3,5%	3,4%	3,4%
Autres	0,7%	0,7%	0,9%	1,0%	1,0%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	83,8%	83,6%	82,5%	81,6%	81,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	6,7%	6,5%	7,2%	7,9%	8,2%
Homme cis Autres pays	9,5%	9,9%	10,3%	10,5%	10,8%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	45,8%	44,9%	42,9%	41,6%	41,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	43,1%	43,6%	45,1%	47,1%	47,8%
Femme cis Autres pays	11,2%	11,6%	12,0%	11,3%	11,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	48,1%	47,8%	48,0%	46,6%	46,2%
UDI	6,1%	5,8%	5,8%	5,6%	5,8%
Hétérosexuel	40,8%	41,2%	40,9%	41,7%	42,1%
Hémophilie/Transfusion	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Périnatal	0,5%	0,7%	0,7%	0,9%	1,0%
Autre ou inconnu	2,9%	3,0%	3,1%	3,7%	3,4%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	21,5%	21,5%	20,8%	20,5%	20,7%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	14,7%	14,8%	15,4%	16,4%	16,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,5%
Hétérosexuel Autres pays	3,2%	3,4%	3,3%	3,4%	3,0%
HSH France	43,6%	42,9%	42,6%	40,9%	40,5%
HSH Afrique subsaharienne	1,0%	1,0%	1,3%	1,5%	1,4%

HSH Afrique du Nord	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%
HSH Autre pays	2,8%	3,0%	3,3%	3,4%	3,6%
Autre France	7,8%	7,8%	7,3%	7,7%	7,3%
Autre Afrique subsaharienne	1,3%	1,4%	1,5%	1,9%	2,0%
Autre Afrique du Nord	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Autre Autres pays	1,7%	1,5%	2,0%	1,9%	2,0%
IMC kg/m²					
Manquant	14,6%	11,8%	10,2%	10,3%	12,7%
Médiane	24,9	25,0	25,0	25,1	25,5
q_{25} - q_{75}	22,1 - 28,3	22,3 - 28,2	22,3 - 28,4	22,3 - 28,6	22,5 - 28,7
Maigre (<18.5)	4,6%	3,8%	4,4%	3,8%	3,7%
Normal [18.5-25[	45,9%	45,8%	45,2%	45,5%	42,0%
Surpoids [25-30[	33,1%	33,3%	33,5%	32,5%	34,9%
Obèse (≥ 30)	16,4%	17,2%	16,9%	18,2%	19,4%
Prise en charge au stade de la primo-infection	8,0%	7,8%	7,9%	7,8%	7,5%
Stade SIDA	20,9%	20,6%	20,3%	20,0%	20,2%
Ag HBs +	4,7%	4,6%	4,6%	4,3%	4,1%
Ac VHC +	9,6%	9,5%	9,5%	9,2%	9,6%
Année de diagnostic					
Médiane	2004	2005	2006	2006	2006
q_{25} - q_{75}	1996 -2012	1996 -2013	1997 - 2014	1997 - 2015	1997 - 2016
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3%	0,0 %
≤ 1996	26,8%	25,9%	24,7%	23,9%	23,6%
1997-2004	23,8%	22,8%	22,2%	21,3%	20,8%
2005-2012	24,5%	24,1%	23,6%	23,2%	23,1%
≥ 2013	25,0%	27,2%	29,5%	31,7%	32,5%
Traitement ARV					
En cours	97,4%	97,9%	98,0%	97,2%	98,0%
Antécédents	2,3%	2,0%	1,8%	2,4%	1,6%
Jamais traité	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%	0,4%
Type de traitement					
Monothérapie	1,3%	1,2%	0,9%	0,9%	1,0%
Bithérapie	27,8%	31,7%	35,6%	39,8%	41,9%
Trithérapie	69,2%	65,1%	61,2%	57,4%	55,5%
Plus de 3 ARVs	1,7%	1,9%	2,3%	1,9%	1,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	21,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	12,6%	–	–	–	–
DTG/RPV	12,2%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	9,5%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	8,2%	–	–	–	–
3TC/DTG	6,2%	–	–	–	–

ETV/RAL	4,1%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	3,2%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	2,1%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	1,8%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	25,1%	–	–	–
DTG/RPV	–	13,2%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	11,4%	–	–	–
3TC/DTG	–	9,5%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	6,6%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	6,4%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	4,1%	–	–	–
ETV/RAL	–	3,4%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	2,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	27,0%	–	–
DTG/RPV	–	–	13,6%	–	–
3TC/DTG	–	–	11,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	10,7%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	5,3%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	4,6%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	4,6%	–	–
ETV/RAL	–	–	2,7%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,3%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,8%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	27,4%	–
DTG/RPV	–	–	–	14,0%	–
3TC/DTG	–	–	–	13,3%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	9,7%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	5,5%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	3,8%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	3,6%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	3,4%	–
ETV/RAL	–	–	–	2,5%	–
DOR/DTG	–	–	–	1,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	27,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	15,3%
DTG/RPV	–	–	–	–	14,2%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	8,8%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	6,8%

CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	4,4%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	3,4%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	2,8%
DOR/DTG	–	–	–	–	2,1%
ETV/RAL	–	–	–	–	2,0%
Charge virale					
Manquant	6,7%	6,1%	4,8%	4,5%	7,0%
< 200 copies/mL	97,1%	97,5%	97,8%	97,0%	97,6%
< 50 copies/mL	94,4%	95,0%	94,4%	94,6%	95,5%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,6%	97,7%	97,9%	97,4%	97,7%
< 50 copies/mL	95,0%	95,4%	94,6%	95,1%	95,7%
CD4(/mm^3)					
Manquant	8,4%	8,0%	8,9%	9,5%	10,9%
Médiane	680	664	657	673	678
q_{25} - q_{75}	486 - 911	471 - 893	465 - 868	483 - 895	491 - 896
CD4>500/mm^3	73,0%	71,6%	70,8%	73,1%	73,7%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	10,3%	9,7%	9,7%	10,5%	12,4%
%	42,7%	45,1%	48,0%	46,5%	46,8%

5. CORESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

5.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	19	28	34	55	33
Age					
Médiane	42,4	38,2	40,5	35,4	40,0
q_{25} - q_{75}	25,9 - 56,9	29,5 - 53,6	30,4 - 51,0	25,3 - 49,2	30,7 - 52,7
≥ 60 ans	21,1%	17,9%	11,8%	12,7%	12,1%
≥ 75 ans	5,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	68,4%	85,7%	58,8%	76,4%	75,8%
Femme cis	31,6%	14,3%	41,2%	23,6%	24,2%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	47,4%	67,9%	44,1%	45,5%	51,5%
Femme cis France	10,5%	0,0 %	11,8%	3,6%	6,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	10,5%	10,7%	5,9%	20,0%	15,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	21,1%	10,7%	17,7%	16,4%	18,2%
Homme cis Autres pays	10,5%	7,1%	8,8%	10,9%	9,1%
Femme cis Autres pays	0,0 %	3,6%	11,8%	3,6%	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	69,2%	79,2%	75,0%	59,5%	68,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	15,4%	12,5%	10,0%	26,2%	20,0%
Homme cis Autres pays	15,4%	8,3%	15,0%	14,3%	12,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	33,3%	0,0 %	28,6%	15,4%	25,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	66,7%	75,0%	42,9%	69,2%	75,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	25,0%	28,6%	15,4%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	36,8%	60,7%	32,4%	38,2%	45,5%
UDI	0,0 %	0,0 %	2,9%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	52,6%	39,3%	58,8%	47,3%	42,4%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	10,5%	0,0 %	5,9%	14,6%	12,1%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	26,3%	14,3%	23,5%	16,4%	15,2%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	26,3%	21,4%	20,6%	23,6%	24,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	3,6%	5,9%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	0,0 %	0,0 %	8,8%	7,3%	3,0%
HSH France	26,3%	53,6%	29,4%	25,5%	36,4%
HSH Afrique subsaharienne	5,3%	0,0 %	0,0 %	7,3%	6,1%

HSH Afrique du Nord	0,0 %	3,6%	0,0 %	3,6%	3,0%
HSH Autre pays	5,3%	3,6%	2,9%	1,8%	0,0 %
Autre France	5,3%	0,0 %	2,9%	7,3%	6,1%
Autre Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	2,9%	5,5%	3,0%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,0%
Autre Autres pays	5,3%	0,0 %	2,9%	1,8%	0,0 %
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	37,5%	22,2%	40,0%	35,7%	21,4%
Médiane	2006	2018	2022	2023	2024
q_{25} - q_{75}	2005-2019	2009 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	57,9%	35,7%	41,2%	50,9%	42,4%
Médiane	24,1	24,4	24,9	22,6	22,5
q_{25} - q_{75}	19,2 - 25,0	21,2 - 29,2	20,5 - 27,3	20,5 - 26,4	19,6 - 25,3
Maigre (<18.5)	25,0%	16,7%	10,0%	14,8%	0,0 %
Normal [18.5-25[	50,0%	33,3%	45,0%	55,6%	68,4%
Surpoids [25-30[	25,0%	33,3%	35,0%	14,8%	31,6%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	16,7%	10,0%	14,8%	0,0 %
Statut fumeur					
Inconnu	15,8%	7,1%	14,7%	30,9%	27,3%
Non-fumeur	68,8%	53,9%	41,4%	42,1%	50,0%
Ex-fumeur	18,8%	19,2%	27,6%	26,3%	29,2%
Fumeur actuel	12,5%	26,9%	31,0%	31,6%	20,8%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	22,2%	25,0%	20,0%
Médiane	9,5	15,0	6,0	10,0	11,0
q_{25} - q_{75}	9,0 - 10,0	6,0 - 30,0	1,0 - 10,0	10,0 - 20,0	6,0 - 17,5
Prise en charge au stade de la primo-infection	21,1%	14,3%	5,9%	10,9%	18,2%
Stade SIDA	10,5%	21,4%	14,7%	18,2%	6,1%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	50,0%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	50,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose de l'œsophage	–	33,3%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	33,3%	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	–	16,7%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	16,7%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	60,0%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	20,0%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	20,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	20,0%	–

Sarcome de Kaposi	–	–	–	20,0%	–
Syndrome cachectique inaugural du sida	–	–	–	20,0%	–
Candidose	–	–	–	10,0%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	10,0%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	10,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Infections multiples	–	–	–	–	50,0%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	50,0%
Ag HBs +	0,0 %	3,6%	0,0 %	0,0 %	6,1%
Ac VHC +	0,0 %	0,0 %	5,9%	1,8%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,6%	9,1%
0 jour	5,3%	25,0%	11,8%	28,3%	16,7%
1 - 7 jours	47,4%	35,7%	41,2%	34,0%	50,0%
8 - 15 jours	31,6%	17,9%	26,5%	15,1%	10,0%
16 - 30 jours	10,5%	10,7%	11,8%	5,7%	10,0%
1 - 3 mois	5,3%	10,7%	2,9%	11,3%	6,7%
> 3 mois	0,0 %	0,0 %	5,9%	5,7%	6,7%
Statut à la prise en charge					
Manquant	0,0 %	3,6%	2,9%	10,9%	15,2%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	42,1%	29,6%	33,3%	38,8%	39,3%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	10,5%	22,2%	9,1%	8,2%	17,9%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	21,1%	11,1%	27,3%	16,3%	17,9%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	26,3%	37,0%	30,3%	36,7%	25,0%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	0,0 %	3,6%	2,9%	12,7%	18,2%
Médiane	306	348	325	313	377
q_{25} - q_{75}	108 - 684	145 - 475	142 - 608	149 - 545	176 - 522
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	10,5%	3,6%	2,9%	16,4%	18,2%
%	23,5%	11,1%	15,2%	15,2%	0,0 %
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,1%
Médiane	4,7	5,0	5,0	4,7	4,5
q_{25} - q_{75}	3,6- 5,2	4,1- 6,0	3,5- 6,0	3,9- 5,5	2,6- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	94,7%	92,9%	44,1%	1,8%	9,1%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,7%	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	94,7%	92,9%	44,1%	1,8%	21,2%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Type de traitement					

Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	0,0 %	21,4%	5,9%	7,3%	9,1%
Trithérapie	100,0%	71,4%	91,2%	90,9%	90,9%
Plus de 3 ARVs	0,0 %	0,0 %	2,9%	1,8%	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	44,4%	14,8%	12,5%	50,9%	53,1%
8 - 30 jours	44,4%	63,0%	75,0%	39,6%	40,6%
1 - 3 mois	5,6%	18,5%	12,5%	7,6%	6,3%
> 3 mois	5,6%	3,7%	0,0%	1,9%	0,0%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	68,4%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	10,5%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	5,3%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	5,3%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	5,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	5,3%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	57,1%	–	–	–
3TC/DTG	–	17,9%	–	–	–
Traitement en essai	–	7,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	3,6%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	3,6%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,6%	–	–	–
DRV/RAL/RTV	–	3,6%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	3,6%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	67,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	8,8%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	5,9%	–	–
3TC/DTG	–	–	5,9%	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	2,9%	–	–
DTG/FTC/TAF	–	–	2,9%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	2,9%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	2,9%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	72,7%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	7,3%	–
3TC/DTG	–	–	–	5,5%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	5,5%	–
AZT/FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,8%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,8%	–
DTG/RPV	–	–	–	1,8%	–

EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,8%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	78,8%
3TC/DTG	–	–	–	–	9,1%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	3,0%
3TC/DTG/TDF	–	–	–	–	3,0%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	3,0%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	3,0%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	79,0%	57,1%	55,7%	62,7%	71,1%
3 - 6 mois	5,3%	17,9%	25,3%	19,1%	8,3%
6 - 9 mois	10,5%	10,7%	0,0%	2,3%	5,2%
9 - 12 mois	5,3%	3,6%	6,3%	11,4%	15,5%
> 12 mois	0,0%	10,7%	12,7%	4,6%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	84,2%	75,0%	81,0%	81,7%	79,4%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	100,0%	66,7%	83,3%	100,0%	62,5%
≥500 000 copies/ml	0,0%	44,4%	54,6%	57,1%	66,7%

5.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	5	10	10	18	7
Age					
Médiane	56,9	53,6	41,8	45,6	46,0
q_{25} - q_{75}	42,4 - 66,1	41,4 - 68,4	33,7 - 48,6	33,4 - 54,8	33,0 - 55,2
≥ 60 ans	40,0%	30,0%	20,0%	16,7%	0,0 %
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	100,0%	80,0%	60,0%	77,8%	71,4%
Femme cis	0,0 %	20,0%	40,0%	22,2%	28,6%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	40,0%	40,0%	50,0%	50,0%	28,6%
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	30,0%	5,6%	14,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	30,0%	0,0 %	22,2%	14,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	10,0%	10,0%	11,1%	14,3%
Homme cis Autres pays	40,0%	10,0%	10,0%	5,6%	28,6%
Femme cis Autres pays	0,0 %	10,0%	0,0 %	5,6%	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					

Homme cis France	40,0%	50,0%	83,3%	64,3%	40,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	37,5%	0,0 %	28,6%	20,0%
Homme cis Autres pays	40,0%	12,5%	16,7%	7,1%	40,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	75,0%	25,0%	50,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	50,0%	25,0%	50,0%	50,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	50,0%	0,0 %	25,0%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	40,0%	20,0%	20,0%	27,8%	28,6%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	20,0%	80,0%	70,0%	66,7%	57,1%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	40,0%	0,0 %	10,0%	5,6%	14,3%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	33,3%	16,7%	50,0%	50,0%	50,0%
Médiane	2012	2012	2021	2023	2024
q_{25} - q_{75}	2005 -2019	2009-2018	2021 -2021	2023 -2023	2023 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	60,0%	20,0%	20,0%	38,9%	28,6%
Médiane	18,8	22,3	23,1	22,6	21,5
q_{25} - q_{75}	16,6 - 21,0	18,1 - 26,8	19,2 - 25,3	20,5 - 25,9	20,3 - 25,2
Maigre (<18.5)	50,0%	25,0%	25,0%	18,2%	0,0 %
Normal [18.5-25[	50,0%	37,5%	50,0%	54,6%	60,0%
Surpoids [25-30[	0,0 %	25,0%	12,5%	18,2%	40,0%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	12,5%	12,5%	9,1%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	20,0%	20,0%	0,0 %	38,9%	14,3%
1 - 7 jours	60,0%	40,0%	50,0%	33,3%	57,1%
8 - 15 jours	20,0%	40,0%	30,0%	5,6%	0,0 %
16 - 30 jours	0,0 %	0,0 %	10,0%	11,1%	14,3%
1 - 3 mois	0,0 %	0,0 %	10,0%	5,6%	0,0 %
> 3 mois	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,6%	14,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,1	6,0	6,1	5,4	5,4
q_{25} - q_{75}	3,0- 5,3	5,2- 6,9	5,7- 6,7	4,6- 6,3	2,1- 6,1
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	60,0%	50,0%	40,0%	52,1%	83,3%
3 - 6 mois	0,0%	10,0%	20,0%	29,7%	0,0%
6 - 9 mois	20,0%	10,0%	0,0%	0,0%	.
9 - 12 mois	20,0%	10,0%	20,0%	9,1%	.
> 12 mois	0,0%	20,0%	20,0%	9,1%	.

5.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	1 921	1 949	1 842	1 679	1 726
Age					
Médiane	54,3	55,0	55,7	56,3	56,7
q_{25} - q_{75}	46,2 - 61,2	46,7 - 61,9	47,3 - 62,7	47,3 - 63,5	47,4 - 64,2
≥ 60 ans	29,1%	31,0%	33,1%	36,3%	39,2%
≥ 75 ans	4,2%	4,8%	5,2%	5,3%	6,1%
Genre					
Homme cis	65,8%	65,9%	65,2%	65,2%	65,9%
Femme cis	33,7%	33,7%	34,5%	34,5%	33,7%
Transgenre	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	55,2%	55,1%	54,1%	53,2%	52,8%
Femme cis France	17,8%	17,1%	17,1%	16,5%	15,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	4,4%	4,7%	4,8%	5,2%	5,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,9%	13,6%	14,1%	14,7%	14,5%
Homme cis Autres pays	6,3%	6,2%	6,2%	6,8%	7,2%
Femme cis Autres pays	3,1%	3,0%	3,4%	3,3%	3,2%
Autres	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	83,9%	83,6%	83,1%	81,6%	80,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	6,7%	7,1%	7,3%	8,0%	8,9%
Homme cis Autres pays	9,5%	9,3%	9,6%	10,4%	11,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	52,8%	50,7%	49,5%	47,8%	47,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	38,1%	40,3%	40,7%	42,5%	43,1%
Femme cis Autres pays	9,1%	9,0%	9,8%	9,7%	9,6%
Groupe d'acquisition					
HSH	37,7%	37,9%	37,3%	37,4%	38,3%
UDI	6,3%	6,0%	6,1%	5,7%	5,7%
Hétérosexuel	48,8%	48,9%	49,6%	49,4%	48,2%
Hémophilie/Transfusion	1,1%	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%
Périnatal	0,8%	0,7%	0,5%	0,6%	0,6%
Autre ou inconnu	5,3%	5,4%	5,3%	5,5%	6,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	28,6%	27,9%	27,8%	26,8%	25,7%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	15,7%	16,5%	17,3%	18,1%	18,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,4%	1,3%	1,5%	1,3%	1,2%
Hétérosexuel Autres pays	3,2%	3,1%	3,0%	3,3%	3,1%
HSH France	34,3%	34,4%	33,9%	33,8%	33,8%

HSH Afrique subsaharienne	0,4%	0,5%	0,4%	0,7%	0,9%
HSH Afrique du Nord	0,9%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%
HSH Autre pays	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,8%
Autre France	10,4%	10,1%	9,8%	9,4%	9,6%
Autre Afrique subsaharienne	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%
Autre Afrique du Nord	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%
Autre Autres pays	1,5%	1,3%	1,7%	2,0%	2,0%
IMC kg/m²					
Manquant	27,9%	24,9%	19,3%	20,9%	20,0%
Médiane	25,0	25,1	25,3	25,5	25,6
q_{25} - q_{75}	22,0 - 28,4	22,1 - 28,4	22,3 - 28,7	22,4 - 29,0	22,7 - 29,2
Maigre (<18.5)	5,5%	4,6%	4,0%	4,4%	3,3%
Normal [18.5-25[	44,4%	44,3%	43,9%	42,7%	42,4%
Surpoids [25-30[	33,6%	33,7%	34,2%	33,0%	34,0%
Obèse (≥ 30)	16,5%	17,3%	17,9%	19,9%	20,4%
Prise en charge au stade de la primo-infection	7,8%	7,9%	8,0%	8,0%	8,2%
Stade SIDA	21,1%	21,0%	20,6%	20,4%	20,9%
Ag HBs +	4,9%	5,1%	5,0%	4,9%	5,0%
Ac VHC +	11,6%	11,3%	11,7%	11,7%	11,1%
Année de diagnostic					
Médiane	2004	2004	2005	2005	2005
q_{25} - q_{75}	1995 - 2011	1995 - 2011	1995 - 2012	1995 - 2013	1996 - 2013
Période de diagnostic					
Manquant	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,7%
≤ 1996	30,8%	29,6%	29,0%	28,0%	27,5%
1997-2004	22,4%	22,0%	20,9%	20,0%	19,7%
2005-2012	26,6%	27,1%	27,1%	26,7%	25,9%
≥ 2013	20,3%	21,4%	23,0%	25,4%	27,0%
Traitement ARV					
En cours	97,9%	97,8%	97,9%	98,1%	97,5%
Antécédents	1,9%	2,0%	2,1%	1,9%	2,6%
Jamais traité	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0 %
Type de traitement					
Monothérapie	1,6%	1,6%	1,6%	0,8%	0,8%
Bithérapie	17,5%	20,9%	25,9%	29,8%	31,2%
Trithérapie	77,9%	74,5%	69,4%	66,9%	65,1%
Plus de 3 ARVs	3,0%	2,9%	3,1%	2,6%	2,9%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	20,1%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	14,4%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	12,4%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	8,8%	–	–	–	–

DTG/RPV	7,6%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	2,8%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,6%	–	–	–	–
ETV/RAL	2,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/NVP	2,2%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
FTC/RPV/TAF	–	20,0%	–	–	–
BIC/FTC/TAF	–	15,8%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	12,9%	–	–	–
DTG/RPV	–	8,4%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	7,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,0%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	2,3%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,2%	–	–	–
ETV/RAL	–	2,1%	–	–	–
3TC/ABC/NVP	–	2,0%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	19,9%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	17,4%	–	–
3TC/DTG	–	–	10,8%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	10,4%	–	–
DTG/RPV	–	–	8,2%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	7,7%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	1,9%	–	–
ETV/RAL	–	–	1,8%	–	–
3TC/ABC/NVP	–	–	1,6%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	1,4%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	22,4%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	16,9%	–
3TC/DTG	–	–	–	13,2%	–
DTG/RPV	–	–	–	8,7%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	8,6%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	6,6%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	2,7%	–
ETV/RAL	–	–	–	1,7%	–
3TC/ABC/NVP	–	–	–	1,3%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	1,3%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	23,0%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	16,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	14,2%

DTG/RPV	–	–	–	–	8,9%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	7,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	6,8%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	3,2%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,0%
ETV/RAL	–	–	–	–	1,6%
DOR/DTG	–	–	–	–	1,5%
Charge virale					
Manquant	5,6%	9,8%	9,3%	9,3%	7,4%
< 200 copies/mL	97,5%	97,3%	97,0%	97,7%	98,3%
< 50 copies/mL	94,4%	94,8%	94,3%	95,1%	96,0%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,8%	97,5%	97,0%	97,6%	98,2%
< 50 copies/mL	94,7%	95,0%	94,2%	94,7%	95,6%
CD4(/mm^3)					
Manquant	11,1%	16,1%	17,7%	21,1%	20,7%
Médiane	650	660	660	682	677
q_{25} - q_{75}	466 - 872	474 - 887	468 - 880	482 - 927	487 - 920
CD4>500/mm^3	70,4%	71,2%	71,4%	72,2%	73,5%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	14,1%	19,6%	19,0%	22,0%	21,6%
%	49,2%	50,6%	48,4%	49,4%	49,5%

6. CORESS BRETAGNE

6.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	72	59	85	99	116
Age					
Médiane	37,6	40,2	38,1	37,3	39,9
q_{25} - q_{75}	30,7 - 48,1	30,3 - 50,2	30,4 - 49,3	29,9 - 49,0	29,9 - 49,5
≥ 60 ans	11,1%	10,2%	11,8%	8,1%	10,3%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	2,4%	0,0 %	0,9%
Genre					
Homme cis	75,0%	81,4%	70,6%	68,7%	67,2%
Femme cis	25,0%	18,6%	28,2%	30,3%	30,2%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,0%	2,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	55,6%	59,3%	44,7%	38,4%	41,4%
Femme cis France	6,9%	5,1%	8,2%	5,1%	4,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	11,1%	10,2%	11,8%	19,2%	17,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	15,3%	11,9%	15,3%	20,2%	24,1%
Homme cis Autres pays	8,3%	11,9%	14,1%	11,1%	8,6%
Femme cis Autres pays	2,8%	1,7%	4,7%	5,1%	1,7%
Autres	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,0%	2,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	74,1%	72,9%	63,3%	55,9%	61,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	14,8%	12,5%	16,7%	27,9%	25,6%
Homme cis Autres pays	11,1%	14,6%	20,0%	16,2%	12,8%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	27,8%	27,3%	29,2%	16,7%	14,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	61,1%	63,6%	54,2%	66,7%	80,0%
Femme cis Autres pays	11,1%	9,1%	16,7%	16,7%	5,7%
Groupe d'acquisition					
HSH	48,6%	49,2%	40,0%	37,4%	36,2%
UDI	1,4%	1,7%	1,2%	2,0%	0,9%
Hétérosexuel	41,7%	37,3%	45,9%	51,5%	50,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	2,4%	1,0%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	8,3%	11,9%	10,6%	8,1%	12,1%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	12,5%	11,9%	20,0%	16,2%	19,0%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	23,6%	15,3%	18,8%	28,3%	26,7%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	1,7%	0,0 %	2,0%	1,7%
Hétérosexuel Autres pays	5,6%	8,5%	7,1%	5,1%	3,5%
HSH France	44,4%	44,1%	28,2%	22,2%	25,9%

HSH Afrique subsaharienne	1,4%	3,4%	3,5%	8,1%	6,9%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0%	0,9%
HSH Autre pays	2,8%	1,7%	8,2%	5,1%	2,6%
Autre France	5,6%	8,5%	4,7%	5,1%	2,6%
Autre Afrique subsaharienne	1,4%	3,4%	4,7%	3,0%	7,8%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,9%
Autre Autres pays	2,8%	1,7%	4,7%	3,0%	1,7%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	22,2%	14,3%	10,0%	10,7%	8,2%
Médiane	2019	2020	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2018-2019	2011-2021	2019-2022	2020-2023	2022-2024
IMC kg/m²					
Manquant	50,0%	42,4%	45,9%	57,6%	65,5%
Médiane	22,4	23,2	22,1	23,1	23,4
q_{25} - q_{75}	20,7 - 26,3	20,0 - 23,9	19,8 -25,3	21,2 -28,4	21,3 - 28,5
Maigre (<18.5)	8,3%	11,8%	6,5%	7,1%	5,0%
Normal [18.5-25[	55,6%	70,6%	67,4%	54,8%	57,5%
Surpoids [25-30[	27,8%	14,7%	21,7%	19,1%	20,0%
Obèse (≥ 30)	8,3%	2,9%	4,4%	19,1%	17,5%
Statut fumeur					
Inconnu	61,1%	64,4%	63,5%	76,8%	75,0%
Non-fumeur	25,0%	19,1%	22,6%	26,1%	24,1%
Ex-fumeur	25,0%	66,7%	51,6%	39,1%	41,4%
Fumeur actuel	50,0%	14,3%	25,8%	34,8%	34,5%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,0	15,0	10,0	10,0	15,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 20,0	5,0 - 15,0	15,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,6%	5,1%	5,9%	7,1%	4,3%
Stade SIDA	13,9%	13,6%	10,6%	8,1%	13,8%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	60,0%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	10,0%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	10,0%	–	–	–	–
Infections multiples	10,0%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	10,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	25,0%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	25,0%	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	12,5%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	12,5%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	12,5%	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	12,5%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	33,3%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	22,2%	–	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	22,2%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	11,1%	–	–
Sarcome de Kaposi	–	–	11,1%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	37,5%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	25,0%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	25,0%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	12,5%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	31,3%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	31,3%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	12,5%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	12,5%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	12,5%
Ag HBs +	0,0 %	1,7%	4,7%	6,1%	4,3%
Ac VHC +	1,4%	3,4%	3,5%	2,0%	1,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0%	0,0 %
0 jour	30,6%	27,1%	38,8%	31,6%	37,9%
1 - 7 jours	29,2%	40,7%	20,0%	33,7%	30,2%
8 - 15 jours	12,5%	15,3%	18,8%	13,3%	13,8%
16 - 30 jours	11,1%	6,8%	12,9%	11,2%	8,6%
1 - 3 mois	5,6%	6,8%	3,5%	5,1%	4,3%
> 3 mois	11,1%	3,4%	5,9%	5,1%	5,2%
Statut à la prise en charge					
Manquant	5,6%	5,1%	7,1%	5,1%	2,6%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	33,8%	32,1%	35,4%	35,1%	33,6%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	25,0%	10,7%	15,2%	22,3%	19,5%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	11,8%	25,0%	21,5%	17,0%	15,0%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	29,4%	32,1%	27,9%	25,5%	31,9%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	8,3%	5,1%	9,4%	7,1%	3,5%
Médiane	433	323	351	399	392
q_{25} - q_{75}	195 - 613	182 - 531	195 - 544	220 - 567	179 - 592
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	12,5%	11,9%	15,3%	12,1%	12,1%

%	12,7%	15,4%	12,5%	5,8%	12,8%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,0%	0,9%
Médiane	4,5	5,2	4,8	4,6	4,8
q_{25} - q_{75}	3,6- 5,5	4,3- 5,8	3,8- 5,5	3,7- 5,2	4,1- 5,3
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0%	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	100,0%	100,0%	97,7%	99,0%	95,7%
Type de traitement					
Monothérapie	1,4%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	1,4%	0,0 %	2,4%	5,1%	3,6%
Trithérapie	94,4%	98,3%	96,4%	94,9%	96,4%
Plus de 3 ARVs	2,8%	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	38,0%	52,6%	48,6%	50,0%	54,6%
8 - 30 jours	35,2%	35,1%	40,4%	33,7%	29,4%
1 - 3 mois	21,1%	12,3%	7,3%	9,2%	13,2%
> 3 mois	5,6%	0,0%	3,7%	7,1%	2,8%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	51,4%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	16,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	6,9%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	5,6%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	4,2%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	2,8%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,8%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	1,4%	–	–	–	–
3TC/DTG	1,4%	–	–	–	–
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	1,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	67,8%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	10,2%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	5,1%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	5,1%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	3,4%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	3,4%	–	–	–
ABC/FTC/RPV/TAF	–	1,7%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	1,7%	–	–	–

FTC/RPV/TAF	–	1,7%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	76,8%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	8,5%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	4,9%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	3,7%	–	–
3TC/DTG	–	–	2,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,2%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,2%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	1,2%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	70,4%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	7,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	4,1%	–
3TC/DTG	–	–	–	4,1%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	4,1%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	3,1%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	3,1%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,0%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,0%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,0%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	75,7%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	7,2%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	5,4%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	3,6%
3TC/DTG	–	–	–	–	2,7%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,8%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	1,8%
3TC/DOR/DTG	–	–	–	–	0,9%
DTG/TDF	–	–	–	–	0,9%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	56,9%	59,3%	62,7%	62,5%	66,8%
3 - 6 mois	23,6%	18,6%	23,2%	19,8%	26,5%
6 - 9 mois	12,5%	10,2%	6,4%	4,4%	0,0%
9 - 12 mois	1,4%	6,8%	5,2%	4,7%	.
> 12 mois	5,6%	5,1%	2,6%	8,6%	.
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	80,6%	78,0%	85,8%	82,3%	93,3%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	93,0%	100,0%	92,8%	91,7%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	50,0%	79,0%	81,3%	80,0%	100,0%
≥500 000 copies/ml	54,6%	43,8%	69,2%	50,0%	56,4%

6.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	20	18	22	24	36
Age					
Médiane	38,2	44,5	43,2	37,5	40,4
q_{25} - q_{75}	31,7 - 45,7	32,5 - 56,4	36,9 - 57,1	30,8 - 50,3	31,0 - 48,0
≥ 60 ans	10,0%	16,7%	18,2%	12,5%	13,9%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	70,0%	72,2%	63,6%	62,5%	52,8%
Femme cis	30,0%	27,8%	36,4%	37,5%	44,4%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,8%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	60,0%	50,0%	50,0%	33,3%	27,8%
Femme cis France	5,0%	0,0 %	18,2%	4,2%	5,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,0%	11,1%	4,6%	16,7%	13,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	20,0%	22,2%	13,6%	29,2%	36,1%
Homme cis Autres pays	5,0%	11,1%	9,1%	12,5%	11,1%
Femme cis Autres pays	5,0%	5,6%	4,6%	4,2%	2,8%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,8%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	85,7%	69,2%	78,6%	53,3%	52,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	7,1%	15,4%	7,1%	26,7%	26,3%
Homme cis Autres pays	7,1%	15,4%	14,3%	20,0%	21,1%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	16,7%	0,0 %	50,0%	11,1%	12,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	66,7%	80,0%	37,5%	77,8%	81,3%
Femme cis Autres pays	16,7%	20,0%	12,5%	11,1%	6,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	35,0%	33,3%	36,4%	33,3%	22,2%
UDI	0,0 %	5,6%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	50,0%	44,4%	50,0%	62,5%	61,1%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	15,0%	16,7%	13,6%	4,2%	16,7%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	57,1%	22,2%	0,0 %	6,7%	8,3%
Médiane	2018	2020	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2005-2020	2019-2021	2021 -2022	2018-2023	2019-2024
IMC kg/m²					
Manquant	60,0%	55,6%	68,2%	66,7%	66,7%
Médiane	22,3	20,8	21,3	21,2	23,9

q_{25} - q_{75}	20,2 -25,5	19,5 - 25,9	17,2 - 23,0	20,1 - 22,6	21,7 - 28,7
Maigre (<18.5)	12,5%	12,5%	28,6%	12,5%	0,0 %
Normal [18.5-25[	50,0%	50,0%	57,1%	75,0%	58,3%
Surpoids [25-30[	37,5%	25,0%	14,3%	12,5%	16,7%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	12,5%	0,0 %	0,0 %	25,0%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	35,0%	22,2%	54,6%	25,0%	38,9%
1 - 7 jours	55,0%	61,1%	22,7%	37,5%	33,3%
8 - 15 jours	5,0%	5,6%	9,1%	8,3%	13,9%
16 - 30 jours	5,0%	0,0 %	13,6%	4,2%	2,8%
1 - 3 mois	0,0 %	5,6%	0,0 %	12,5%	5,6%
> 3 mois	0,0 %	5,6%	0,0 %	12,5%	5,6%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,1	5,5	5,5	5,0	5,2
q_{25} - q_{75}	4,2- 5,9	5,1- 5,8	4,7- 5,9	4,2- 5,3	4,6- 5,5
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	50,0%	44,4%	41,8%	50,0%	45,9%
3 - 6 mois	35,0%	27,8%	31,8%	12,5%	48,5%
6 - 9 mois	10,0%	11,1%	15,9%	4,2%	.
9 - 12 mois	0,0%	.	10,6%	12,5%	.
> 12 mois	5,0%	.	0,0%	20,8%	.

6.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	3 556	3 603	3 761	3 863	4 022
Age					
Médiane	52,8	53,6	54,1	54,6	55,1
q_{25} - q_{75}	43,7 - 60,2	44,1 - 61,2	44,3 - 61,8	44,8 - 62,6	44,9 - 63,3
≥ 60 ans	25,7%	29,1%	30,8%	32,9%	35,4%
≥ 75 ans	2,8%	3,5%	3,4%	3,9%	4,7%
Genre					
Homme cis	66,4%	66,6%	66,8%	66,5%	66,3%
Femme cis	33,2%	33,0%	32,9%	33,1%	33,2%
Transgenre	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	56,2%	55,8%	55,0%	54,5%	54,0%
Femme cis France	15,4%	15,2%	14,9%	14,6%	14,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,0%	5,1%	5,5%	5,9%	6,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	15,2%	15,2%	15,1%	15,5%	16,0%
Homme cis Autres pays	5,3%	5,7%	6,3%	6,2%	6,2%
Femme cis Autres pays	2,7%	2,7%	2,9%	3,1%	3,0%

Autres	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	84,6%	83,8%	82,4%	81,9%	81,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	7,5%	7,7%	8,2%	8,8%	9,2%
Homme cis Autres pays	8,0%	8,5%	9,4%	9,3%	9,3%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	46,3%	46,0%	45,2%	44,0%	42,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	45,6%	45,9%	46,0%	46,8%	48,2%
Femme cis Autres pays	8,1%	8,2%	8,8%	9,2%	8,9%
Groupe d'acquisition					
HSH	40,5%	41,0%	41,2%	41,3%	41,0%
UDI	7,3%	6,9%	7,0%	6,5%	6,5%
Hétérosexuel	45,4%	44,7%	44,3%	44,7%	44,9%
Hémophilie/Transfusion	2,6%	2,6%	2,6%	2,3%	2,2%
Périnatal	0,7%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%
Autre ou inconnu	3,5%	3,7%	3,9%	4,2%	4,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	24,5%	23,8%	23,1%	22,9%	22,6%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	17,2%	17,1%	17,3%	17,8%	18,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%
Hétérosexuel Autres pays	3,0%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%
HSH France	37,7%	37,9%	37,5%	37,3%	36,8%
HSH Afrique subsaharienne	0,6%	0,7%	0,7%	0,9%	1,1%
HSH Afrique du Nord	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
HSH Autre pays	1,7%	1,9%	2,4%	2,6%	2,6%
Autre France	9,7%	9,6%	9,6%	9,1%	9,1%
Autre Afrique subsaharienne	2,3%	2,5%	2,6%	2,6%	2,7%
Autre Afrique du Nord	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Autre Autres pays	1,7%	1,8%	2,0%	1,9%	1,9%
IMC kg/m²					
Manquant	21,2%	18,7%	18,8%	19,9%	21,7%
Médiane	24,9	25,0	25,0	24,9	25,3
q_{25} - q_{75}	22,0 - 28,2	22,1 - 28,3	22,1 - 28,4	22,3 - 28,4	22,4 - 28,7
Maigre (<18.5)	4,4%	4,3%	4,9%	4,0%	3,9%
Normal [18.5-25[	46,5%	45,9%	45,4%	46,7%	43,8%
Surpoids [25-30[	32,0%	33,1%	32,6%	31,7%	33,4%
Obèse (≥ 30)	17,1%	16,7%	17,1%	17,6%	18,9%
Prise en charge au stade de la primo-infection	4,6%	4,6%	4,8%	4,7%	4,8%
Stade SIDA	17,7%	17,4%	17,1%	16,7%	16,5%
Ag HBs +	4,7%	4,6%	4,6%	4,5%	4,5%
Ac VHC +	12,9%	12,9%	12,7%	12,1%	11,8%
Année de diagnostic					
Médiane	2003	2004	2004	2005	2005

q_{25} - q_{75}	1994 -2012	1995 -2012	1995 - 2013	1995 - 2014	1996 - 2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
≤ 1996	31,0%	30,5%	29,4%	28,6%	27,6%
1997-2004	22,2%	21,8%	21,0%	20,3%	19,5%
2005-2012	23,9%	23,3%	22,8%	22,5%	22,3%
≥ 2013	23,0%	24,4%	26,8%	28,7%	30,5%
Traitement ARV					
En cours	97,1%	97,7%	97,6%	97,7%	98,0%
Antécédents	2,2%	2,0%	1,9%	2,0%	1,6%
Jamais traité	0,7%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Type de traitement					
Monothérapie	2,4%	2,2%	2,0%	2,0%	2,1%
Bithérapie	13,8%	17,9%	25,9%	32,4%	37,0%
Trithérapie	81,8%	78,3%	70,7%	64,5%	60,0%
Plus de 3 ARVs	2,0%	1,6%	1,4%	1,1%	0,9%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	19,4%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	13,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	10,5%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	9,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	8,0%	–	–	–	–
3TC/DTG	5,3%	–	–	–	–
DTG/RPV	5,1%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,8%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,5%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,9%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
FTC/RPV/TAF	–	18,0%	–	–	–
BIC/FTC/TAF	–	16,4%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	9,3%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	8,5%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,0%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	7,6%	–	–	–
DTG/RPV	–	5,7%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,6%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	19,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	15,9%	–	–
3TC/DTG	–	–	12,3%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	7,9%	–	–

COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	6,2%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	6,1%	–	–
DTG/RPV	–	–	6,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,5%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	3,2%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,7%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	21,0%	–
3TC/DTG	–	–	–	16,8%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	13,7%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	6,4%	–
DTG/RPV	–	–	–	6,3%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	5,3%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	4,9%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	4,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,4%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,3%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	21,5%
3TC/DTG	–	–	–	–	20,4%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	12,2%
DTG/RPV	–	–	–	–	6,8%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	5,9%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	5,6%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	5,0%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	4,5%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	3,3%
3TC/DOR	–	–	–	–	1,2%
Charge virale					
Manquant	5,4%	4,2%	4,6%	4,5%	5,1%
< 200 copies/mL	97,6%	97,5%	97,1%	97,7%	97,3%
< 50 copies/mL	95,1%	94,9%	94,5%	95,3%	95,1%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	98,2%	98,0%	97,4%	98,0%	97,5%
< 50 copies/mL	95,8%	95,5%	94,9%	95,6%	95,3%
CD4(/mm^3)					
Manquant	9,1%	8,4%	9,6%	10,2%	10,7%
Médiane	688	694	697	707	726
q_{25} - q_{75}	491 - 903	500 - 935	505 - 941	510 - 952	526 - 976
CD4>500/mm^3	73,8%	75,0%	75,5%	75,9%	77,8%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	9,8%	9,3%	10,9%	12,0%	11,5%
%	44,9%	46,1%	46,8%	46,9%	48,5%

7. CORESS CENTRE-VAL DE LOIRE

7.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	75	67	87	124	88
Age					
Médiane	37,1	36,9	35,0	35,5	38,0
q_{25} - q_{75}	28,0 - 47,2	26,9 - 42,6	26,4 - 44,0	27,6 - 46,8	31,4 - 49,1
≥ 60 ans	6,7%	9,0%	6,9%	5,7%	6,8%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1%
Genre					
Homme cis	60,0%	59,7%	57,5%	55,7%	54,6%
Femme cis	38,7%	40,3%	42,5%	42,7%	45,5%
Transgenre	1,3%	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	45,3%	40,3%	27,6%	30,7%	30,7%
Femme cis France	13,3%	10,5%	6,9%	5,7%	6,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	8,0%	14,9%	17,2%	20,2%	15,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	24,0%	29,9%	29,9%	36,3%	37,5%
Homme cis Autres pays	6,7%	4,5%	12,6%	4,8%	8,0%
Femme cis Autres pays	1,3%	0,0 %	5,8%	0,8%	1,1%
Autres	1,3%	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	75,6%	67,5%	48,0%	55,1%	56,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,3%	25,0%	30,0%	36,2%	29,2%
Homme cis Autres pays	11,1%	7,5%	22,0%	8,7%	14,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	34,5%	25,9%	16,2%	13,2%	15,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	62,1%	74,1%	70,3%	84,9%	82,5%
Femme cis Autres pays	3,5%	0,0 %	13,5%	1,9%	2,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	37,3%	35,8%	29,9%	25,8%	27,3%
UDI	2,7%	0,0 %	2,3%	3,2%	0,0 %
Hétérosexuel	45,3%	53,7%	55,2%	46,8%	40,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1%
Périnatal	0,0 %	1,5%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	14,7%	9,0%	12,6%	24,2%	30,7%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	18,7%	19,4%	12,6%	10,5%	9,1%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	22,7%	32,8%	31,0%	34,7%	29,6%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	2,3%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	4,0%	1,5%	9,2%	1,6%	2,3%
HSH France	30,7%	29,9%	19,5%	19,4%	18,2%

HSH Afrique subsaharienne	2,7%	3,0%	6,9%	4,0%	5,7%
HSH Afrique du Nord	1,3%	1,5%	2,3%	1,6%	0,0 %
HSH Autre pays	2,7%	1,5%	1,2%	0,8%	3,4%
Autre France	10,7%	1,5%	2,3%	6,5%	10,2%
Autre Afrique subsaharienne	6,7%	9,0%	9,2%	17,7%	18,2%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %
Autre Autres pays	0,0 %	0,0 %	3,5%	1,6%	3,4%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	56,7%	42,4%	26,3%	11,4%	12,7%
Médiane	2017	2019	2021	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2012-2020	2017-2021	2019-2022	2020-2023	2020-2024
IMC kg/m²					
Manquant	74,7%	65,7%	64,4%	70,2%	63,6%
Médiane	21,5	25,6	23,1	22,8	23,5
q_{25} - q_{75}	19,6 - 25,5	21,4 - 28,7	19,6 - 26,5	20,4 - 25,1	20,8 - 28,5
Maigre (<18.5)	10,5%	4,4%	19,4%	2,7%	9,4%
Normal [18.5-25[	63,2%	43,5%	48,4%	70,3%	53,1%
Surpoids [25-30[	10,5%	30,4%	16,1%	13,5%	21,9%
Obèse (≥ 30)	15,8%	21,7%	16,1%	13,5%	15,6%
Statut fumeur					
Inconnu	53,3%	49,3%	70,1%	60,5%	51,1%
Non-fumeur	40,0%	44,1%	46,2%	67,4%	51,2%
Ex-fumeur	31,4%	23,5%	7,7%	10,2%	18,6%
Fumeur actuel	28,6%	32,4%	46,2%	22,5%	30,2%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	20,0%	0,0 %	50,0%	9,1%	7,7%
Médiane	10,0	10,0	15,0	7,5	12,5
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,5	5,0 - 15,0	6,0 - 20,0	5,0 - 20,0	5,5 - 17,5
Prise en charge au stade de la primo-infection	9,3%	13,4%	4,6%	4,0%	8,0%
Stade SIDA	14,7%	11,9%	12,6%	11,3%	13,6%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	36,4%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	18,2%	–	–	–	–
Candidose	9,1%	–	–	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	9,1%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	9,1%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	9,1%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	37,5%	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	12,5%	–	–	–
Candidose	–	12,5%	–	–	–

Cryptococcose extrapulmonaire	–	12,5%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	12,5%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	12,5%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	27,3%	–	–
Cancer invasif du col de l'utérus	–	–	18,2%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	18,2%	–	–
Candidose	–	–	9,1%	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	9,1%	–	–
Infections multiples	–	–	9,1%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	21,4%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	14,3%	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	–	14,3%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	14,3%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	14,3%	–
Candidose	–	–	–	7,1%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	41,7%
Candidose	–	–	–	–	25,0%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	16,7%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	16,7%
Ag HBs +	4,0%	6,0%	5,8%	4,8%	5,7%
Ac VHC +	2,7%	1,5%	10,3%	3,2%	2,3%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	25,3%	34,3%	39,1%	28,2%	29,6%
1 - 7 jours	26,7%	23,9%	25,3%	27,4%	26,1%
8 - 15 jours	16,0%	19,4%	12,6%	20,2%	19,3%
16 - 30 jours	14,7%	9,0%	10,3%	12,9%	8,0%
1 - 3 mois	9,3%	1,5%	6,9%	7,3%	9,1%
> 3 mois	8,0%	11,9%	5,8%	4,0%	8,0%
Statut à la prise en charge					
Manquant	4,0%	1,5%	8,1%	8,9%	10,2%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	33,3%	36,4%	28,8%	25,7%	35,4%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	16,7%	12,1%	17,5%	13,3%	20,3%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	19,4%	24,2%	22,5%	26,6%	13,9%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	30,6%	27,3%	31,3%	34,5%	30,4%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	5,3%	3,0%	9,2%	10,5%	11,4%

Médiane	295	346	348	290	392
q_{25} - q_{75}	184 - 514	220 - 545	196 - 515	154 - 482	144 - 553
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	40,0%	35,8%	41,4%	31,5%	30,7%
%	11,1%	18,6%	11,8%	9,4%	14,8%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,3%	0,0 %	0,0 %	0,8%	1,1%
Médiane	4,7	4,4	4,6	4,8	4,6
q_{25} - q_{75}	4,1 - 5,5	3,4 - 5,4	3,9 - 5,4	3,6 - 5,5	3,5 - 5,4
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	60,0%	49,3%	41,4%	43,6%	37,5%
%	0,0 %	0,0 %	3,9%	5,7%	5,5%
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	60,0%	49,3%	42,5%	47,6%	39,1%
%	3,3%	0,0 %	0,0 %	3,1%	0,0 %
Traitement ARV initié	98,7%	100,0%	97,7%	98,4%	98,9%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	6,8%	16,4%	3,5%	4,1%	9,2%
Trithérapie	87,8%	79,1%	95,3%	94,3%	89,7%
Plus de 3 ARVs	2,7%	0,0 %	0,0 %	0,8%	0,0 %
Inconnu	2,7%	4,5%	1,2%	0,8%	1,2%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	64,9%	58,5%	63,8%	53,7%	51,2%
8 - 30 jours	24,3%	21,5%	21,2%	29,2%	39,3%
1 - 3 mois	6,8%	13,9%	12,5%	11,2%	8,3%
> 3 mois	4,1%	6,2%	2,5%	6,0%	1,2%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	55,6%	–	–	–	–
3TC/DTG	6,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	6,9%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	5,6%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	5,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	5,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	5,6%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	2,8%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	2,8%	–	–	–	–
3TC/DOR/FTC/RAL/TDF	1,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	51,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	14,1%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	7,8%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	4,7%	–	–	–

DTG/FTC/TDF	–	4,7%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	4,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,1%	–	–	–
DTG/RPV	–	3,1%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,1%	–	–	–
3TC/ABC/RAL	–	1,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	64,3%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	11,9%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	4,8%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,6%	–	–
3TC/DTG	–	–	3,6%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	3,6%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	2,4%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	2,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	1,2%	–	–
DRV/DTG/RPV/RTV	–	–	1,2%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	71,9%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	6,6%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	5,8%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	4,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	2,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,5%	–
3TC/DTG	–	–	–	2,5%	–
3TC/ABC/BIC/DTG/FTC/TAF	–	–	–	0,8%	–
DRV/DTG/RTV	–	–	–	0,8%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	0,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	62,8%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	10,5%
3TC/DTG	–	–	–	–	8,1%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	4,7%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	4,7%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	3,5%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	2,3%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	1,2%
EFV/FTC/TDF	–	–	–	–	1,2%
FTC/TDF	–	–	–	–	1,2%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	42,6%	51,4%	51,6%	40,3%	62,0%
3 - 6 mois	20,1%	31,3%	27,9%	20,4%	23,4%
6 - 9 mois	11,5%	6,3%	7,4%	11,3%	10,2%

9 - 12 mois	2,9%	6,3%	4,4%	12,4%	4,4%
> 12 mois	23,0%	4,7%	8,8%	15,6%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	62,7%	82,7%	79,4%	60,7%	85,4%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	75,0%	90,0%	87,6%	61,8%	91,3%
[100 000 - 500 000[copies/ml	69,3%	85,5%	81,3%	63,6%	100,0%
≥500 000 copies/ml	33,3%	50,0%	63,6%	37,5%	25,0%

7.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	22	18	25	39	24
Age					
Médiane	41,7	42,0	37,9	41,1	41,8
q_{25} - q_{75}	35,5 - 50,4	35,4 - 47,6	29,2 - 49,8	33,3 - 52,3	38,3 - 51,7
≥ 60 ans	13,6%	16,7%	12,0%	12,8%	4,2%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	63,6%	50,0%	56,0%	53,9%	45,8%
Femme cis	36,4%	50,0%	44,0%	46,2%	54,2%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	45,5%	27,8%	20,0%	30,8%	25,0%
Femme cis France	0,0 %	5,6%	4,0%	7,7%	0,0 %
Homme cis Afrique subsaharienne	9,1%	16,7%	28,0%	20,5%	12,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	36,4%	44,4%	36,0%	35,9%	50,0%
Homme cis Autres pays	9,1%	5,6%	8,0%	2,6%	8,3%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	4,0%	2,6%	4,2%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	71,4%	55,6%	35,7%	57,1%	54,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	14,3%	33,3%	50,0%	38,1%	27,3%
Homme cis Autres pays	14,3%	11,1%	14,3%	4,8%	18,2%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	0,0 %	11,1%	9,1%	16,7%	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	100,0%	88,9%	81,8%	77,8%	92,3%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	9,1%	5,6%	7,7%
Groupe d'acquisition					
HSH	18,2%	16,7%	32,0%	18,0%	4,2%
UDI	0,0 %	0,0 %	4,0%	2,6%	0,0 %
Hétérosexuel	54,6%	55,6%	56,0%	46,2%	50,0%

Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	5,6%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	27,3%	22,2%	8,0%	33,3%	45,8%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	75,0%	41,7%	26,3%	12,5%	16,7%
Médiane	2015	2019	2022	2022	2022
q_{25} - q_{75}	2005 -2017	2017-2021	2020 -2022	2019 -2023	2019 -2023
IMC kg/m²					
Manquant	54,6%	61,1%	52,0%	71,8%	62,5%
Médiane	21,0	21,4	24,5	22,3	22,3
q_{25} - q_{75}	20,2 - 22,0	20,0 - 27,7	18,2 - 31,5	20,4 - 23,3	20,2 - 23,4
Maigre (<18.5)	0,0 %	14,3%	25,0%	0,0 %	22,2%
Normal [18.5-25[	90,0%	57,1%	33,3%	81,8%	66,7%
Surpoids [25-30[	10,0%	14,3%	8,3%	18,2%	11,1%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	14,3%	33,3%	0,0 %	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	40,9%	50,0%	48,0%	30,8%	37,5%
1 - 7 jours	18,2%	22,2%	24,0%	30,8%	12,5%
8 - 15 jours	18,2%	11,1%	12,0%	18,0%	12,5%
16 - 30 jours	13,6%	5,6%	4,0%	10,3%	8,3%
1 - 3 mois	4,6%	5,6%	8,0%	7,7%	8,3%
> 3 mois	4,6%	5,6%	4,0%	2,6%	20,8%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,2	5,2	5,0	5,3	5,3
q_{25} - q_{75}	4,6- 6,0	4,3- 5,6	4,0- 5,3	4,7- 5,7	4,6- 5,9
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	10,0%	27,8%	36,4%	29,7%	28,1%
3 - 6 mois	40,0%	38,9%	36,4%	27,8%	36,0%
6 - 9 mois	10,0%	5,6%	9,1%	14,2%	.
9 - 12 mois	10,0%	16,7%	9,1%	6,3%	.
> 12 mois	30,0%	11,1%	9,1%	22,0%	.

7.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	2 918	3 133	3 296	3 433	3 490
Age					
Médiane	51,2	51,8	52,3	52,6	53,2
q_{25} - q_{75}	42,0 - 59,6	42,5 - 60,1	42,5 - 60,7	42,6 - 61,1	43,0 - 61,8
≥ 60 ans	23,5%	25,3%	27,0%	27,8%	30,1%
≥ 75 ans	3,0%	3,1%	3,4%	3,8%	4,5%
Genre					
Homme cis	59,1%	58,6%	58,2%	57,1%	56,7%
Femme cis	40,6%	41,1%	41,5%	42,6%	42,9%
Transgenre	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	44,5%	44,0%	42,9%	41,3%	40,9%
Femme cis France	12,9%	12,8%	12,5%	12,3%	12,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	9,8%	9,6%	10,1%	10,8%	10,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	24,7%	25,1%	25,8%	26,9%	27,4%
Homme cis Autres pays	4,8%	5,0%	5,3%	5,0%	5,0%
Femme cis Autres pays	3,0%	3,1%	3,2%	3,4%	3,5%
Autres	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	75,3%	75,1%	73,7%	72,3%	72,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	16,5%	16,4%	17,3%	18,9%	19,1%
Homme cis Autres pays	8,2%	8,6%	9,0%	8,8%	8,9%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	31,7%	31,2%	30,1%	28,9%	28,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	60,9%	61,2%	62,2%	63,1%	63,8%
Femme cis Autres pays	7,4%	7,6%	7,8%	8,0%	8,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	31,0%	31,1%	30,7%	29,9%	29,9%
UDI	5,4%	5,1%	5,0%	4,8%	4,4%
Hétérosexuel	55,9%	55,8%	55,1%	55,3%	55,0%
Hémophilie/Transfusion	1,4%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%
Périnatal	1,4%	1,4%	1,6%	1,7%	1,8%
Autre ou inconnu	5,0%	5,2%	6,2%	6,9%	7,5%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	20,9%	20,7%	19,7%	18,9%	18,5%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	30,6%	30,7%	30,8%	31,6%	31,8%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%
Hétérosexuel Autres pays	3,2%	3,1%	3,3%	3,5%	3,5%
HSH France	28,0%	28,1%	27,6%	26,7%	26,5%
HSH Afrique subsaharienne	1,0%	1,0%	1,2%	1,5%	1,6%
HSH Afrique du Nord	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%

HSH Autre pays	1,4%	1,5%	1,6%	1,3%	1,5%
Autre France	8,7%	8,3%	8,4%	8,2%	8,1%
Autre Afrique subsaharienne	2,9%	3,0%	3,9%	4,5%	4,8%
Autre Afrique du Nord	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Autre Autres pays	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%
IMC kg/m²					
Manquant	34,8%	39,6%	42,8%	45,6%	54,5%
Médiane	25,8	26,0	26,0	26,1	26,4
q_{25} - q_{75}	22,9 - 30,0	22,9 - 29,9	22,8 - 30,0	22,8 - 29,9	23,0 - 30,3
Maigre (<18.5)	3,5%	3,2%	3,5%	3,2%	2,9%
Normal [18.5-25[	40,2%	37,9%	38,9%	38,2%	37,9%
Surpoids [25-30[	31,1%	34,1%	32,8%	33,9%	32,9%
Obèse (≥ 30)	25,3%	24,8%	24,8%	24,7%	26,4%
Prise en charge au stade de la primo-infection	3,9%	3,9%	3,7%	4,0%	4,0%
Stade SIDA	16,0%	16,1%	15,6%	15,4%	15,2%
Ag HBs +	5,4%	5,4%	5,8%	5,8%	5,8%
Ac VHC +	10,1%	9,8%	10,0%	9,8%	9,2%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2006	2006	2007	2007
q_{25} - q_{75}	1997 - 2013	1998 - 2014	1998 - 2014	1998 - 2015	1999 -2015
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
≤ 1996	23,4%	22,3%	21,6%	20,8%	19,9%
1997-2004	24,8%	24,3%	23,6%	22,7%	22,1%
2005-2012	25,5%	25,1%	24,9%	24,1%	24,4%
≥ 2013	26,4%	28,3%	29,9%	32,4%	33,6%
Traitement ARV					
En cours	95,8%	93,8%	94,9%	94,3%	94,4%
Antécédents	3,9%	5,8%	4,7%	5,4%	5,3%
Jamais traité	0,3%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Type de traitement					
Monothérapie	1,9%	1,3%	1,0%	1,2%	1,2%
Bithérapie	22,3%	27,2%	34,7%	39,4%	41,7%
Trithérapie	73,8%	69,8%	62,8%	58,6%	56,2%
Plus de 3 ARVs	2,0%	1,7%	1,5%	0,8%	0,9%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	17,9%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	15,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	10,3%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	9,0%	–	–	–	–
DTG/RPV	7,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	7,6%	–	–	–	–

3TC/DTG	6,7%	–	–	–	–
FTC/TDF	3,8%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,3%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	1,7%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
FTC/RPV/TAF	–	17,4%	–	–	–
BIC/FTC/TAF	–	17,1%	–	–	–
3TC/DTG	–	11,1%	–	–	–
DTG/RPV	–	8,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	8,0%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	7,7%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	7,6%	–	–	–
FTC/TDF	–	3,8%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,1%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,7%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	18,6%	–	–
3TC/DTG	–	–	14,7%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	14,2%	–	–
DTG/RPV	–	–	7,6%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	7,5%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	6,3%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	6,2%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	5,1%	–	–
FTC/TDF	–	–	3,3%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	19,9%	–
3TC/DTG	–	–	–	16,8%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	12,1%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	9,6%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	7,6%	–
DTG/RPV	–	–	–	7,4%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	4,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,2%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	3,7%	–
FTC/TDF	–	–	–	3,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	20,0%
3TC/DTG	–	–	–	–	18,2%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	11,4%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,9%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	7,5%

DTG/RPV	–	–	–	–	7,0%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	5,0%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	4,3%
FTC/TDF	–	–	–	–	2,8%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	2,6%
Charge virale					
Manquant	3,7%	3,7%	3,8%	2,2%	3,2%
< 200 copies/mL	95,0%	95,2%	96,0%	94,7%	95,0%
< 50 copies/mL	91,4%	91,6%	92,5%	91,3%	92,2%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	95,2%	95,3%	96,1%	94,8%	95,1%
< 50 copies/mL	91,7%	91,6%	92,6%	91,3%	92,3%
CD4(/mm^3)					
Manquant	5,4%	5,4%	8,5%	8,0%	10,4%
Médiane	645	642	646	658	665
q_{25} - q_{75}	459 - 874	446 - 874	465 - 860	471 - 884	478 - 894
CD4>500/mm^3	69,5%	68,8%	69,7%	71,4%	71,9%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	32,7%	31,2%	43,8%	38,0%	45,4%
%	45,2%	46,7%	48,7%	46,3%	47,8%

8. CORESS GRAND EST

8.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	127	130	132	149	178
Age					
Médiane	38,1	38,4	40,2	37,6	40,3
q_{25} - q_{75}	29,7 - 48,1	29,6 - 47,9	29,8 - 50,1	30,6 - 51,6	31,1 - 49,9
≥ 60 ans	7,1%	6,9%	12,9%	11,4%	10,1%
≥ 75 ans	0,8%	0,0 %	1,5%	2,0%	1,7%
Genre					
Homme cis	71,7%	69,2%	69,7%	71,8%	65,2%
Femme cis	26,8%	30,0%	29,6%	28,2%	34,3%
Transgenre	1,6%	0,8%	0,8%	0,0 %	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	45,7%	46,9%	44,7%	42,3%	38,8%
Femme cis France	7,1%	8,5%	5,3%	4,0%	3,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,4%	13,1%	9,1%	18,8%	12,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	15,0%	17,7%	17,4%	21,5%	28,1%
Homme cis Autres pays	12,6%	9,2%	15,9%	10,7%	14,0%
Femme cis Autres pays	4,7%	3,9%	6,8%	2,7%	2,8%
Autres	1,6%	0,8%	0,8%	0,0 %	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	63,7%	67,8%	64,1%	58,9%	59,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	18,7%	18,9%	13,0%	26,2%	19,0%
Homme cis Autres pays	17,6%	13,3%	22,8%	15,0%	21,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	26,5%	28,2%	18,0%	14,3%	9,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	55,9%	59,0%	59,0%	76,2%	82,0%
Femme cis Autres pays	17,7%	12,8%	23,1%	9,5%	8,2%
Groupe d'acquisition					
HSH	42,5%	39,2%	40,9%	38,3%	38,2%
UDI	2,4%	3,9%	2,3%	2,0%	1,1%
Hétérosexuel	46,5%	46,9%	47,0%	47,0%	53,4%
Hémophilie/Transfusion	1,6%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,8%	0,0 %	0,7%	0,0 %
Autre ou inconnu	7,1%	9,2%	9,9%	12,1%	7,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	18,1%	19,2%	14,4%	14,1%	12,9%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	19,7%	23,1%	22,0%	26,2%	32,6%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,4%	0,8%	1,5%	1,3%	2,3%
Hétérosexuel Autres pays	6,3%	3,9%	9,1%	5,4%	5,6%
HSH France	31,5%	28,5%	29,6%	27,5%	27,0%

HSH Afrique subsaharienne	3,9%	5,4%	4,6%	6,0%	5,6%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,8%	1,5%	1,3%	1,7%
HSH Autre pays	7,1%	4,6%	5,3%	3,4%	3,9%
Autre France	3,2%	7,7%	6,1%	4,7%	2,8%
Autre Afrique subsaharienne	4,7%	2,3%	0,0 %	8,1%	2,3%
Autre Afrique du Nord	0,8%	0,8%	0,8%	0,0 %	0,6%
Autre Autres pays	2,4%	3,1%	5,3%	2,0%	2,8%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	3,3%	10,3%	10,6%	8,8%	7,8%
Médiane	2019	2019	2021	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2007 - 2019	2016 - 2021	2019 - 2022	2022 -2023	2019 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	25,2%	39,2%	28,8%	38,3%	28,7%
Médiane	23,1	22,8	23,0	24,3	24,0
q_{25} - q_{75}	20,2 - 25,9	19,2 - 25,6	20,1 - 26,2	21,8 - 27,7	21,0 - 27,1
Maigre (<18.5)	11,6%	11,4%	12,8%	7,6%	6,3%
Normal [18.5-25[	57,9%	60,8%	51,1%	48,9%	55,1%
Surpoids [25-30[	20,0%	20,3%	27,7%	27,2%	29,1%
Obèse (≥ 30)	10,5%	7,6%	8,5%	16,3%	9,5%
Statut fumeur					
Inconnu	33,1%	40,8%	37,1%	47,0%	35,4%
Non-fumeur	11,8%	11,7%	18,1%	24,1%	27,8%
Ex-fumeur	56,5%	55,8%	51,8%	53,2%	45,2%
Fumeur actuel	31,8%	32,5%	30,1%	22,8%	27,0%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,5%	9,2%	5,3%	2,0%	3,4%
Stade SIDA	15,8%	16,2%	18,2%	9,4%	11,2%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Candidose de l'œsophage	25,0%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	25,0%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	10,0%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	10,0%	–	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	5,0%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	5,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					

Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	38,1%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	19,1%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	14,3%	–	–	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	9,5%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	4,8%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	4,8%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Candidose de l'œsophage	–	–	20,8%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	16,7%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	16,7%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	16,7%	–	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	8,3%	–	–
Encéphalopathie due au VIH	–	–	4,2%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	42,9%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	28,6%	–
Autres infections bactériennes	–	–	–	7,1%	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	–	7,1%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	7,1%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	7,1%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	30,0%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	20,0%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	10,0%
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	10,0%
Infections multiples	–	–	–	–	10,0%
Encéphalopathie due au VIH	–	–	–	–	5,0%
Ag HBs +	1,6%	3,9%	3,8%	4,7%	3,4%
Ac VHC +	3,2%	3,9%	3,0%	3,4%	4,5%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,8%	0,0 %	0,0 %
0 jour	11,8%	20,0%	18,3%	22,2%	15,2%
1 - 7 jours	35,4%	32,3%	22,9%	30,2%	30,9%
8 - 15 jours	22,1%	26,2%	22,9%	16,1%	23,6%
16 - 30 jours	14,2%	9,2%	17,6%	13,4%	14,0%
1 - 3 mois	6,3%	4,6%	6,9%	4,7%	9,6%

> 3 mois	10,2%	7,7%	11,5%	13,4%	6,7%
Statut à la prise en charge					
Manquant	3,2%	3,1%	3,8%	4,0%	3,9%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	28,5%	31,8%	31,5%	23,1%	28,7%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	15,5%	12,7%	11,0%	20,3%	17,0%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	22,0%	19,8%	22,1%	28,0%	21,6%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	34,2%	35,7%	35,4%	28,7%	32,8%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	3,9%	3,1%	5,3%	4,7%	5,1%
Médiane	318	308	311	300	310
q_{25} - q_{75}	160 - 499	150 - 508	133 - 566	171 - 478	165 - 510
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	8,7%	9,2%	12,1%	8,7%	11,8%
%	4,3%	13,6%	11,2%	11,0%	8,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	1,5%	2,7%	1,7%
Médiane	5,0	5,0	4,8	4,9	4,9
q_{25} - q_{75}	4,4 - 5,6	4,0 - 5,7	3,6 - 5,7	4,1 - 5,6	3,9 - 5,6
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,8%	0,0 %	0,0 %	0,7%	0,0 %
Traitement ARV initié	100,0%	99,2%	98,5%	95,3%	98,9%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	6,3%	4,7%	3,1%	1,4%	2,8%
Trithérapie	92,1%	94,6%	95,4%	96,5%	96,0%
Plus de 3 ARVs	1,6%	0,8%	1,5%	2,1%	1,1%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	51,2%	59,5%	57,9%	59,5%	61,6%
8 - 30 jours	36,2%	31,0%	35,1%	30,4%	30,9%
1 - 3 mois	9,5%	7,9%	5,5%	6,5%	5,2%
> 3 mois	3,2%	1,6%	1,6%	3,6%	2,3%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	51,2%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	18,9%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	7,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	5,5%	–	–	–	–

3TC/ABC/DTG	3,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	1,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/RAL	1,6%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	1,6%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	0,8%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	55,0%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	15,5%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	12,4%	–	–	–
3TC/DTG	–	3,9%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	3,1%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	3,1%	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	1,6%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	1,6%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TDF	–	0,8%	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	0,8%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	66,2%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	12,3%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	8,5%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	4,6%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	2,3%	–	–
3TC/DTG	–	–	2,3%	–	–
3TC/ABC/DTG/T20	–	–	0,8%	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	0,8%	–	–
DRV/RAL/RTV	–	–	0,8%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	0,8%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	70,4%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	8,5%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	7,8%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	3,5%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	2,8%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	1,4%	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	–	1,4%	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	–	0,7%	–
3TC/COBI/DOR/EVG/FTC/TAF/TDF	–	–	–	0,7%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	0,7%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	75,6%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	12,5%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	4,6%

3TC/DTG	–	–	–	–	2,8%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	1,7%
3TC/ABC/AZT/BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	0,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	0,6%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	0,6%
DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	0,6%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	0,6%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	66,5%	62,4%	57,2%	55,1%	73,6%
3 - 6 mois	15,9%	19,6%	15,9%	23,1%	11,0%
6 - 9 mois	8,0%	9,0%	13,9%	9,8%	11,7%
9 - 12 mois	4,8%	1,6%	3,5%	4,5%	3,7%
> 12 mois	4,8%	7,4%	9,6%	7,5%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	82,5%	82,0%	73,1%	78,2%	84,6%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	93,3%	93,8%	87,0%	84,4%	93,8%
[100 000 - 500 000[copies/ml	68,8%	81,0%	66,5%	73,5%	86,8%
≥500 000 copies/ml	72,0%	53,8%	53,6%	70,7%	60,9%

8.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	42	45	45	41	56
Age					
Médiane	41,7	46,0	45,3	40,2	41,9
q_{25} - q_{75}	32,4 - 54,3	35,1 - 54,5	31,7 - 54,2	32,6 - 56,2	32,8 - 53,0
≥ 60 ans	14,3%	15,6%	15,6%	19,5%	10,7%
≥ 75 ans	2,4%	0,0 %	4,4%	0,0 %	3,6%
Genre					
Homme cis	61,9%	71,1%	73,3%	68,3%	62,5%
Femme cis	38,1%	28,9%	26,7%	31,7%	37,5%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	31,0%	51,1%	42,2%	29,3%	41,1%
Femme cis France	7,1%	4,4%	4,4%	4,9%	1,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	19,1%	11,1%	8,9%	24,4%	7,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	21,4%	20,0%	13,3%	22,0%	30,4%
Homme cis Autres pays	11,9%	8,9%	22,2%	14,6%	14,3%
Femme cis Autres pays	9,5%	4,4%	8,9%	4,9%	5,4%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	50,0%	71,9%	57,6%	42,9%	65,7%

Homme cis Afrique subsaharienne	30,8%	15,6%	12,1%	35,7%	11,4%
Homme cis Autres pays	19,2%	12,5%	30,3%	21,4%	22,9%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	18,8%	15,4%	16,7%	15,4%	4,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	56,3%	69,2%	50,0%	69,2%	81,0%
Femme cis Autres pays	25,0%	15,4%	33,3%	15,4%	14,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	28,6%	33,3%	33,3%	26,8%	21,4%
UDI	7,1%	2,2%	2,2%	4,9%	0,0 %
Hétérosexuel	54,8%	46,7%	48,9%	56,1%	66,1%
Hémophilie/Transfusion	2,4%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	2,2%	0,0 %	2,4%	0,0 %
Autre ou inconnu	7,1%	15,6%	15,6%	9,8%	12,5%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	0,0 %	15,0%	4,2%	11,1%	12,5%
Médiane	2019	2020	2021	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2008-2019	2016-2021	2019 -2022	2018 -2023	2020 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	26,2%	37,8%	28,9%	39,0%	32,1%
Médiane	22,5	21,5	21,1	22,9	22,0
q_{25} - q_{75}	19,6 - 25,7	19,2 - 24,7	18,5 - 23,6	20,0 - 26,6	19,0 - 24,5
Maigre (<18.5)	16,1%	10,7%	25,0%	16,0%	10,5%
Normal [18.5-25[	58,1%	67,9%	56,3%	44,0%	68,4%
Surpoids [25-30[	19,4%	17,9%	12,5%	24,0%	15,8%
Obèse (≥ 30)	6,5%	3,6%	6,3%	16,0%	5,3%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	19,1%	42,2%	28,9%	43,9%	23,2%
1 - 7 jours	40,5%	24,4%	26,7%	19,5%	32,1%
8 - 15 jours	9,5%	13,3%	13,3%	9,8%	23,2%
16 - 30 jours	7,1%	4,4%	8,9%	4,9%	7,1%
1 - 3 mois	7,1%	4,4%	6,7%	4,9%	7,1%
> 3 mois	16,7%	11,1%	15,6%	17,1%	7,1%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	2,2%	2,4%	0,0 %
Médiane	5,6	5,5	5,8	5,6	5,3
q_{25} - q_{75}	4,9 - 6,0	5,0 - 6,0	5,2 - 6,2	5,1 - 6,0	4,8 - 6,0
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	48,7%	50,4%	37,5%	34,2%	59,9%
3 - 6 mois	19,5%	14,9%	20,8%	32,6%	18,2%
6 - 9 mois	14,7%	14,9%	19,5%	19,4%	21,9%
9 - 12 mois	4,9%	5,0%	2,8%	2,8%	0,0%
> 12 mois	12,2%	14,9%	19,5%	11,1%	0,0%

8.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	5 101	5 176	5 264	5 427	5 727
Age					
Médiane	50,9	51,5	52,3	52,8	53,2
q_{25} - q_{75}	41,8 - 59,3	42,3 - 60,0	42,6 - 60,7	43,0 - 61,4	43,3 - 61,9
≥ 60 ans	23,1%	24,9%	26,8%	28,6%	30,1%
≥ 75 ans	2,1%	2,6%	3,1%	3,8%	4,1%
Genre					
Homme cis	68,9%	68,9%	68,1%	68,0%	67,6%
Femme cis	30,6%	30,6%	31,5%	31,5%	31,8%
Transgenre	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	52,5%	52,1%	50,8%	50,3%	49,9%
Femme cis France	11,1%	11,0%	11,0%	10,3%	10,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	7,7%	7,7%	7,6%	8,0%	8,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	16,0%	16,1%	16,5%	17,3%	18,0%
Homme cis Autres pays	8,7%	9,1%	9,7%	9,7%	9,7%
Femme cis Autres pays	3,6%	3,6%	4,0%	3,9%	3,9%
Autres	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	76,1%	75,6%	74,7%	74,0%	73,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	11,2%	11,2%	11,2%	11,8%	11,9%
Homme cis Autres pays	12,7%	13,2%	14,2%	14,3%	14,4%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	36,1%	35,8%	35,0%	32,8%	31,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	52,2%	52,4%	52,4%	54,9%	56,5%
Femme cis Autres pays	11,7%	11,8%	12,6%	12,3%	12,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	43,0%	42,7%	42,2%	42,0%	42,4%
UDI	4,3%	4,2%	4,1%	4,0%	3,6%
Hétérosexuel	44,6%	44,7%	45,3%	45,4%	45,2%
Hémophilie/Transfusion	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Périnatal	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%
Autre ou inconnu	5,7%	6,0%	5,9%	6,0%	6,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	19,5%	19,5%	19,2%	18,8%	18,1%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	19,7%	19,7%	20,0%	20,8%	21,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,4%	1,4%	1,5%	1,3%	1,4%
Hétérosexuel Autres pays	4,0%	4,2%	4,6%	4,6%	4,5%
HSH France	37,2%	36,6%	35,8%	35,5%	35,4%
HSH Afrique subsaharienne	1,3%	1,4%	1,4%	1,5%	1,7%
HSH Afrique du Nord	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%

HSH Autre pays	3,9%	4,1%	4,4%	4,4%	4,5%
Autre France	7,1%	7,2%	7,1%	6,7%	6,6%
Autre Afrique subsaharienne	2,7%	2,8%	2,6%	3,0%	3,1%
Autre Afrique du Nord	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Autre Autres pays	2,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,3%
IMC kg/m²					
Manquant	20,4%	11,7%	11,8%	10,4%	12,0%
Médiane	25,3	25,4	25,3	25,5	25,7
q_{25} - q_{75}	22,4 - 28,5	22,6 - 28,7	22,6 - 28,7	22,7 - 28,9	22,9 - 29,2
Maigre (<18.5)	4,1%	3,7%	4,1%	3,8%	3,1%
Normal [18.5-25[	43,5%	42,7%	43,4%	42,0%	40,3%
Surpoids [25-30[	34,3%	34,9%	33,8%	34,9%	35,8%
Obèse (≥ 30)	18,0%	18,6%	18,7%	19,3%	20,9%
Prise en charge au stade de la primo-infection	8,3%	8,2%	8,1%	8,1%	7,7%
Stade SIDA	16,2%	16,3%	16,6%	16,0%	15,9%
Ag HBs +	5,5%	5,6%	5,8%	5,8%	5,6%
Ac VHC +	9,0%	9,1%	8,9%	8,9%	8,6%
Année de diagnostic					
Médiane	2006	2007	2007	2008	2008
q_{25} - q_{75}	1998 - 2013	1998 - 2014	1998 - 2015	1999 - 2015	2000 - 2016
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0 %	0,0 %
≤ 1996	22,6%	22,2%	21,3%	20,0%	19,1%
1997-2004	21,3%	20,6%	20,4%	19,9%	19,1%
2005-2012	28,4%	27,6%	26,7%	26,6%	25,8%
≥ 2013	27,8%	29,7%	31,6%	33,4%	36,0%
Traitement ARV					
En cours	97,6%	97,7%	97,6%	97,4%	98,5%
Antécédents	1,9%	1,9%	2,0%	2,1%	1,2%
Jamais traité	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,3%
Type de traitement					
Monothérapie	1,8%	1,8%	1,8%	1,9%	1,9%
Bithérapie	21,7%	27,9%	34,9%	38,9%	41,5%
Trithérapie	75,4%	69,2%	62,2%	58,3%	55,9%
Plus de 3 ARVs	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,7%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	17,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	15,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	14,8%	–	–	–	–
3TC/DTG	8,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	7,8%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	5,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,9%	–	–	–	–

3TC/ABC/NVP	2,8%	–	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	2,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	2,1%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	19,0%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	14,8%	–	–	–
3TC/DTG	–	14,7%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	12,2%	–	–	–
DTG/RPV	–	7,8%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	3,8%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,3%	–	–	–
3TC/ABC/NVP	–	2,3%	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	1,7%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,5%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	21,0%	–	–
3TC/DTG	–	–	19,3%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	12,9%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,2%	–	–
DTG/RPV	–	–	8,1%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	2,6%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,5%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,9%	–	–
3TC/ABC/NVP	–	–	1,8%	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	1,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	23,1%	–
3TC/DTG	–	–	–	21,7%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	11,9%	–
DTG/RPV	–	–	–	8,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	7,3%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	4,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,5%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	1,9%	–
3TC/ABC/NVP	–	–	–	1,4%	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	–	1,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	24,3%
3TC/DTG	–	–	–	–	23,3%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	11,4%
DTG/RPV	–	–	–	–	7,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	6,8%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	6,1%

3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,8%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	1,5%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	1,1%
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	–	–	1,0%
Charge virale					
Manquant	5,4%	3,0%	4,0%	3,6%	3,7%
< 200 copies/mL	96,6%	96,6%	96,4%	96,9%	96,8%
< 50 copies/mL	93,1%	93,7%	93,3%	94,1%	93,6%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,0%	97,0%	96,9%	97,4%	97,0%
< 50 copies/mL	93,7%	94,2%	93,9%	94,7%	93,8%
CD4(/mm^3)					
Manquant	7,5%	5,3%	7,2%	7,1%	7,5%
Médiane	651	656	658	666	673
q_{25} - q_{75}	463 - 877	471 - 877	465 - 883	480 - 889	482 - 900
CD4>500/mm^3	70,1%	71,3%	70,8%	72,6%	73,0%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	8,9%	6,7%	9,0%	8,9%	8,9%
%	43,8%	45,9%	46,8%	48,7%	47,6%

9. CORESS GUADELOUPE

9.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	66	66	71	60	46
Age					
Médiane	39,6	38,6	37,7	39,8	36,6
q_{25} - q_{75}	28,7 - 46,0	27,2 - 57,2	28,3 - 53,2	28,1 - 53,0	25,6 - 45,4
≥ 60 ans	12,1%	15,2%	11,3%	13,3%	8,7%
≥ 75 ans	1,5%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	59,1%	57,6%	69,0%	61,7%	80,4%
Femme cis	40,9%	42,4%	31,0%	35,0%	19,6%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,3%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	34,9%	42,4%	45,1%	46,7%	56,5%
Femme cis France	9,1%	16,7%	8,5%	15,0%	13,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	1,5%	0,0 %	0,0 %	1,7%	0,0 %
Homme cis Autres pays	24,2%	15,2%	23,9%	15,0%	23,9%
Femme cis Autres pays	30,3%	25,8%	22,5%	18,3%	6,5%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,3%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	59,0%	73,7%	65,3%	75,7%	70,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	41,0%	26,3%	34,7%	24,3%	29,7%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	22,2%	39,3%	27,3%	42,9%	66,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	3,7%	0,0 %	0,0 %	4,8%	0,0 %
Femme cis Autres pays	74,1%	60,7%	72,7%	52,4%	33,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	22,7%	24,2%	28,2%	36,7%	50,0%
UDI	0,0 %	0,0 %	1,4%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	75,8%	74,2%	69,0%	56,7%	41,3%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	1,5%	1,5%	1,4%	6,7%	8,7%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	25,8%	34,9%	25,4%	30,0%	23,9%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	1,5%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	48,5%	39,4%	43,7%	26,7%	17,4%
HSH France	18,2%	24,2%	25,4%	31,7%	43,5%

HSH Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Autre pays	4,6%	0,0 %	2,8%	5,0%	6,5%
Autre France	0,0 %	0,0 %	2,8%	3,3%	2,2%
Autre Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,7%	0,0 %
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	1,5%	1,5%	0,0 %	1,7%	6,5%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	8,1%	7,4%	0,0 %	0,0 %	14,3%
Médiane	2019	2015	2018	2018	2013
q_{25} - q_{75}	2013 - 2019	2005 - 2019	1999 -2020	2004 -2021	2000 -2019
IMC kg/m²					
Manquant	40,9%	28,8%	36,6%	31,7%	39,1%
Médiane	23,1	24,1	22,6	23,5	23,4
q_{25} - q_{75}	19,9 - 28,4	21,3 - 27,5	20,7 - 26,1	20,0 - 25,5	20,1 - 24,9
Maigre (<18.5)	12,8%	2,1%	11,1%	14,6%	10,7%
Normal [18.5-25[	43,6%	53,2%	60,0%	58,5%	64,3%
Surpoids [25-30[	23,1%	29,8%	22,2%	14,6%	17,9%
Obèse (≥ 30)	20,5%	14,9%	6,7%	12,2%	7,1%
Statut fumeur					
Inconnu	57,6%	42,4%	59,2%	48,3%	43,5%
Non-fumeur	42,9%	29,0%	13,8%	19,4%	19,2%
Ex-fumeur	35,7%	57,9%	62,1%	61,3%	46,2%
Fumeur actuel	21,4%	13,2%	24,1%	19,4%	34,6%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	4,6%	7,6%	14,1%	11,7%	13,0%
Stade SIDA	24,2%	10,6%	16,9%	23,3%	15,2%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Candidose de l'œsophage	37,5%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	18,8%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	6,3%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	6,3%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	6,3%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose de l'œsophage	–	42,9%	–	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	14,3%	–	–	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	14,3%	–	–	–

Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	14,3%	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	14,3%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	–	16,7%	–	–
Infections multiples	–	–	16,7%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	8,3%	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	8,3%	–	–
Cryptosporidiose intestinale > 1 mois	–	–	8,3%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	8,3%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	28,6%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	28,6%	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	–	14,3%	–
Cancer invasif du col de l'utérus	–	–	–	7,1%	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	7,1%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	7,1%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	28,6%
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	–	–	–	14,3%
Infections multiples	–	–	–	–	14,3%
Leuco-encéphalopathie multifocale progressive	–	–	–	–	14,3%
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	–	–	14,3%
Rétinite à CMV avec perte de la vision	–	–	–	–	14,3%
Ag HBs +	6,1%	0,0 %	2,8%	1,7%	0,0 %
Ac VHC +	1,5%	1,5%	2,8%	1,7%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	13,6%	13,6%	14,1%	25,0%	21,7%
1 - 7 jours	21,2%	16,7%	19,7%	18,3%	10,9%
8 - 15 jours	19,7%	24,2%	22,5%	23,3%	28,3%
16 - 30 jours	19,7%	19,7%	18,3%	26,7%	19,6%
1 - 3 mois	16,7%	13,6%	18,3%	3,3%	13,0%
> 3 mois	9,1%	12,1%	7,0%	3,3%	6,5%
Statut à la prise en charge					
Manquant	21,2%	10,6%	5,6%	0,0 %	6,5%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	19,2%	27,1%	32,8%	36,7%	37,2%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	15,4%	15,3%	20,9%	13,3%	20,9%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	23,1%	25,4%	16,4%	15,0%	16,3%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	42,3%	32,2%	29,9%	35,0%	25,6%

CD4 (/mm³)					
Manquant	25,8%	12,1%	5,6%	1,7%	6,5%
Médiane	247	294	360	350	416
q_{25} - q_{75}	106 - 408	157 - 499	174 - 579	159 - 561	259 - 544
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	34,9%	19,7%	11,3%	11,7%	6,5%
%	4,7%	11,3%	11,1%	11,3%	11,6%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	2,8%	0,0 %	0,0 %
Médiane	4,7	4,4	4,5	4,7	4,4
q_{25} - q_{75}	3,7- 5,1	3,8- 5,0	3,5- 5,2	4,2- 5,4	3,6- 5,1
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	2,8%	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	98,5%	100,0%	97,2%	95,0%	93,5%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3%
Bithérapie	10,8%	4,6%	0,0 %	8,8%	4,7%
Trithérapie	89,2%	93,9%	98,6%	91,2%	93,0%
Plus de 3 ARVs	0,0 %	1,5%	1,5%	0,0 %	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	37,4%	54,6%	56,5%	50,7%	53,6%
8 - 30 jours	46,1%	36,4%	30,4%	42,3%	41,4%
1 - 3 mois	11,5%	7,6%	8,7%	5,3%	2,5%
> 3 mois	4,9%	1,5%	4,4%	1,8%	2,5%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	56,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	12,3%	–	–	–	–
3TC/DTG	7,7%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	6,2%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	4,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	4,6%	–	–	–	–
DRV/DTG/RTV	3,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	1,5%	–	–	–	–
3TC/DTG/TDF	1,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	1,5%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	77,3%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	7,6%	–	–	–

DTG/FTC/TDF	–	4,6%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	1,5%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,5%	–	–	–
3TC/DTG	–	1,5%	–	–	–
DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	–	1,5%	–	–	–
DRV/DTG/RTV	–	1,5%	–	–	–
DTG/RPV	–	1,5%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,5%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	78,3%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	8,7%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	7,3%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	2,9%	–	–
3TC/ABC/AZT/BIC/FTC/TAF	–	–	1,5%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,5%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	84,2%	–
3TC/DTG	–	–	–	5,3%	–
DRV/DTG/RTV	–	–	–	3,5%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	3,5%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	1,8%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	90,7%
DTG/RPV	–	–	–	–	4,7%
DTG	–	–	–	–	2,3%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	2,3%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	48,6%	67,1%	66,9%	74,3%	58,1%
3 - 6 mois	23,2%	9,4%	22,1%	12,8%	38,4%
6 - 9 mois	14,9%	7,8%	4,7%	4,3%	.
9 - 12 mois	0,0%	6,3%	3,2%	2,9%	.
> 12 mois	13,3%	9,4%	3,2%	5,7%	.
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	71,8%	76,5%	89,0%	87,2%	96,5%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	87,8%	94,7%	97,6%	96,4%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	61,9%	60,0%	77,1%	88,9%	100,0%
≥500 000 copies/ml	33,3%	33,3%	77,8%	60,0%	.

9.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	22	19	20	21	11
Age					
Médiane	44,0	48,0	44,2	49,5	45,4
q_{25} - q_{75}	34,0 - 49,1	33,8 - 61,6	36,1 - 54,5	37,7 - 61,1	37,3 - 62,5
≥ 60 ans	9,1%	31,6%	10,0%	28,6%	27,3%
≥ 75 ans	4,6%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	68,2%	79,0%	75,0%	71,4%	72,7%
Femme cis	31,8%	21,1%	25,0%	23,8%	27,3%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,8%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	27,3%	36,8%	35,0%	47,6%	36,4%
Femme cis France	9,1%	15,8%	5,0%	4,8%	27,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	40,9%	42,1%	40,0%	23,8%	36,4%
Femme cis Autres pays	22,7%	5,3%	20,0%	19,1%	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,8%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	40,0%	46,7%	46,7%	66,7%	50,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	60,0%	53,3%	53,3%	33,3%	50,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	28,6%	75,0%	20,0%	20,0%	100,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	71,4%	25,0%	80,0%	80,0%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	9,1%	5,3%	5,0%	33,3%	45,5%
UDI	0,0 %	0,0 %	5,0%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	90,9%	94,7%	85,0%	61,9%	45,5%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	0,0 %	0,0 %	5,0%	4,8%	9,1%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	7,1%	22,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	2018	2014	2019	2014	2006
q_{25} - q_{75}	2012 - 2019	1999 - 2019	2009-2020	2004-2018	1995 -2018
IMC kg/m²					
Manquant	45,5%	31,6%	55,0%	33,3%	36,4%

Médiane	20,4	22,4	20,7	21,1	22,2
q_{25} - q_{75}	19,1 - 24,5	20,2 - 24,4	17,7 - 21,4	17,7 - 24,1	19,3 - 24,0
Maigre (<18.5)	16,7%	7,7%	33,3%	35,7%	14,3%
Normal [18.5-25[	58,3%	69,2%	55,6%	57,1%	71,4%
Surpoids [25-30[	16,7%	15,4%	11,1%	7,1%	14,3%
Obèse (≥ 30)	8,3%	7,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	31,8%	21,1%	30,0%	28,6%	72,7%
1 - 7 jours	18,2%	15,8%	20,0%	33,3%	9,1%
8 - 15 jours	22,7%	21,1%	15,0%	14,3%	0,0 %
16 - 30 jours	9,1%	10,5%	5,0%	9,5%	9,1%
1 - 3 mois	13,6%	21,1%	15,0%	9,5%	0,0 %
> 3 mois	4,6%	10,5%	15,0%	4,8%	9,1%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	10,0%	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,0	5,1	5,2	5,5	5,0
q_{25} - q_{75}	4,6- 5,7	4,5- 5,9	4,6- 6,0	5,1- 5,9	4,6- 5,5
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	36,4%	36,8%	52,4%	55,6%	44,4%
3 - 6 mois	29,4%	21,1%	35,7%	22,2%	44,4%
6 - 9 mois	24,5%	15,8%	6,0%	5,6%	.
9 - 12 mois	0,0%	10,5%	0,0%	8,3%	.
> 12 mois	9,8%	15,8%	6,0%	8,3%	.

9.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	1 835	1 824	1 896	1 966	1 969
Age					
Médiane	54,9	55,4	55,6	56,5	57,5
q_{25} - q_{75}	45,6 - 62,6	46,3 - 63,2	46,4 - 63,6	47,3 - 64,6	48,3 - 65,5
≥ 60 ans	33,1%	35,1%	36,4%	40,1%	42,9%
≥ 75 ans	4,6%	5,1%	5,5%	6,4%	7,0%
Genre					
Homme cis	54,8%	54,0%	54,7%	54,7%	55,3%
Femme cis	45,1%	45,9%	45,2%	45,2%	44,5%
Transgenre	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	35,0%	35,1%	35,0%	35,2%	35,3%
Femme cis France	17,1%	17,8%	17,3%	17,2%	17,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%
Homme cis Autres pays	19,6%	18,6%	19,5%	19,3%	19,8%
Femme cis Autres pays	27,7%	27,9%	27,6%	27,6%	26,8%

Autres	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	63,9%	65,1%	64,0%	64,4%	63,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%
Homme cis Autres pays	35,7%	34,5%	35,7%	35,3%	35,8%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	37,9%	38,8%	38,3%	38,2%	38,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,6%	0,5%	0,6%	0,8%	0,9%
Femme cis Autres pays	61,5%	60,7%	61,1%	61,0%	60,2%
Groupe d'acquisition					
HSH	15,5%	15,7%	16,8%	17,5%	18,3%
UDI	1,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%
Hétérosexuel	79,6%	80,0%	78,9%	78,4%	77,4%
Hémophilie/Transfusion	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%
Périnatal	0,5%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%
Autre ou inconnu	2,1%	1,6%	1,7%	1,6%	2,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	35,2%	35,8%	34,5%	34,1%	33,6%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Hétérosexuel Autres pays	44,0%	43,8%	43,9%	43,9%	43,2%
HSH France	13,6%	14,2%	15,0%	15,6%	16,4%
HSH Afrique subsaharienne	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
HSH Afrique du Nord	0,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1%
HSH Autre pays	1,7%	1,4%	1,7%	1,7%	1,7%
Autre France	3,4%	3,1%	2,9%	2,9%	2,7%
Autre Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1%	0,0 %
Autre Afrique du Nord	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Autre Autres pays	1,4%	1,2%	1,4%	1,1%	1,6%
IMC kg/m²					
Manquant	17,8%	16,1%	14,4%	10,8%	13,5%
Médiane	26,6	26,7	26,4	26,5	26,6
q_{25} - q_{75}	23,2 - 30,9	23,3 - 30,9	23,2 - 30,6	23,1 - 30,1	23,2 - 30,6
Maigre (<18.5)	4,2%	3,4%	5,0%	4,1%	5,4%
Normal [18.5-25[	34,6%	33,3%	33,7%	34,3%	32,7%
Surpoids [25-30[	31,8%	32,9%	33,5%	35,6%	33,8%
Obèse (≥ 30)	29,5%	30,4%	27,8%	26,1%	28,1%
Prise en charge au stade de la primo-infection	4,3%	4,2%	4,6%	4,7%	5,2%
Stade SIDA	26,4%	25,0%	25,5%	25,4%	25,2%
Ag HBs +	3,5%	3,1%	3,2%	2,9%	3,1%
Ac VHC +	3,8%	3,6%	3,6%	3,7%	3,5%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2006	2006	2006	2006

q_{25} - q_{75}	1999 -2013	1999 -2013	1999 - 2014	2000 - 2015	1999 - 2015
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,1%	0,0 %	0,1%
≤ 1996	19,5%	18,7%	17,7%	17,3%	18,0%
1997-2004	26,3%	25,7%	24,8%	24,4%	23,8%
2005-2012	29,2%	29,3%	28,1%	27,3%	27,0%
≥ 2013	25,1%	26,3%	29,5%	31,0%	31,2%
Traitement ARV					
En cours	95,8%	95,8%	96,5%	97,3%	97,7%
Antécédents	3,4%	3,9%	3,0%	2,3%	1,6%
Jamais traité	0,8%	0,3%	0,5%	0,4%	0,7%
Type de traitement					
Monothérapie	2,1%	1,7%	1,7%	1,8%	1,6%
Bithérapie	18,2%	23,1%	31,5%	39,2%	41,0%
Trithérapie	78,7%	74,1%	66,1%	58,6%	57,1%
Plus de 3 ARVs	1,1%	1,1%	0,7%	0,4%	0,4%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	26,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	19,2%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	13,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	10,8%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	5,7%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,7%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	3,6%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,1%	–	–	–	–
DRV/RTV	1,3%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	30,1%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	17,7%	–	–	–
DTG/RPV	–	13,0%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	11,5%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,1%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	4,6%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	3,3%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,2%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	1,1%	–	–	–
DRV/DTG/RTV	–	0,9%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	33,7%	–	–
DTG/RPV	–	–	17,5%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	15,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	10,7%	–	–

3TC/ABC/DTG	–	–	8,0%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	2,7%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	2,3%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	1,9%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	0,8%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	0,7%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	33,8%	–
DTG/RPV	–	–	–	20,1%	–
3TC/DTG	–	–	–	13,1%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	12,3%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	5,1%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	4,8%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	2,5%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,6%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	1,2%	–
DTG	–	–	–	0,7%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	34,6%
DTG/RPV	–	–	–	–	20,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	13,9%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	11,3%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	5,8%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	4,1%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	1,9%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,6%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,4%
DRV/RTV	–	–	–	–	0,5%
Charge virale					
Manquant	6,7%	7,2%	5,5%	4,5%	7,6%
< 200 copies/mL	92,9%	94,9%	94,1%	94,1%	95,6%
< 50 copies/mL	84,3%	90,1%	89,3%	90,3%	92,0%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	94,1%	95,7%	94,8%	94,8%	96,5%
< 50 copies/mL	85,7%	91,2%	90,3%	91,1%	92,9%
CD4(/mm^3)					
Manquant	15,8%	16,1%	13,5%	12,7%	15,2%
Médiane	603	611	616	644	663
q_{25} - q_{75}	421 - 824	427 - 833	431 - 845	457 - 856	462 - 881
CD4>500/mm^3	64,4%	66,5%	65,9%	69,9%	71,1%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	19,2%	18,3%	14,6%	13,2%	15,7%
%	41,4%	42,9%	43,7%	44,7%	46,8%

10.CORESS GUYANE

10.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	86	111	97	86	98
Age					
Médiane	34,4	35,6	34,9	33,5	38,5
q_{25} - q_{75}	29,5 - 44,1	29,8 - 44,9	28,0 - 46,0	26,6 - 42,6	29,6 - 47,6
≥ 60 ans	5,8%	2,7%	7,2%	5,8%	10,2%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	54,7%	55,9%	49,5%	54,7%	48,0%
Femme cis	44,2%	44,1%	48,5%	45,4%	50,0%
Transgenre	1,2%	0,0 %	2,1%	0,0 %	2,0%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	5,8%	6,3%	14,4%	15,1%	14,3%
Femme cis France	2,3%	3,6%	6,2%	4,7%	10,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	1,2%	0,0 %	1,0%	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	48,8%	49,6%	35,1%	39,5%	33,7%
Femme cis Autres pays	40,7%	40,5%	41,2%	40,7%	39,8%
Autres	1,2%	0,0 %	2,1%	0,0 %	2,0%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	10,6%	11,3%	29,2%	27,7%	29,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	89,4%	88,7%	70,8%	72,3%	70,2%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	5,3%	8,2%	12,8%	10,3%	20,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	2,6%	0,0 %	2,1%	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	92,1%	91,8%	85,1%	89,7%	79,6%
Groupe d'acquisition					
HSH	20,9%	27,9%	14,4%	23,3%	22,5%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	73,3%	55,9%	59,8%	54,7%	42,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	5,8%	16,2%	25,8%	22,1%	34,7%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	5,8%	5,4%	11,3%	9,3%	10,2%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	1,2%	0,0 %	1,0%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	66,3%	50,5%	47,4%	44,2%	32,7%
HSH France	2,3%	2,7%	7,2%	9,3%	7,1%

HSH Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3%	2,0%
HSH Autre pays	18,6%	25,2%	7,2%	11,6%	13,3%
Autre France	0,0 %	1,8%	2,1%	1,2%	7,1%
Autre Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	5,8%	14,4%	23,7%	20,9%	27,6%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	24,1%	20,0%	35,1%	36,2%	43,2%
Médiane	2020	2020	2020	2022	2021
q_{25} - q_{75}	2016 -2020	2018 -2021	2015-2022	2018 -2023	2012 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	47,7%	61,3%	75,3%	74,4%	61,2%
Médiane	22,8	24,1	23,9	24,6	24,4
q_{25} - q_{75}	20,3 - 25,6	20,6 - 30,9	20,6 - 28,8	20,7 - 30,3	21,8 - 27,7
Maigre (<18.5)	11,1%	2,3%	4,2%	18,2%	15,8%
Normal [18.5-25[	60,0%	53,5%	54,2%	36,4%	42,1%
Surpoids [25-30[	22,2%	18,6%	29,2%	18,2%	23,7%
Obèse (≥ 30)	6,7%	25,6%	12,5%	27,3%	18,4%
Statut fumeur					
Inconnu	94,1%	95,5%	87,5%	89,5%	87,8%
Non-fumeur	40,0%	0,0 %	25,0%	55,6%	58,3%
Ex-fumeur	0,0 %	40,0%	50,0%	22,2%	16,7%
Fumeur actuel	60,0%	60,0%	25,0%	22,2%	25,0%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	5,0	15,0	15,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 5,0	5,0 - 15,0	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	3,5%	5,4%	3,1%	1,2%	2,0%
Stade SIDA	18,6%	10,8%	14,4%	16,3%	15,3%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	31,3%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	18,8%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	18,8%	–	–	–	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Rétinite à CMV avec perte de la vision	6,3%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose de l'œsophage	–	33,3%	–	–	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	25,0%	–	–	–
Infection mycobactérienne	–	8,3%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	8,3%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	8,3%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	8,3%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Candidose de l'œsophage	–	–	28,6%	–	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	–	28,6%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	21,4%	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	7,1%	–	–
Infections multiples	–	–	7,1%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	7,1%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	14,3%	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	14,3%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	14,3%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	14,3%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	14,3%	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	7,1%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	20,0%
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	–	20,0%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	20,0%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	20,0%
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	–	6,7%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	–	6,7%
Ag HBs +	5,8%	6,3%	2,1%	3,5%	2,0%
Ac VHC +	1,2%	0,9%	1,0%	1,2%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3%	0,0 %
0 jour	31,4%	23,4%	17,5%	17,9%	18,4%
1 - 7 jours	7,0%	9,0%	22,7%	19,1%	18,4%
8 - 15 jours	14,0%	12,6%	15,5%	14,3%	18,4%
16 - 30 jours	10,5%	16,2%	15,5%	9,5%	14,3%
1 - 3 mois	10,5%	18,0%	9,3%	10,7%	12,2%
> 3 mois	26,7%	20,7%	19,6%	28,6%	18,4%
Statut à la prise en charge					
Manquant	8,1%	14,4%	21,7%	24,4%	6,1%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	20,3%	34,7%	23,7%	27,7%	28,3%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	12,7%	13,7%	21,1%	21,5%	25,0%

200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	25,3%	23,2%	15,8%	18,5%	17,4%
CD4 < 200/mm³ ou SIDA et sans primo-infection	41,8%	28,4%	39,5%	32,3%	29,4%
CD4 (/mm³)					
Manquant	10,5%	15,3%	23,7%	27,9%	7,1%
Médiane	274	335	295	362	356
q_{25} - q_{75}	129 - 407	188 - 535	120 - 479	175 - 563	168 - 522
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	12,8%	18,0%	29,9%	31,4%	14,3%
%	6,7%	13,2%	13,2%	15,3%	13,1%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	3,6%	2,1%	4,7%	2,0%
Médiane	4,3	3,7	4,2	4,0	4,4
q_{25} - q_{75}	3,3 - 4,8	1,9 - 4,7	2,9 - 5,2	2,7 - 4,9	3,4 - 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	1,0%	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	97,7%	87,4%	90,7%	89,5%	95,9%
Type de traitement					
Monothérapie	1,2%	1,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	1,2%	8,3%	9,1%	3,9%	5,3%
Trithérapie	95,2%	89,7%	90,9%	93,5%	92,6%
Plus de 3 ARVs	2,4%	1,0%	0,0 %	2,6%	1,1%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	23,1%	18,8%	23,8%	26,4%	30,7%
8 - 30 jours	50,0%	40,1%	39,2%	44,2%	53,3%
1 - 3 mois	17,2%	23,5%	25,0%	16,1%	12,8%
> 3 mois	9,6%	17,6%	12,0%	13,4%	3,2%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	57,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	16,7%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	9,5%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	8,3%	–	–	–	–
3TC/DTG	1,2%	–	–	–	–
AZT	1,2%	–	–	–	–
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	1,2%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,2%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	1,2%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,2%	–	–	–	–

Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	35,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	19,6%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	10,3%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,3%	–	–	–
3TC/DTG/TDF	–	7,2%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	7,2%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	5,2%	–	–	–
ABC/DTG/FTC	–	1,0%	–	–	–
ABC/RTV/TDF	–	1,0%	–	–	–
AZT	–	1,0%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	52,3%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	13,6%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	10,2%	–	–
3TC/DTG	–	–	8,0%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	6,8%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	4,6%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	2,3%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,1%	–	–
FTC/TDF	–	–	1,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	53,3%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	20,8%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	10,4%	–
3TC/DTG	–	–	–	3,9%	–
3TC/DTG/TDF	–	–	–	2,6%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,6%	–
3TC/COBI/DOR/EVG/FTC/TAF/TDF	–	–	–	1,3%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	1,3%	–
3TC/DTG/FTC	–	–	–	1,3%	–
DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,3%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	64,5%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	12,9%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	10,8%
3TC/DTG	–	–	–	–	5,4%
3TC/DTG/TDF	–	–	–	–	2,2%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	2,2%
APV/BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	1,1%
EFV/FTC/TDF	–	–	–	–	1,1%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	57,9%	57,6%	52,9%	52,7%	63,8%

3 - 6 mois	14,0%	18,8%	15,4%	24,7%	24,9%
6 - 9 mois	6,4%	12,3%	12,5%	7,2%	.
9 - 12 mois	5,1%	2,5%	6,4%	8,5%	.
> 12 mois	16,6%	8,7%	12,8%	7,0%	.
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	71,9%	76,5%	68,3%	77,4%	88,7%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	80,1%	88,5%	80,4%	89,5%	96,8%
[100 000 - 500 000[copies/ml	40,0%	54,6%	33,3%	70,4%	74,8%
≥500 000 copies/ml	42,9%	37,5%	56,4%	27,1%	63,3%

10.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	33	27	30	21	27
Age					
Médiane	36,7	41,3	40,8	44,8	38,5
q_{25} - q_{75}	31,9 - 48,5	31,5 - 49,9	34,9 - 48,7	36,0 - 49,2	35,1 - 46,7
≥ 60 ans	6,1%	3,7%	10,0%	9,5%	3,7%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	51,5%	66,7%	60,0%	61,9%	44,4%
Femme cis	48,5%	33,3%	40,0%	38,1%	51,9%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,7%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	6,1%	3,7%	16,7%	9,5%	3,7%
Femme cis France	3,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	3,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	45,5%	63,0%	43,3%	52,4%	40,7%
Femme cis Autres pays	42,4%	33,3%	40,0%	38,1%	48,2%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,7%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	11,8%	5,6%	27,8%	15,4%	8,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	88,2%	94,4%	72,2%	84,6%	91,7%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	6,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	6,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	87,5%	100,0%	100,0%	100,0%	92,9%
Groupe d'acquisition					
HSH	9,1%	29,6%	6,7%	14,3%	11,1%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Hétérosexuel	87,9%	55,6%	70,0%	57,1%	51,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	3,0%	14,8%	23,3%	28,6%	37,0%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	23,3%	23,1%	32,0%	31,6%	32,0%
Médiane	2020	2020	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2017 - 2020	2019 - 2021	2016-2022	2021 - 2023	2017 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	42,4%	40,7%	76,7%	52,4%	37,0%
Médiane	20,7	21,5	21,3	21,2	23,0
q_{25} - q_{75}	18,9 - 23,1	20,1 - 25,4	20,5 - 30,3	16,2 - 24,6	19,5 - 24,6
Maigre (<18.5)	21,1%	6,3%	0,0 %	40,0%	23,5%
Normal [18.5-25[	63,2%	68,8%	57,1%	40,0%	52,9%
Surpoids [25-30[	10,5%	25,0%	14,3%	20,0%	5,9%
Obèse (≥ 30)	5,3%	0,0 %	28,6%	0,0 %	17,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	48,5%	51,9%	30,0%	28,6%	18,5%
1 - 7 jours	9,1%	11,1%	30,0%	28,6%	7,4%
8 - 15 jours	6,1%	0,0 %	3,3%	9,5%	18,5%
16 - 30 jours	6,1%	11,1%	13,3%	4,8%	18,5%
1 - 3 mois	12,1%	18,5%	13,3%	0,0 %	11,1%
> 3 mois	18,2%	7,4%	10,0%	28,6%	25,9%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	4,8	4,9	5,1	4,8	5,5
q_{25} - q_{75}	4,4- 5,8	4,4-6,2	4,1- 5,6	3,8- 5,8	4,6- 6,2
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	50,0%	42,9%	46,7%	28,2%	42,7%
3 - 6 mois	15,6%	19,0%	23,3%	27,1%	38,2%
6 - 9 mois	3,1%	23,8%	13,3%	17,9%	.
9 - 12 mois	6,3%	4,8%	6,7%	9,0%	.
> 12 mois	25,0%	9,5%	10,0%	17,9%	.

10.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	1 646	1 852	1 902	1 967	2 051
Age					
Médiane	45,7	46,0	47,0	48,4	49,3
q_{25} - q_{75}	36,7 - 57,1	37,2 - 57,4	38,0 - 57,7	38,9 - 58,5	39,7 - 59,5
≥ 60 ans	19,5%	20,1%	21,2%	22,9%	24,4%
≥ 75 ans	3,5%	3,2%	3,3%	3,7%	4,1%

Genre					
Homme cis	44,7%	46,1%	46,9%	46,9%	46,1%
Femme cis	54,6%	53,1%	52,5%	52,5%	53,5%
Transgenre	0,7%	0,8%	0,6%	0,6%	0,4%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	10,3%	10,6%	10,8%	11,0%	11,5%
Femme cis France	7,7%	7,5%	7,4%	7,8%	8,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%	0,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%
Homme cis Autres pays	34,1%	35,0%	35,8%	35,5%	34,2%
Femme cis Autres pays	46,3%	45,2%	44,6%	44,3%	44,8%
Autres	0,7%	0,8%	0,6%	0,6%	0,4%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	23,0%	23,1%	23,0%	23,4%	24,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,8%	1,1%	0,7%	0,9%	0,9%
Homme cis Autres pays	76,2%	75,9%	76,4%	75,7%	74,3%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	14,0%	14,0%	14,1%	14,9%	15,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%
Femme cis Autres pays	84,9%	85,1%	85,0%	84,3%	83,7%
Groupe d'acquisition					
HSH	6,5%	7,8%	8,4%	8,0%	8,1%
UDI	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Hétérosexuel	86,4%	83,4%	81,5%	81,8%	80,2%
Hémophilie/Transfusion	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Périnatal	1,7%	1,4%	1,3%	1,4%	1,1%
Autre ou inconnu	5,0%	7,1%	8,5%	8,6%	10,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	14,3%	13,9%	13,7%	13,8%	14,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	0,9%	0,9%	0,7%	0,6%	0,5%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%	0,1%
Hétérosexuel Autres pays	71,3%	68,6%	67,1%	67,3%	65,1%
HSH France	2,0%	2,2%	2,4%	3,0%	3,3%
HSH Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1%	0,0 %
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,1%	0,2%	0,2%
HSH Autre pays	4,5%	5,6%	5,9%	4,8%	4,6%
Autre France	1,6%	2,0%	2,1%	2,0%	2,2%
Autre Afrique subsaharienne	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,1%	0,1%	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	5,4%	6,6%	7,9%	8,0%	9,4%
IMC kg/m²					
Manquant	36,4%	32,0%	40,9%	38,0%	40,0%
Médiane	26,4	26,4	26,4	26,6	26,6

q_{25} - q_{75}	22,8 - 30,2	23,1 - 30,8	23,0 - 30,5	23,0 - 30,8	23,3 - 31,2
Maigre (<18.5)	3,3%	4,0%	3,7%	3,5%	2,7%
Normal [18.5-25[	37,6%	35,7%	36,4%	35,3%	35,4%
Surpoids [25-30[	32,9%	32,2%	32,6%	32,0%	32,1%
Obèse (≥ 30)	26,2%	28,1%	27,3%	29,3%	29,8%
Prise en charge au stade de la primo-infection	2,7%	2,6%	2,6%	2,4%	2,5%
Stade SIDA	27,5%	27,6%	27,7%	27,5%	28,0%
Ag HBs +	3,2%	3,7%	4,1%	3,8%	4,0%
Ac VHC +	1,0%	1,0%	1,4%	1,8%	2,0%
Année de diagnostic					
Médiane	2010	2011	2011	2011	2012
q_{25} - q_{75}	2004 -2016	2005 -2017	2005 - 2017	2005 - 2017	2005 - 2018
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1%	0,1%
≤ 1996	8,3%	7,4%	7,8%	7,6%	7,4%
1997-2004	18,7%	17,6%	17,0%	17,3%	17,2%
2005-2012	32,0%	30,9%	29,6%	29,8%	29,0%
≥ 2013	41,1%	44,1%	45,6%	45,3%	46,4%
Traitement ARV					
En cours	94,3%	94,0%	94,3%	94,6%	95,8%
Antécédents	4,4%	3,9%	4,5%	3,5%	2,9%
Jamais traité	1,3%	2,1%	1,2%	2,0%	1,3%
Type de traitement					
Monothérapie	1,2%	1,0%	1,1%	1,5%	2,2%
Bithérapie	11,9%	19,6%	31,0%	33,9%	34,9%
Trithérapie	84,3%	77,9%	67,0%	64,0%	62,3%
Plus de 3 ARVs	2,5%	1,4%	0,8%	0,6%	0,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	21,1%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	20,2%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	16,6%	–	–	–	–
3TC/DTG	8,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	7,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	5,4%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	4,6%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	2,3%	–	–	–	–
DTG/RPV	2,1%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,6%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	19,8%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	17,9%	–	–	–
3TC/DTG	–	16,0%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	14,4%	–	–	–

FTC/RPV/TDF	–	8,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	4,0%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	3,8%	–	–	–
DTG/RPV	–	2,5%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	2,4%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	1,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	21,5%	–	–
3TC/DTG	–	–	20,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	15,4%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	9,0%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	6,9%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	6,8%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	3,5%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	2,8%	–	–
DTG/RPV	–	–	2,3%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,2%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	24,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	19,3%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	14,7%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	11,0%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	7,3%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	5,2%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	2,9%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	2,7%	–
DTG/RPV	–	–	–	2,2%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,5%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	28,5%
3TC/DTG	–	–	–	–	19,9%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	12,7%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	11,6%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	5,6%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	5,5%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	2,8%
DTG/RPV	–	–	–	–	2,0%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	2,0%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,6%
Charge virale					
Manquant	18,2%	15,9%	15,7%	11,7%	12,3%
< 200 copies/mL	86,6%	87,0%	87,8%	88,8%	91,4%
< 50 copies/mL	81,1%	81,5%	80,2%	81,8%	82,9%

Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	89,2%	88,8%	89,2%	90,0%	92,1%
< 50 copies/mL	83,4%	83,3%	81,6%	83,1%	83,7%
CD4(/mm^3)					
Manquant	23,7%	21,3%	24,1%	21,3%	22,7%
Médiane	537	540	552	575	558
q_{25} - q_{75}	341 - 743	341 - 758	347 - 775	355 - 778	359 - 769
CD4>500/mm^3	55,7%	55,0%	56,6%	60,1%	58,4%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	30,6%	25,6%	28,0%	25,5%	30,2%
%	35,5%	35,8%	34,8%	38,3%	39,7%

11.CORESS HAUTS-DE-FRANCE

11.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	108	106	114	141	141
Age					
Médiane	35,8	34,1	34,3	35,5	37,9
q_{25} - q_{75}	28,5 - 45,4	27,0 - 46,4	26,3 - 45,1	26,8 - 46,2	28,6 - 46,2
≥ 60 ans	4,6%	6,6%	5,3%	5,7%	6,4%
≥ 75 ans	0,9%	0,0 %	0,9%	0,7%	0,0 %
Genre					
Homme cis	77,8%	81,1%	70,2%	66,0%	63,8%
Femme cis	22,2%	18,9%	29,0%	33,3%	36,2%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,9%	0,7%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	57,4%	59,4%	50,9%	51,8%	50,4%
Femme cis France	7,4%	6,6%	12,3%	14,2%	10,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	10,2%	6,6%	7,9%	5,7%	5,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	14,8%	10,4%	13,2%	15,6%	22,0%
Homme cis Autres pays	10,2%	15,1%	11,4%	8,5%	7,8%
Femme cis Autres pays	0,0 %	1,9%	3,5%	3,6%	3,6%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,9%	0,7%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	73,8%	73,3%	72,5%	78,5%	78,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,1%	8,1%	11,3%	8,6%	8,9%
Homme cis Autres pays	13,1%	18,6%	16,3%	12,9%	12,2%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	33,3%	35,0%	42,4%	42,6%	29,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	66,7%	55,0%	45,5%	46,8%	60,8%
Femme cis Autres pays	0,0 %	10,0%	12,1%	10,6%	9,8%
Groupe d'acquisition					
HSH	53,7%	56,6%	50,0%	35,5%	35,5%
UDI	0,0 %	0,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	38,9%	33,0%	39,5%	31,2%	48,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4%
Autre ou inconnu	6,5%	9,4%	10,5%	33,3%	14,2%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	18,5%	18,9%	18,4%	12,1%	19,2%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	15,7%	13,2%	16,7%	17,0%	24,1%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,9%	2,6%	0,0 %	2,8%
Hétérosexuel Autres pays	4,6%	0,0 %	1,8%	2,1%	2,8%
HSH France	43,5%	44,3%	40,4%	31,2%	30,5%

HSH Afrique subsaharienne	4,6%	2,8%	4,4%	1,4%	1,4%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	3,8%	0,9%	0,7%	3,6%
HSH Autre pays	5,6%	5,7%	4,4%	2,1%	0,0 %
Autre France	2,8%	2,8%	5,3%	23,4%	11,4%
Autre Afrique subsaharienne	4,6%	0,9%	0,0 %	2,8%	2,1%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	3,8%	0,9%	2,1%	0,0 %
Autre Autres pays	0,0 %	2,8%	4,4%	5,0%	2,1%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	34,2%	61,1%	68,3%	42,6%	45,5%
Médiane	2017	2019	2017	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2012 -2019	2014 -2021	2012 -2022	2015 -2023	2021 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	47,2%	64,2%	47,4%	52,5%	50,4%
Médiane	23,9	21,7	23,8	24,2	23,1
q_{25} - q_{75}	22,1 - 25,7	19,1 - 25,4	20,7 - 26,8	21,6 - 27,0	20,8 - 25,7
Maigre (<18.5)	5,3%	15,8%	6,7%	9,0%	4,3%
Normal [18.5-25[	59,7%	57,9%	53,3%	49,3%	68,6%
Surpoids [25-30[	26,3%	21,1%	26,7%	29,9%	15,7%
Obèse (≥ 30)	8,8%	5,3%	13,3%	11,9%	11,4%
Statut fumeur					
Inconnu	56,5%	78,3%	69,0%	80,9%	80,9%
Non-fumeur	46,8%	30,4%	34,3%	14,8%	22,2%
Ex-fumeur	21,3%	26,1%	42,9%	33,3%	48,2%
Fumeur actuel	31,9%	43,5%	22,9%	51,9%	29,6%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 20,0	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	9,3%	8,5%	7,9%	5,7%	5,7%
Stade SIDA	12,0%	7,6%	6,1%	7,1%	8,5%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	38,5%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	15,4%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	15,4%	–	–	–	–
Autres infections virales	7,7%	–	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	7,7%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	7,7%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	37,5%	–	–	–
Infections multiples	–	25,0%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	12,5%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	12,5%	–	–	–

Sarcome de Kaposi	–	12,5%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	28,6%	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	14,3%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	14,3%	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	14,3%	–	–
Infections multiples	–	–	14,3%	–	–
Sarcome de Kaposi	–	–	14,3%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	40,0%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	30,0%	–
Leuco-encéphalopathie multifocale progressive	–	–	–	10,0%	–
Syndrome cachectique inaugural du sida	–	–	–	10,0%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	10,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	16,7%
Autres infections bactériennes	–	–	–	–	8,3%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	8,3%
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	–	–	–	8,3%
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	–	8,3%
Infection à Mycobacterium Avium ou Kansasii, disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	–	8,3%
Ag HBs +	3,7%	2,8%	1,8%	2,1%	2,1%
Ac VHC +	2,8%	2,8%	0,9%	0,7%	0,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	1,9%	3,5%	24,8%	6,4%
0 jour	16,7%	17,3%	22,7%	18,9%	22,0%
1 - 7 jours	29,6%	31,7%	31,8%	41,5%	33,3%
8 - 15 jours	19,4%	26,0%	13,6%	14,2%	16,7%
16 - 30 jours	17,6%	13,5%	11,8%	7,6%	11,4%
1 - 3 mois	8,3%	2,9%	8,2%	11,3%	5,3%
> 3 mois	8,3%	8,7%	11,8%	6,6%	11,4%
Statut à la prise en charge					
Manquant	3,7%	8,5%	18,4%	21,3%	5,0%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	35,6%	28,9%	34,4%	37,8%	28,4%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	16,4%	24,7%	20,4%	18,9%	18,7%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	16,4%	20,6%	24,7%	23,4%	20,9%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	31,7%	25,8%	20,4%	19,8%	32,1%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	4,6%	8,5%	19,3%	22,0%	7,1%
Médiane	373	353	374	375	320

q_{25} - q_{75}	178 - 535	198 - 500	234 - 597	227 - 600	167 - 504
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	7,4%	8,5%	21,1%	23,4%	11,4%
%	13,0%	11,3%	18,9%	14,8%	15,2%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	1,9%	3,5%	19,9%	6,4%
Médiane	4,6	4,7	4,4	4,6	4,6
q_{25} - q_{75}	3,8- 5,3	4,0- 5,6	3,0- 5,4	3,6- 5,5	3,9- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,9%	0,9%	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	99,1%	96,2%	94,7%	81,6%	94,3%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,9%	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	5,6%	7,8%	4,6%	7,8%	3,0%
Trithérapie	93,5%	88,2%	93,5%	90,4%	95,5%
Plus de 3 ARVs	0,9%	3,9%	0,9%	1,7%	1,5%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	32,7%	34,7%	44,0%	57,5%	49,0%
8 - 30 jours	33,6%	40,2%	35,1%	27,6%	32,0%
1 - 3 mois	19,6%	17,1%	12,3%	12,9%	15,6%
> 3 mois	14,0%	8,0%	8,5%	2,0%	3,4%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	63,6%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	17,8%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,7%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	3,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	1,9%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,9%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,9%	–	–	–	–
3TC/DRV/RTV	0,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	0,9%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	0,9%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	66,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	8,8%	–	–	–
3TC/DTG	–	5,9%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	4,9%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	2,0%	–	–	–

DRV/FTC/MVC/RTV/TDF	–	2,0%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,0%	–	–	–
3TC/AZT/DTG/MVC	–	1,0%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,0%	–	–	–
BIC/DTG/FTC/TAF/TDF	–	1,0%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	69,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	8,3%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	6,5%	–	–
3TC/DTG	–	–	3,7%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	2,8%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	1,9%	–	–
3TC/ABC/RAL	–	–	0,9%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	0,9%	–	–
ATV/FTC/RTV/TDF	–	–	0,9%	–	–
AZT/DOR/DTG	–	–	0,9%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	74,8%	–
3TC/DTG	–	–	–	7,0%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	3,5%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	3,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,6%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	2,6%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	0,9%	–
BIC/FTC/MVC/TAF	–	–	–	0,9%	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	–	0,9%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	0,9%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	82,0%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	3,8%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	3,8%
3TC/DTG	–	–	–	–	2,3%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,5%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	0,8%
3TC/AZT/DTG	–	–	–	–	0,8%
BIC/FTC/MVC/TAF	–	–	–	–	0,8%
CAB_LAINJ/RPV	–	–	–	–	0,8%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	0,8%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	61,3%	55,1%	58,0%	57,1%	70,9%
3 - 6 mois	18,3%	31,7%	19,1%	25,7%	24,2%
6 - 9 mois	7,8%	6,1%	12,4%	7,6%	4,9%
9 - 12 mois	4,9%	2,0%	2,9%	4,0%	0,0%

> 12 mois	7,8%	5,1%	7,6%	5,6%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	79,6%	86,7%	77,1%	82,8%	95,1%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	91,7%	97,9%	91,8%	94,3%	95,6%
[100 000 - 500 000[copies/ml	56,1%	90,0%	70,6%	80,0%	.
≥500 000 copies/ml	70,0%	60,0%	56,3%	66,7%	92,0%

11.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	33	25	19	22	43
Age					
Médiane	37,7	43,6	36,0	38,4	40,8
q_{25} - q_{75}	30,2 - 47,1	33,0 - 50,9	24,4 - 48,9	26,9 - 49,5	32,2 - 52,6
≥ 60 ans	12,1%	12,0%	5,3%	0,0 %	16,3%
≥ 75 ans	3,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	75,8%	80,0%	63,2%	59,1%	53,5%
Femme cis	24,2%	20,0%	31,6%	40,9%	46,5%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	5,3%	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	51,5%	52,0%	52,6%	50,0%	39,5%
Femme cis France	6,1%	8,0%	10,5%	9,1%	16,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	15,2%	12,0%	10,5%	4,6%	4,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	18,2%	12,0%	15,8%	22,7%	25,6%
Homme cis Autres pays	9,1%	16,0%	0,0 %	4,6%	9,3%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	5,3%	9,1%	4,7%
Autres	0,0 %	0,0 %	5,3%	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	68,0%	65,0%	83,3%	84,6%	73,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	15,0%	16,7%	7,7%	8,7%
Homme cis Autres pays	12,0%	20,0%	0,0 %	7,7%	17,4%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	25,0%	40,0%	33,3%	22,2%	35,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	75,0%	60,0%	50,0%	55,6%	55,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	16,7%	22,2%	10,0%
Groupe d'acquisition					
HSH	36,4%	52,0%	52,6%	36,4%	16,3%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	48,5%	36,0%	42,1%	50,0%	53,5%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	3,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3%

Autre ou inconnu	12,1%	12,0%	5,3%	13,6%	27,9%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	35,7%	50,0%	50,0%	44,4%	57,9%
Médiane	2016	2020	2022	2023	2022
q_{25} - q_{75}	2012 - 2019	2015 - 2020	2021 -2022	2023-2023	2014 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	66,7%	64,0%	47,4%	45,5%	44,2%
Médiane	24,6	18,8	20,8	23,4	23,2
q_{25} - q_{75}	21,8 - 25,8	18,4 - 22,3	19,4 - 24,2	20,3 - 26,3	19,9 - 25,9
Maigre (<18.5)	0,0 %	33,3%	10,0%	8,3%	4,2%
Normal [18.5-25[	54,6%	44,4%	70,0%	58,3%	70,8%
Surpoids [25-30[	45,5%	11,1%	20,0%	25,0%	16,7%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	11,1%	0,0 %	8,3%	8,3%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,6%	14,0%
0 jour	30,3%	24,0%	21,1%	23,8%	18,9%
1 - 7 jours	24,2%	28,0%	26,3%	57,1%	32,4%
8 - 15 jours	15,2%	20,0%	21,1%	0,0 %	21,6%
16 - 30 jours	12,1%	20,0%	10,5%	4,8%	8,1%
1 - 3 mois	9,1%	4,0%	0,0 %	14,3%	8,1%
> 3 mois	9,1%	4,0%	21,1%	0,0 %	10,8%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,3%
Médiane	5,2	5,6	5,3	5,5	5,1
q_{25} - q_{75}	3,9- 5,5	4,7- 6,2	4,0- 5,9	4,8- 6,1	4,0- 5,8
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	34,4%	25,0%	47,1%	45,0%	53,6%
3 - 6 mois	28,1%	58,3%	17,7%	30,0%	37,4%
6 - 9 mois	21,9%	8,3%	5,9%	5,0%	9,0%
9 - 12 mois	6,3%	4,2%	5,9%	10,0%	0,0%
> 12 mois	9,4%	4,2%	23,5%	10,0%	0,0%

11.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	3 741	3 827	3 935	4 061	4 160
Age					
Médiane	49,9	50,4	50,8	51,3	51,9
q_{25} - q_{75}	40,7 - 58,0	41,0 - 58,6	41,2 - 59,4	41,5 - 60,0	41,8 - 60,7
≥ 60 ans	20,1%	21,7%	23,0%	25,2%	26,9%
≥ 75 ans	1,8%	2,3%	2,6%	2,8%	3,2%
Genre					
Homme cis	68,2%	68,5%	67,8%	67,4%	67,0%

Femme cis	31,6%	31,3%	32,0%	32,4%	32,8%
Transgenre	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	53,6%	54,0%	52,8%	52,5%	52,0%
Femme cis France	12,1%	12,1%	12,1%	12,2%	11,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	8,3%	8,2%	8,4%	8,5%	8,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	16,9%	16,7%	17,2%	17,2%	18,2%
Homme cis Autres pays	6,3%	6,4%	6,6%	6,5%	6,7%
Femme cis Autres pays	2,6%	2,5%	2,8%	3,0%	2,8%
Autres	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	78,6%	78,7%	78,0%	77,8%	77,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	12,2%	12,0%	12,3%	12,6%	12,4%
Homme cis Autres pays	9,2%	9,3%	9,7%	9,6%	10,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	38,2%	38,6%	37,7%	37,6%	36,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	53,6%	53,5%	53,6%	53,2%	55,4%
Femme cis Autres pays	8,3%	7,9%	8,7%	9,2%	8,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	43,9%	44,2%	43,9%	43,4%	43,0%
UDI	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,2%
Hétérosexuel	45,9%	45,7%	46,0%	45,1%	45,3%
Hémophilie/Transfusion	1,4%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%
Périnatal	0,9%	1,1%	1,0%	1,3%	1,4%
Autre ou inconnu	4,1%	4,4%	4,7%	5,9%	6,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	19,5%	19,9%	19,3%	19,0%	18,9%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	21,9%	21,5%	21,9%	21,5%	22,0%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
Hétérosexuel Autres pays	3,1%	2,8%	3,2%	3,1%	3,0%
HSH France	39,5%	39,6%	39,1%	38,6%	38,0%
HSH Afrique subsaharienne	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%
HSH Afrique du Nord	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%
HSH Autre pays	2,9%	2,9%	3,0%	2,9%	3,0%
Autre France	6,8%	6,7%	6,7%	7,2%	7,1%
Autre Afrique subsaharienne	2,3%	2,3%	2,4%	2,8%	3,1%
Autre Afrique du Nord	0,1%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%
Autre Autres pays	0,9%	0,9%	0,9%	1,2%	1,3%
IMC kg/m²					
Manquant	29,1%	26,4%	27,1%	27,1%	26,0%
Médiane	25,4	25,6	25,7	26,0	26,0
q_{25} - q_{75}	22,7 - 28,9	22,8 - 29,3	22,8 - 29,3	23,1 - 29,4	23,1 - 29,7
Maigre (<18.5)	3,3%	3,1%	3,4%	3,0%	3,0%

Normal [18.5-25[	42,5%	40,6%	40,3%	38,8%	38,1%
Surpoids [25-30[	33,5%	34,8%	34,2%	35,3%	35,2%
Obèse (≥ 30)	20,7%	21,5%	22,1%	22,9%	23,7%
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,9%	7,0%	6,6%	6,6%	6,5%
Stade SIDA	19,3%	18,9%	18,9%	18,5%	17,8%
Ag HBs +	4,7%	4,6%	4,4%	4,5%	4,3%
Ac VHC +	9,9%	9,5%	9,5%	9,0%	8,8%
Année de diagnostic					
Médiane	2007	2008	2008	2009	2009
q_{25} - q_{75}	1999 -2014	1999 -2014	2000 - 2015	2000 - 2015	2000 - 2016
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,1%	0,2%	1,3%	1,3%
≤ 1996	19,2%	18,3%	17,5%	16,8%	16,4%
1997-2004	22,0%	21,4%	20,8%	20,5%	19,6%
2005-2012	28,3%	28,1%	27,3%	26,7%	25,9%
≥ 2013	30,5%	32,2%	34,4%	36,0%	38,2%
Traitement ARV					
En cours	97,6%	97,4%	97,2%	97,5%	98,1%
Antécédents	1,6%	1,7%	1,8%	1,4%	1,2%
Jamais traité	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	0,7%
Type de traitement					
Monothérapie	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	1,1%
Bithérapie	17,2%	22,5%	28,8%	32,1%	33,8%
Trithérapie	78,7%	73,3%	67,3%	64,4%	63,0%
Plus de 3 ARVs	2,7%	2,9%	2,7%	2,5%	2,2%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	18,7%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	16,8%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	11,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	11,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	7,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	5,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,5%	–	–	–	–
3TC/ABC/NVP	2,4%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	1,6%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,5%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	24,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	12,6%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	11,2%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	9,9%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	9,5%	–	–	–
DTG/RPV	–	5,5%	–	–	–

DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,8%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,2%	–	–	–
3TC/ABC/NVP	–	2,1%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	26,4%	–	–
3TC/DTG	–	–	15,9%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	8,4%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	8,2%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	7,7%	–	–
DTG/RPV	–	–	5,0%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	4,4%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,3%	–	–
3TC/ABC/NVP	–	–	1,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	28,9%	–
3TC/DTG	–	–	–	18,5%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	8,0%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	7,4%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	6,4%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	4,9%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,7%	–
DTG/RPV	–	–	–	4,1%	–
3TC/ABC/NVP	–	–	–	1,5%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,3%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	30,0%
3TC/DTG	–	–	–	–	19,5%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	7,4%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	7,2%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	7,0%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	5,9%
DTG/RPV	–	–	–	–	4,1%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	3,6%
3TC/ABC/NVP	–	–	–	–	1,3%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,3%
Charge virale					
Manquant	5,5%	3,9%	7,3%	6,4%	5,6%
< 200 copies/mL	96,3%	96,7%	96,4%	97,0%	97,1%
< 50 copies/mL	92,5%	93,1%	93,0%	94,8%	94,5%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,8%	97,3%	96,7%	97,3%	97,2%

< 50 copies/mL	93,0%	93,7%	93,5%	95,1%	94,6%
CD4(/mm^3)					
Manquant	8,3%	6,4%	9,4%	7,7%	6,3%
Médiane	652	647	664	692	704
q_{25} - q_{75}	478 - 867	472 - 851	488 - 879	502 - 908	515 - 926
CD4>500/mm^3	72,0%	71,7%	73,9%	75,2%	76,2%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	10,0%	8,5%	12,2%	9,1%	9,1%
%	44,5%	46,8%	47,4%	48,5%	49,9%

12.CORESS ÎLE-DE-FRANCE CENTRE ESSONNE

12.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	219	182	193	241	209
Age					
Médiane	37,1	37,6	37,0	35,6	37,0
q_{25} - q_{75}	28,5 - 49,7	29,5 - 49,3	30,2 - 47,8	28,9 - 45,9	29,5 - 49,4
≥ 60 ans	6,4%	8,2%	6,2%	6,6%	5,3%
≥ 75 ans	0,5%	0,6%	0,0 %	1,2%	0,0 %
Genre					
Homme cis	66,7%	67,0%	63,2%	68,1%	69,9%
Femme cis	32,0%	32,4%	34,7%	29,9%	27,8%
Transgenre	1,4%	0,6%	2,1%	2,1%	2,4%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	37,9%	42,3%	27,5%	32,8%	33,0%
Femme cis France	9,6%	5,5%	2,6%	3,7%	3,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	17,8%	13,7%	18,1%	17,4%	18,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	21,0%	21,4%	26,4%	23,2%	19,1%
Homme cis Autres pays	11,0%	11,0%	17,6%	17,8%	18,2%
Femme cis Autres pays	1,4%	5,5%	5,7%	2,9%	5,3%
Autres	1,4%	0,6%	2,1%	2,1%	2,4%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	56,9%	63,1%	43,4%	48,2%	47,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	26,7%	20,5%	28,7%	25,6%	26,7%
Homme cis Autres pays	16,4%	16,4%	27,9%	26,2%	26,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	30,0%	17,0%	7,5%	12,5%	12,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	65,7%	66,1%	76,1%	77,8%	69,0%
Femme cis Autres pays	4,3%	17,0%	16,4%	9,7%	19,0%
Groupe d'acquisition					
HSH	38,8%	42,3%	33,7%	44,0%	40,2%
UDI	0,9%	0,0 %	0,0 %	0,4%	1,0%
Hétérosexuel	50,2%	53,3%	57,0%	45,6%	44,5%
Hémophilie/Transfusion	0,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,5%	0,0 %	0,5%	0,4%	1,0%
Autre ou inconnu	8,7%	4,4%	8,8%	9,5%	13,4%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	16,4%	13,2%	9,8%	7,9%	9,1%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	29,2%	31,3%	38,3%	32,4%	27,3%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,5%	1,7%	2,6%	2,9%	1,9%
Hétérosexuel Autres pays	4,1%	7,1%	6,2%	2,5%	6,2%
HSH France	26,5%	31,3%	18,1%	25,7%	21,5%

HSH Afrique subsaharienne	5,0%	3,3%	3,1%	5,4%	6,2%
HSH Afrique du Nord	1,4%	1,7%	1,6%	4,6%	3,8%
HSH Autre pays	5,9%	6,0%	10,9%	8,3%	8,6%
Autre France	4,6%	3,9%	3,1%	3,7%	6,2%
Autre Afrique subsaharienne	5,0%	0,6%	3,1%	2,9%	4,3%
Autre Afrique du Nord	0,5%	0,0 %	0,0 %	0,8%	1,0%
Autre Autres pays	0,9%	0,0 %	3,1%	2,9%	3,8%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	31,3%	28,7%	31,6%	27,8%	24,2%
Médiane	2017	2016	2020	2022	2022
q_{25} - q_{75}	2007 -2019	2004 -2020	2012 -2022	2014 -2023	2016 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	57,1%	61,5%	56,5%	51,0%	48,3%
Médiane	23,6	23,5	23,5	23,6	24,2
q_{25} - q_{75}	21,6 - 26,4	21,0 - 26,7	21,4 - 26,6	21,8 - 27,5	21,9 - 25,9
Maigre (<18.5)	3,2%	7,1%	3,6%	5,1%	4,6%
Normal [18.5-25[	58,5%	58,6%	66,7%	57,6%	57,4%
Surpoids [25-30[	28,7%	22,9%	20,2%	25,4%	25,9%
Obèse (≥ 30)	9,6%	11,4%	9,5%	11,9%	12,0%
Statut fumeur					
Inconnu	68,0%	73,1%	63,7%	63,9%	62,2%
Non-fumeur	48,6%	42,9%	58,6%	51,7%	41,8%
Ex-fumeur	25,7%	16,3%	14,3%	17,2%	24,1%
Fumeur actuel	25,7%	40,8%	27,1%	31,0%	34,2%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	38,9%	30,0%	15,8%	18,5%	14,8%
Médiane	15,0	5,0	5,0	10,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	11,0%	6,6%	9,3%	10,8%	8,1%
Stade SIDA	8,7%	7,7%	10,9%	10,0%	8,1%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Toxoplasmose cérébrale	21,1%	–	–	–	–
Autres infections bactériennes	15,8%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	15,8%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	10,5%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	10,5%	–	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	5,3%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	28,6%	–	–	–
Infections multiples	–	21,4%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	14,3%	–	–	–
Autres infections bactériennes	–	7,1%	–	–	–

Candidose de l'œsophage	–	7,1%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	7,1%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	33,3%	–	–
Autres infections bactériennes	–	–	9,5%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	9,5%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	9,5%	–	–
Autres infections virales	–	–	4,8%	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	4,8%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	33,3%	–
Autres infections bactériennes	–	–	–	12,5%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	8,3%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	8,3%	–
Autres infections virales	–	–	–	4,2%	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	–	4,2%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	29,4%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	23,5%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	11,8%
Autres infections bactériennes	–	–	–	–	5,9%
Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	–	–	–	–	5,9%
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	5,9%
Ag HBs +	5,0%	2,2%	3,1%	1,2%	3,8%
Ac VHC +	1,8%	1,7%	2,1%	0,4%	1,9%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,9%	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,4%
0 jour	29,5%	27,5%	35,2%	28,2%	22,3%
1 - 7 jours	23,5%	25,3%	22,3%	27,3%	20,9%
8 - 15 jours	17,1%	13,2%	15,0%	15,1%	18,5%
16 - 30 jours	10,1%	11,5%	4,2%	12,2%	12,6%
1 - 3 mois	9,2%	7,7%	8,3%	5,0%	7,8%
> 3 mois	10,6%	14,8%	15,0%	12,2%	18,0%
Statut à la prise en charge					
Manquant	10,5%	14,3%	10,4%	12,9%	17,2%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	31,6%	35,3%	27,2%	35,2%	28,3%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	16,3%	17,3%	19,1%	10,5%	17,9%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	22,5%	18,0%	23,1%	25,2%	22,0%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	29,6%	29,5%	30,6%	29,1%	31,8%
CD4 (/mm^3)					

Manquant	12,3%	17,0%	14,5%	17,8%	20,6%
Médiane	325	363	319	309	314
q_{25} - q_{75}	179 - 494	184 - 562	154 - 494	176 - 538	158 - 458
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	15,1%	18,7%	21,8%	22,0%	23,4%
%	12,9%	11,5%	13,3%	12,2%	10,6%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	5,9%	5,0%	8,3%	5,4%	12,0%
Médiane	4,5	4,4	4,6	4,6	4,8
q_{25} - q_{75}	2,7- 5,3	2,2- 5,2	2,6- 5,3	3,3- 5,4	3,4- 5,7
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	33,8%	36,8%	28,0%	30,3%	27,3%
%	0,7%	1,7%	0,0 %	2,4%	0,7%
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	34,3%	37,9%	28,0%	31,1%	27,3%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	4,0%
Traitement ARV initié	97,7%	95,1%	92,2%	95,9%	92,8%
Type de traitement					
Monothérapie	0,5%	0,0 %	0,0 %	3,0%	0,5%
Bithérapie	7,9%	13,3%	8,4%	6,9%	11,3%
Trithérapie	84,6%	79,8%	84,8%	84,4%	82,5%
Plus de 3 ARVs	1,9%	1,2%	1,1%	0,0 %	2,1%
Inconnu	5,1%	5,8%	5,6%	5,6%	3,6%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	56,8%	56,1%	57,0%	73,9%	71,2%
8 - 30 jours	30,6%	30,1%	28,6%	20,3%	21,7%
1 - 3 mois	7,8%	7,8%	9,6%	3,2%	6,5%
> 3 mois	4,9%	6,0%	4,8%	2,7%	0,7%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	65,5%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	9,4%	–	–	–	–
3TC/DTG	7,9%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	4,4%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	3,0%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,5%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,5%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	1,5%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,0%	–	–	–	–
3TC/ABC/ATV/RTV	0,5%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	63,2%	–	–	–
3TC/DTG	–	12,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	6,1%	–	–	–

3TC/ABC/DTG	–	4,3%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	3,1%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	3,1%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	1,2%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	1,2%	–	–	–
3TC/ABC/DOR	–	0,6%	–	–	–
3TC/ABC/RAL	–	0,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	71,4%	–	–
3TC/DTG	–	–	7,1%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	6,0%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	3,6%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	3,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	1,2%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	1,2%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,2%	–	–
FTC/TDF	–	–	1,2%	–	–
3TC/ABC/AZT/DTG/FTC/TDF	–	–	0,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	71,1%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	7,8%	–
3TC/DTG	–	–	–	6,4%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	3,2%	–
FTC	–	–	–	2,8%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,3%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,8%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,4%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	0,9%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	0,5%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	71,7%
3TC/DTG	–	–	–	–	10,7%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	7,0%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	2,1%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	1,6%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,1%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	1,1%
3TC	–	–	–	–	0,5%
3TC/ABC/MVC/RAL	–	–	–	–	0,5%
3TC/DOR	–	–	–	–	0,5%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	53,4%	50,0%	48,8%	52,0%	66,0%
3 - 6 mois	19,5%	19,0%	23,7%	20,6%	19,1%

6 - 9 mois	9,2%	12,4%	8,1%	9,4%	8,9%
9 - 12 mois	7,2%	3,7%	4,4%	6,3%	6,0%
> 12 mois	10,8%	14,9%	15,0%	11,8%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	72,9%	69,0%	72,5%	72,6%	85,1%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	84,4%	83,5%	84,1%	83,8%	.
[100 000 - 500 000[copies/ml	77,1%	73,8%	70,9%	70,0%	91,5%
≥500 000 copies/ml	57,1%	17,7%	46,2%	48,9%	63,8%

12.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	58	46	53	61	55
Age					
Médiane	43,5	39,2	38,6	38,0	42,0
q_{25} - q_{75}	38,6 - 52,4	33,1 - 53,8	35,1 - 47,8	30,7 - 46,9	31,3 - 50,1
≥ 60 ans	6,9%	10,9%	7,6%	6,6%	3,6%
≥ 75 ans	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	58,6%	69,6%	58,5%	68,9%	70,9%
Femme cis	41,4%	30,4%	39,6%	29,5%	29,1%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	1,9%	1,6%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	20,7%	28,3%	13,2%	31,2%	27,3%
Femme cis France	8,6%	2,2%	0,0 %	1,6%	3,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	17,2%	28,3%	32,1%	21,3%	27,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	31,0%	23,9%	30,2%	26,2%	21,8%
Homme cis Autres pays	20,7%	13,0%	13,2%	16,4%	16,4%
Femme cis Autres pays	1,7%	4,4%	9,4%	1,6%	3,6%
Autres	0,0 %	0,0 %	1,9%	1,6%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	35,3%	40,6%	22,6%	45,2%	38,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	29,4%	40,6%	54,8%	31,0%	38,5%
Homme cis Autres pays	35,3%	18,8%	22,6%	23,8%	23,1%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	20,8%	7,1%	0,0 %	5,6%	12,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	75,0%	78,6%	76,2%	88,9%	75,0%
Femme cis Autres pays	4,2%	14,3%	23,8%	5,6%	12,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	17,2%	30,4%	13,2%	31,2%	25,5%
UDI	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,8%
Hétérosexuel	63,8%	63,0%	75,5%	54,1%	52,7%

Hémophilie/Transfusion	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	1,7%	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %
Autre ou inconnu	13,8%	6,5%	11,3%	13,1%	20,0%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	24,4%	34,4%	28,3%	20,0%	13,2%
Médiane	2017	2017	2021	2022	2022
q_{25} - q_{75}	2004 -2019	2013 -2020	2017 - 2022	2017 -2022	2016 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	67,2%	71,7%	67,9%	68,9%	60,0%
Médiane	24,9	23,4	23,5	23,6	23,3
q_{25} - q_{75}	22,9 - 27,1	21,9 - 26,0	22,0 - 24,2	21,1 - 28,4	20,4 - 25,6
Maigre (<18.5)	5,3%	15,4%	5,9%	5,3%	9,1%
Normal [18.5-25[	47,4%	53,9%	70,6%	52,6%	63,6%
Surpoids [25-30[	36,8%	15,4%	11,8%	26,3%	18,2%
Obèse (≥ 30)	10,5%	15,4%	11,8%	15,8%	9,1%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	36,2%	37,0%	43,4%	37,7%	32,7%
1 - 7 jours	17,2%	32,6%	17,0%	34,4%	18,2%
8 - 15 jours	12,1%	6,5%	17,0%	6,6%	16,4%
16 - 30 jours	6,9%	6,5%	1,9%	8,2%	3,6%
1 - 3 mois	8,6%	4,4%	7,6%	1,6%	10,9%
> 3 mois	19,0%	13,0%	13,2%	11,5%	18,2%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,7%	2,2%	1,9%	1,6%	1,8%
Médiane	5,3	5,3	5,2	5,4	5,2
q_{25} - q_{75}	4,5- 5,8	4,5- 5,8	4,5- 5,9	4,8- 5,9	4,2- 5,9
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	42,9%	48,8%	35,3%	34,5%	55,4%
3 - 6 mois	28,6%	19,5%	22,3%	20,0%	21,5%
6 - 9 mois	8,9%	12,2%	8,9%	15,1%	8,7%
9 - 12 mois	7,1%	4,9%	8,9%	8,3%	14,5%
> 12 mois	12,5%	14,6%	24,5%	22,1%	0,0%

12.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	11 228	11 255	11 256	11 366	11 113
Age					
Médiane	52,7	53,4	53,9	54,5	55,0
q_{25} - q_{75}	43,7 - 59,9	44,3 - 60,7	44,6 - 61,2	44,9 - 62,0	45,0 - 62,6
≥ 60 ans	24,5%	27,0%	28,9%	31,6%	33,7%
≥ 75 ans	2,6%	2,9%	3,3%	3,8%	4,4%
Genre					
Homme cis	65,6%	65,3%	65,2%	64,8%	64,2%
Femme cis	33,9%	34,2%	34,2%	34,5%	35,0%
Transgenre	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	43,4%	43,3%	42,3%	41,5%	40,3%
Femme cis France	9,3%	9,5%	9,1%	9,3%	9,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	11,0%	10,6%	11,0%	11,3%	11,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	18,1%	18,1%	18,4%	18,8%	19,5%
Homme cis Autres pays	11,3%	11,4%	11,9%	11,9%	12,1%
Femme cis Autres pays	6,5%	6,6%	6,6%	6,4%	6,5%
Autres	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	66,1%	66,3%	64,9%	64,2%	62,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	16,8%	16,3%	16,8%	17,4%	18,3%
Homme cis Autres pays	17,2%	17,4%	18,3%	18,4%	18,9%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	27,5%	27,7%	26,7%	26,9%	25,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	53,4%	53,0%	53,9%	54,5%	55,7%
Femme cis Autres pays	19,1%	19,4%	19,4%	18,6%	18,7%
Groupe d'acquisition					
HSH	41,0%	41,1%	41,2%	40,6%	40,0%
UDI	4,6%	4,3%	3,9%	4,0%	3,8%
Hétérosexuel	46,6%	46,4%	46,7%	47,2%	47,8%
Hémophilie/Transfusion	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%
Périnatal	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%
Autre ou inconnu	6,0%	6,3%	6,3%	6,2%	6,5%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	12,8%	12,8%	12,4%	12,6%	12,3%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	24,4%	23,9%	24,6%	25,1%	25,8%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%
Hétérosexuel Autres pays	8,2%	8,4%	8,5%	8,2%	8,4%
HSH France	33,0%	33,0%	32,6%	31,8%	30,7%
HSH Afrique subsaharienne	1,8%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%

HSH Afrique du Nord	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,4%
HSH Autre pays	5,0%	5,2%	5,5%	5,6%	5,7%
Autre France	7,1%	7,2%	6,7%	6,8%	6,6%
Autre Afrique subsaharienne	3,1%	3,1%	3,1%	3,2%	3,4%
Autre Afrique du Nord	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Autre Autres pays	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%
IMC kg/m²					
Manquant	32,3%	29,0%	26,9%	25,2%	26,5%
Médiane	25,0	25,1	25,1	25,3	25,5
q_{25} - q_{75}	22,3 - 28,4	22,5 - 28,7	22,5 - 28,7	22,5 - 28,7	22,7 - 29,0
Maigre (<18.5)	3,0%	2,8%	2,9%	3,1%	3,0%
Normal [18.5-25[	47,2%	46,2%	45,9%	44,6%	43,2%
Surpoids [25-30[	32,2%	33,0%	33,1%	33,1%	33,3%
Obèse (≥ 30)	17,7%	17,9%	18,1%	19,2%	20,5%
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,3%	5,2%	5,4%	5,4%	5,4%
Stade SIDA	22,4%	21,9%	21,5%	21,5%	21,3%
Ag HBs +	6,7%	6,5%	6,5%	6,3%	6,5%
Ac VHC +	11,5%	11,1%	10,7%	10,6%	10,4%
Année de diagnostic					
Médiane	2004	2004	2004	2005	2005
q_{25} - q_{75}	1995 - 2012	1995 - 2012	1996 - 2013	1996 - 2013	1996 -2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
≤ 1996	29,2%	28,7%	27,2%	26,7%	25,6%
1997-2004	23,7%	23,3%	22,8%	22,2%	22,1%
2005-2012	24,9%	24,4%	24,7%	24,1%	23,5%
≥ 2013	22,1%	23,6%	25,3%	26,9%	28,9%
Traitement ARV					
En cours	95,5%	95,7%	96,3%	96,6%	97,0%
Antécédents	3,8%	3,6%	3,1%	2,8%	2,5%
Jamais traité	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%
Type de traitement					
Monothérapie	3,6%	3,2%	3,6%	4,3%	5,0%
Bithérapie	19,6%	22,9%	25,7%	27,6%	29,0%
Trithérapie	73,5%	70,8%	67,5%	65,1%	63,2%
Plus de 3 ARVs	3,3%	3,2%	3,2%	3,0%	2,8%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	18,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	9,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	9,1%	–	–	–	–
DTG/RPV	5,4%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	5,2%	–	–	–	–

3TC/DTG	5,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	4,6%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	3,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	3,3%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	21,0%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	9,7%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,7%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	8,5%	–	–	–
DTG/RPV	–	5,8%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	4,3%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,6%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,4%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	3,2%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	3,2%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	22,9%	–	–
3TC/DTG	–	–	10,8%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	9,2%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	7,5%	–	–
DTG/RPV	–	–	6,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	4,2%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	3,3%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	3,0%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	2,8%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	2,8%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	24,4%	–
3TC/DTG	–	–	–	12,4%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	8,8%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	6,4%	–
DTG/RPV	–	–	–	6,1%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,9%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	2,7%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	2,5%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,5%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	2,4%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	26,6%
3TC/DTG	–	–	–	–	14,0%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	8,5%
DTG/RPV	–	–	–	–	6,2%

3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	5,8%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	5,7%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	2,6%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	2,2%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	2,1%
EFV/FTC/TDF	–	–	–	–	2,1%
Charge virale					
Manquant	23,4%	19,6%	19,7%	18,9%	20,6%
< 200 copies/mL	95,9%	95,7%	96,0%	96,6%	96,6%
< 50 copies/mL	91,2%	91,5%	91,3%	92,9%	92,8%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,2%	96,0%	96,3%	96,8%	96,8%
< 50 copies/mL	91,7%	91,8%	91,6%	93,1%	93,0%
CD4(/mm^3)					
Manquant	19,1%	15,8%	16,0%	16,5%	18,8%
Médiane	623	619	636	643	645
q_{25} - q_{75}	456 - 822	454 - 815	463 - 840	470 - 849	469 - 844
CD4>500/mm^3	69,2%	68,3%	70,0%	71,1%	70,7%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	22,3%	19,0%	19,1%	19,4%	21,1%
%	42,4%	44,3%	46,3%	47,6%	46,5%

13.CORESS ÎLE-DE-FRANCE EST

13.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	250	276	282	314	241
Age					
Médiane	35,4	36,2	36,7	36,2	34,8
q_{25} - q_{75}	29,3 - 44,7	28,1 - 46,6	28,6 - 48,4	28,6 - 46,7	28,6 - 45,4
≥ 60 ans	4,4%	5,8%	9,9%	8,0%	7,5%
≥ 75 ans	0,0 %	0,7%	0,7%	0,3%	0,8%
Genre					
Homme cis	63,2%	69,9%	70,9%	63,4%	72,6%
Femme cis	36,0%	27,9%	28,4%	33,4%	25,7%
Transgenre	0,8%	2,2%	0,7%	3,2%	1,7%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	27,2%	28,3%	25,5%	24,8%	31,5%
Femme cis France	3,2%	2,9%	3,6%	4,1%	5,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	18,4%	25,0%	23,1%	22,3%	23,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	29,2%	20,7%	21,3%	26,8%	16,2%
Homme cis Autres pays	17,6%	16,7%	22,3%	16,2%	17,8%
Femme cis Autres pays	3,6%	4,4%	3,6%	2,6%	3,7%
Autres	0,8%	2,2%	0,7%	3,2%	1,7%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	43,0%	40,4%	36,0%	39,2%	43,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	29,1%	35,8%	32,5%	35,2%	32,0%
Homme cis Autres pays	27,9%	23,8%	31,5%	25,6%	24,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	8,9%	10,4%	12,5%	12,4%	22,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	81,1%	74,0%	75,0%	80,0%	62,9%
Femme cis Autres pays	10,0%	15,6%	12,5%	7,6%	14,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	38,0%	43,5%	41,5%	41,1%	47,3%
UDI	1,6%	1,5%	0,7%	1,0%	0,4%
Hétérosexuel	56,0%	49,6%	53,6%	52,6%	46,9%
Hémophilie/Transfusion	0,4%	0,4%	0,0 %	0,3%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0%	0,4%
Autre ou inconnu	4,0%	5,1%	4,3%	4,1%	5,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	8,0%	5,8%	7,5%	8,6%	10,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	40,8%	36,6%	35,8%	37,9%	28,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,2%	2,5%	3,6%	1,9%	3,3%
Hétérosexuel Autres pays	6,0%	4,7%	6,7%	4,1%	4,6%
HSH France	20,8%	24,3%	20,2%	19,4%	25,3%

HSH Afrique subsaharienne	4,8%	5,8%	6,4%	8,3%	8,7%
HSH Afrique du Nord	4,8%	4,0%	5,7%	2,6%	3,3%
HSH Autre pays	7,6%	9,4%	9,2%	10,8%	10,0%
Autre France	1,6%	1,5%	1,8%	1,9%	1,7%
Autre Afrique subsaharienne	2,0%	3,6%	2,1%	2,9%	2,5%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3%	0,8%
Autre Autres pays	2,4%	1,8%	1,1%	1,3%	0,8%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	10,9%	14,3%	11,1%	6,4%	14,0%
Médiane	2018	2018	2019	2020	2021
q_{25} - q_{75}	2006 - 2019	2010 - 2020	2012 - 2022	2011 - 2023	2013 -2023
IMC kg/m²					
Manquant	44,8%	38,0%	43,3%	42,4%	40,7%
Médiane	23,0	23,4	23,3	23,5	23,8
q_{25} - q_{75}	20,7 - 26,0	21,0 - 26,3	20,7 - 26,3	21,3 - 27,4	20,9 - 26,7
Maigre (<18.5)	8,7%	4,1%	8,8%	4,4%	9,1%
Normal [18.5-25[	62,3%	63,2%	60,6%	56,4%	55,2%
Surpoids [25-30[	19,6%	21,6%	21,3%	23,8%	23,8%
Obèse (≥ 30)	9,4%	11,1%	9,4%	15,5%	11,9%
Statut fumeur					
Inconnu	57,4%	53,3%	57,1%	55,4%	67,2%
Non-fumeur	32,1%	34,4%	39,7%	47,1%	38,0%
Ex-fumeur	40,6%	39,1%	31,4%	30,0%	36,7%
Fumeur actuel	27,4%	26,6%	28,9%	22,9%	25,3%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	11,6%	11,2%	8,2%	9,9%	11,6%
Stade SIDA	11,6%	17,0%	10,6%	9,9%	7,1%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	20,7%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	17,2%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	13,8%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	10,3%	–	–	–	–
Sarcome de Kaposi	10,3%	–	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	3,5%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	17,0%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	12,8%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	12,8%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	8,5%	–	–	–
Infection mycobactérienne	–	6,4%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	6,4%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Toxoplasmose cérébrale	–	–	16,7%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	10,0%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	10,0%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	10,0%	–	–
Autres infections virales	–	–	6,7%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	6,7%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	16,1%	–
Sarcome de Kaposi	–	–	–	16,1%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	12,9%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	9,7%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	9,7%	–
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	–	–	6,5%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	23,5%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	17,7%
Infection mycobactérienne	–	–	–	–	11,8%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	–	11,8%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	11,8%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	5,9%
Ag HBs +	8,0%	5,1%	4,6%	4,1%	2,1%
Ac VHC +	4,4%	4,4%	2,5%	3,2%	2,5%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	21,2%	23,9%	26,2%	25,2%	23,7%
1 - 7 jours	29,6%	29,7%	29,4%	29,9%	30,7%
8 - 15 jours	17,6%	22,5%	19,9%	22,3%	19,5%
16 - 30 jours	10,0%	11,2%	8,5%	5,7%	9,5%
1 - 3 mois	8,0%	5,1%	7,8%	5,7%	6,2%
> 3 mois	13,6%	7,6%	8,2%	11,2%	10,4%
Statut à la prise en charge					
Manquant	4,0%	2,9%	3,9%	3,5%	7,1%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	32,9%	31,0%	36,9%	36,6%	37,5%

350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	17,9%	19,4%	17,0%	16,5%	18,8%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	19,6%	18,7%	19,6%	19,1%	19,6%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	29,6%	31,0%	26,6%	27,7%	24,1%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	4,8%	3,3%	5,3%	4,1%	8,3%
Médiane	341	321	383	363	378
q_{25} - q_{75}	163 - 522	166 - 508	206 - 577	187 - 545	200 - 549
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	12,4%	11,6%	11,0%	15,6%	14,5%
%	12,3%	7,4%	10,0%	10,2%	7,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,6%	0,7%	3,2%	0,3%	0,0 %
Médiane	4,9	4,9	4,9	4,8	4,6
q_{25} - q_{75}	3,9- 5,4	4,1- 5,6	3,8- 5,5	3,8- 5,5	3,6- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,4%	0,0 %	0,0 %	0,3%	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,4%	0,0 %	0,3%	0,0 %
Traitement ARV initié	96,0%	97,8%	96,8%	97,8%	93,0%
Type de traitement					
Monothérapie	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	4,6%	7,0%	4,8%	3,3%	2,7%
Trithérapie	92,1%	90,7%	92,7%	96,1%	96,4%
Plus de 3 ARVs	1,7%	2,2%	2,2%	0,7%	0,5%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,4%	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	36,0%	37,2%	51,0%	47,6%	50,6%
8 - 30 jours	44,3%	48,6%	33,0%	41,1%	36,8%
1 - 3 mois	11,2%	10,7%	8,9%	8,0%	7,1%
> 3 mois	8,4%	3,5%	7,1%	3,3%	5,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
DRV/FTC/RTV/TDF	27,5%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	24,6%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	22,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	5,8%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,8%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	2,5%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	2,1%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,7%	–	–	–	–

DOR	1,3%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,3%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	38,5%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	20,4%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	14,1%	–	–	–
3TC/DTG	–	6,3%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,7%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	3,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	3,0%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,2%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,9%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	29,8%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	29,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	17,3%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	5,2%	–	–
3TC/DTG	–	–	4,4%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	2,9%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	1,8%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,1%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	1,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	43,0%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	34,5%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	9,5%	–
3TC/DTG	–	–	–	2,6%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	2,0%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,0%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	2,0%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,6%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,0%	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	–	0,3%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	42,9%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	34,4%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	8,9%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,5%
3TC/DTG	–	–	–	–	2,2%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	2,2%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	1,8%

FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	0,9%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	0,5%
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	–	–	0,5%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	48,3%	49,8%	51,1%	53,0%	63,0%
3 - 6 mois	20,4%	26,1%	22,1%	23,6%	21,6%
6 - 9 mois	13,8%	7,0%	11,0%	11,0%	8,7%
9 - 12 mois	4,2%	4,8%	4,4%	4,6%	.
> 12 mois	13,4%	12,4%	11,3%	7,9%	.
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	68,6%	75,8%	73,3%	76,5%	84,6%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	86,6%	90,0%	91,3%	85,4%	97,6%
[100 000 - 500 000[copies/ml	55,3%	57,1%	57,4%	76,9%	79,0%
≥500 000 copies/ml	46,2%	56,9%	53,8%	55,9%	51,9%

13.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	71	83	72	84	54
Age					
Médiane	39,7	42,7	43,5	41,5	42,2
q_{25} - q_{75}	30,5 - 47,0	35,9 - 54,0	36,1 - 54,5	33,3 - 51,0	34,6 - 54,3
≥ 60 ans	8,5%	12,1%	16,7%	14,3%	14,8%
≥ 75 ans	0,0 %	2,4%	2,8%	0,0 %	1,9%
Genre					
Homme cis	62,0%	71,1%	66,7%	56,0%	66,7%
Femme cis	38,0%	28,9%	33,3%	42,9%	31,5%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,9%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	18,3%	25,3%	12,5%	16,7%	20,4%
Femme cis France	1,4%	3,6%	2,8%	3,6%	5,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	21,1%	26,5%	26,4%	27,4%	29,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	29,6%	20,5%	27,8%	32,1%	18,5%
Homme cis Autres pays	22,5%	19,3%	27,8%	11,9%	16,7%
Femme cis Autres pays	7,0%	4,8%	2,8%	7,1%	7,4%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,9%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	29,6%	35,6%	18,8%	29,8%	30,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	34,1%	37,3%	39,6%	48,9%	44,4%
Homme cis Autres pays	36,4%	27,1%	41,7%	21,3%	25,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	3,7%	12,5%	8,3%	8,3%	17,7%

Femme cis Afrique subsaharienne	77,8%	70,8%	83,3%	75,0%	58,8%
Femme cis Autres pays	18,5%	16,7%	8,3%	16,7%	23,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	21,1%	28,9%	12,5%	20,2%	35,2%
UDI	4,2%	1,2%	1,4%	2,4%	0,0 %
Hétérosexuel	69,0%	65,1%	79,2%	66,7%	59,3%
Hémophilie/Transfusion	1,4%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %
Autre ou inconnu	4,2%	4,8%	6,9%	9,5%	5,6%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	12,3%	23,7%	9,8%	11,9%	20,0%
Médiane	2017	2015	2017	2019	2021
q_{25} - q_{75}	2002 - 2019	2006 -2019	2006 - 2021	2011 - 2022	2006 - 2023
IMC kg/m²					
Manquant	46,5%	42,2%	44,4%	40,5%	53,7%
Médiane	22,5	22,7	22,7	21,9	22,5
q_{25} - q_{75}	19,6 - 24,1	20,4 - 25,1	19,8 - 27,0	19,4 - 25,8	20,5 - 24,8
Maigre (<18.5)	15,8%	4,2%	20,0%	10,0%	12,0%
Normal [18.5-25[	65,8%	68,8%	52,5%	64,0%	64,0%
Surpoids [25-30[	13,2%	20,8%	12,5%	18,0%	12,0%
Obèse (≥ 30)	5,3%	6,3%	15,0%	8,0%	12,0%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	32,4%	37,4%	38,9%	31,0%	22,2%
1 - 7 jours	31,0%	25,3%	27,8%	32,1%	31,5%
8 - 15 jours	9,9%	18,1%	12,5%	15,5%	18,5%
16 - 30 jours	7,0%	7,2%	6,9%	3,6%	7,4%
1 - 3 mois	5,6%	3,6%	5,6%	4,8%	7,4%
> 3 mois	14,1%	8,4%	8,3%	13,1%	13,0%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	2,8%	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,2	5,5	5,4	5,4	5,6
q_{25} - q_{75}	4,8 - 6,1	4,9 - 6,2	4,4 - 5,9	4,8 - 5,9	5,0 - 6,0
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	33,8%	43,7%	41,0%	37,7%	49,8%
3 - 6 mois	25,0%	28,8%	21,2%	33,0%	13,1%
6 - 9 mois	11,1%	5,0%	15,8%	13,9%	18,3%
9 - 12 mois	7,9%	7,5%	5,1%	10,5%	18,9%
> 12 mois	22,2%	15,0%	17,0%	4,9%	0,0%

13.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	9 928	9 990	10 163	10 422	10 495
Age					
Médiane	50,7	51,2	51,7	52,0	52,6
q_{25} - q_{75}	41,8 - 58,4	42,1 - 59,0	42,5 - 59,7	42,8 - 60,4	43,0 - 61,0
≥ 60 ans	20,6%	21,9%	24,0%	26,1%	28,1%
≥ 75 ans	1,9%	2,2%	2,4%	2,8%	3,0%
Genre					
Homme cis	62,1%	62,3%	62,4%	61,7%	61,9%
Femme cis	37,1%	37,0%	36,8%	37,3%	37,1%
Transgenre	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	31,0%	30,6%	30,2%	29,5%	29,3%
Femme cis France	6,0%	5,8%	5,7%	5,5%	5,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	18,2%	18,4%	18,5%	18,6%	18,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	26,7%	27,0%	26,9%	27,4%	27,3%
Homme cis Autres pays	12,9%	13,2%	13,7%	13,6%	13,7%
Femme cis Autres pays	4,4%	4,1%	4,2%	4,4%	4,3%
Autres	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	50,0%	49,2%	48,4%	47,8%	47,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	29,3%	29,6%	29,6%	30,2%	30,5%
Homme cis Autres pays	20,7%	21,2%	21,9%	22,0%	22,1%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	16,2%	15,7%	15,5%	14,8%	14,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	72,0%	73,1%	73,2%	73,4%	73,6%
Femme cis Autres pays	11,8%	11,2%	11,3%	11,7%	11,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	32,5%	32,9%	33,4%	33,1%	33,4%
UDI	4,1%	3,9%	3,7%	3,6%	3,4%
Hétérosexuel	58,3%	58,0%	57,7%	58,0%	57,9%
Hémophilie/Transfusion	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%
Périnatal	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%
Autre ou inconnu	3,4%	3,5%	3,5%	3,6%	3,6%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	9,6%	9,2%	8,9%	8,7%	8,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	40,4%	40,8%	40,6%	41,0%	40,8%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%
Hétérosexuel Autres pays	5,6%	5,5%	5,7%	5,8%	5,7%
HSH France	23,0%	22,8%	22,8%	22,2%	22,0%
HSH Afrique subsaharienne	2,0%	2,2%	2,2%	2,5%	2,7%
HSH Afrique du Nord	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,7%

HSH Autre pays	6,0%	6,3%	6,7%	6,8%	6,9%
Autre France	4,7%	4,6%	4,4%	4,3%	4,2%
Autre Afrique subsaharienne	2,5%	2,6%	2,7%	2,6%	2,7%
Autre Afrique du Nord	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%
Autre Autres pays	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%
IMC kg/m²					
Manquant	28,0%	22,5%	23,4%	21,8%	23,8%
Médiane	25,7	25,9	25,7	25,9	26,1
q_{25} - q_{75}	22,7 - 29,6	22,8 - 29,7	22,7 - 29,5	22,9 - 29,7	23,0 - 30,1
Maigre (<18.5)	3,1%	3,0%	3,4%	3,1%	2,9%
Normal [18.5-25[	41,4%	39,9%	41,1%	39,6%	39,7%
Surpoids [25-30[	32,7%	33,6%	32,6%	33,2%	32,0%
Obèse (≥ 30)	22,8%	23,5%	22,9%	24,0%	25,5%
Prise en charge au stade de la primo-infection	4,9%	5,0%	5,1%	4,8%	5,0%
Stade SIDA	19,3%	19,4%	19,0%	19,3%	18,8%
Ag HBs +	7,3%	7,4%	7,3%	7,4%	7,3%
Ac VHC +	9,9%	9,7%	9,4%	9,2%	9,1%
Année de diagnostic					
Médiane	2006	2006	2007	2007	2008
q_{25} - q_{75}	1999 -2013	1999 -2014	2000 - 2015	2000 - 2015	2000 - 2016
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
≤ 1996	19,2%	18,6%	18,0%	17,4%	16,7%
1997-2004	25,3%	24,6%	23,8%	23,2%	22,7%
2005-2012	27,1%	26,6%	26,0%	25,3%	24,6%
≥ 2013	28,4%	30,2%	32,1%	34,1%	36,0%
Traitement ARV					
En cours	96,9%	96,7%	96,9%	97,3%	97,9%
Antécédents	2,1%	2,4%	2,1%	1,9%	1,5%
Jamais traité	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,7%
Type de traitement					
Monothérapie	1,0%	0,9%	0,7%	0,7%	0,8%
Bithérapie	8,9%	11,5%	15,2%	16,3%	18,8%
Trithérapie	86,8%	84,7%	81,6%	80,7%	78,4%
Plus de 3 ARVs	3,3%	2,9%	2,6%	2,3%	2,0%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	16,5%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	13,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	11,6%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	8,9%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	7,3%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	7,3%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	4,7%	–	–	–	–

DTG/RPV	2,9%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	2,9%	–	–	–	–
3TC/DTG	2,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	19,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	12,7%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	11,5%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	8,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	6,2%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	5,9%	–	–	–
3TC/DTG	–	4,7%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	4,5%	–	–	–
DTG/RPV	–	3,4%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	3,4%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	21,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	11,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	10,7%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	8,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	6,9%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	5,7%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	4,6%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	4,2%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	4,0%	–	–
DTG/RPV	–	–	3,7%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	22,7%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	11,0%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	9,9%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	7,7%	–
3TC/DTG	–	–	–	7,5%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	5,3%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	5,1%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	3,8%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	3,8%	–
DTG/RPV	–	–	–	3,7%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	23,5%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,4%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	9,0%
3TC/DTG	–	–	–	–	8,8%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	7,8%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	5,8%

3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,6%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	4,2%
DTG/RPV	–	–	–	–	3,8%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	3,4%
Charge virale					
Manquant	9,7%	7,2%	6,8%	6,8%	8,4%
< 200 copies/mL	94,7%	95,5%	94,9%	95,3%	96,0%
< 50 copies/mL	89,4%	91,5%	90,1%	91,0%	92,0%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	95,3%	96,1%	95,5%	95,7%	96,1%
< 50 copies/mL	90,1%	92,2%	90,8%	91,5%	92,2%
CD4(/mm^3)					
Manquant	9,7%	7,0%	6,4%	6,8%	8,8%
Médiane	640	638	654	665	668
q_{25} - q_{75}	457 - 854	458 - 848	463 - 865	472 - 884	478 - 887
CD4>500/mm^3	69,6%	69,2%	70,4%	71,6%	72,4%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	21,9%	19,8%	18,3%	18,0%	19,3%
%	41,0%	42,2%	43,1%	44,0%	45,1%

14.CORESS ÎLE-DE-FRANCE NORD OUEST

14.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	315	273	283	288	267
Age					
Médiane	36,8	35,4	36,9	36,7	35,9
q_{25} - q_{75}	28,6 - 46,7	29,1 - 45,3	29,4 - 47,7	28,9 - 47,9	29,1 - 47,2
≥ 60 ans	6,0%	7,0%	8,1%	4,5%	6,7%
≥ 75 ans	0,0 %	1,5%	0,4%	0,7%	0,8%
Genre					
Homme cis	61,9%	58,6%	56,5%	55,6%	61,1%
Femme cis	33,0%	35,2%	34,3%	38,2%	31,8%
Transgenre	5,1%	6,2%	9,2%	6,3%	7,1%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	26,7%	27,5%	22,3%	22,9%	25,5%
Femme cis France	5,4%	5,9%	3,2%	3,8%	3,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	16,2%	13,6%	16,6%	17,4%	15,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	21,9%	26,0%	25,8%	28,1%	22,5%
Homme cis Autres pays	19,1%	17,6%	17,7%	15,3%	20,6%
Femme cis Autres pays	5,7%	3,3%	5,3%	6,3%	6,0%
Autres	5,1%	6,2%	9,2%	6,3%	7,1%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	43,1%	46,9%	39,4%	41,3%	41,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	26,2%	23,1%	29,4%	31,3%	24,5%
Homme cis Autres pays	30,8%	30,0%	31,3%	27,5%	33,7%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	16,4%	16,7%	9,3%	10,0%	10,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	66,4%	74,0%	75,3%	73,6%	70,6%
Femme cis Autres pays	17,3%	9,4%	15,5%	16,4%	18,8%
Groupe d'acquisition					
HSH	37,8%	36,3%	41,0%	35,8%	40,8%
UDI	1,6%	0,7%	0,4%	0,7%	0,4%
Hétérosexuel	53,3%	57,9%	50,2%	55,6%	51,7%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,4%	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	1,1%	0,7%	0,4%	0,4%
Autre ou inconnu	7,3%	4,0%	7,4%	7,6%	6,7%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	12,1%	13,6%	9,5%	8,7%	12,0%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	30,8%	34,1%	32,9%	36,8%	29,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	3,2%	3,7%	2,5%	3,5%	3,8%
Hétérosexuel Autres pays	7,3%	6,6%	5,3%	6,6%	6,7%
HSH France	18,4%	19,4%	15,6%	17,4%	15,7%

HSH Afrique subsaharienne	3,5%	2,6%	5,3%	3,8%	5,6%
HSH Afrique du Nord	3,8%	1,5%	5,0%	3,1%	7,1%
HSH Autre pays	12,1%	12,8%	15,2%	11,5%	12,4%
Autre France	1,9%	1,5%	1,8%	1,4%	1,5%
Autre Afrique subsaharienne	3,8%	2,9%	4,6%	4,9%	3,0%
Autre Afrique du Nord	0,6%	0,4%	1,1%	0,7%	0,8%
Autre Autres pays	2,5%	1,1%	1,4%	1,7%	2,3%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	29,1%	22,4%	17,4%	8,6%	11,1%
Médiane	2018	2018	2021	2021	2022
q_{25} - q_{75}	2006 -2019	2005 -2021	2014 -2022	2011 - 2023	2013 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	50,2%	49,5%	53,4%	54,9%	57,7%
Médiane	23,2	24,2	24,5	23,7	22,7
q_{25} - q_{75}	21,0 - 26,0	21,3 - 27,7	21,9 - 27,2	21,7 - 28,1	21,1 - 25,7
Maigre (<18.5)	10,8%	7,3%	6,1%	6,9%	12,4%
Normal [18.5-25[	57,3%	50,0%	54,6%	52,3%	58,4%
Surpoids [25-30[	22,9%	27,5%	27,3%	23,9%	25,7%
Obèse (≥ 30)	8,9%	15,2%	12,1%	16,9%	3,5%
Statut fumeur					
Inconnu	49,8%	52,6%	53,6%	58,7%	68,5%
Non-fumeur	48,4%	55,8%	51,9%	54,6%	48,8%
Ex-fumeur	14,7%	11,6%	14,5%	19,3%	19,1%
Fumeur actuel	36,9%	32,6%	33,6%	26,1%	32,1%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	19,0%	9,5%	6,8%	9,7%	11,1%
Médiane	10,0	10,0	10,0	6,5	10,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 12,5	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	7,6%	6,6%	7,4%	6,6%	7,5%
Stade SIDA	9,5%	14,7%	9,9%	12,2%	7,5%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	26,7%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	13,3%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	6,7%	–	–	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	6,7%	–	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	6,7%	–	–	–	–
Infection mycobactérienne	6,7%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	30,0%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	15,0%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	12,5%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	12,5%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	7,5%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	5,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Toxoplasmose cérébrale	–	–	17,9%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	14,3%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	10,7%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	7,1%	–	–
Infection mycobactérienne	–	–	7,1%	–	–
Infections multiples	–	–	7,1%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	25,7%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	25,7%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	14,3%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	8,6%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	5,7%	–
Autres infections bactériennes	–	–	–	2,9%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	25,0%
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	–	10,0%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	10,0%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	10,0%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	10,0%
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	–	–	5,0%
Ag HBs +	4,1%	1,8%	6,0%	5,6%	1,5%
Ac VHC +	3,8%	4,0%	1,8%	3,1%	1,9%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,3%	0,0 %	0,4%	0,0 %	0,0 %
0 jour	31,5%	27,5%	29,4%	27,1%	27,3%
1 - 7 jours	24,2%	24,5%	24,1%	28,8%	25,8%
8 - 15 jours	15,9%	16,9%	17,4%	17,4%	18,0%
16 - 30 jours	8,6%	8,8%	7,8%	9,0%	10,5%
1 - 3 mois	6,7%	7,3%	6,7%	5,2%	4,9%
> 3 mois	13,1%	15,0%	14,5%	12,5%	13,5%
Statut à la prise en charge					
Manquant	4,1%	3,7%	3,9%	7,3%	3,8%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	30,8%	33,1%	36,0%	32,2%	33,9%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	19,2%	19,0%	18,0%	17,2%	21,4%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	18,5%	16,7%	15,4%	19,5%	22,2%

CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	31,5%	31,2%	30,5%	31,1%	22,6%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	5,1%	4,4%	5,0%	10,1%	4,1%
Médiane	340	355	360	342	371
q_{25} - q_{75}	170 - 515	172 - 553	156 - 560	158 - 550	221 - 550
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	13,7%	15,8%	16,6%	21,9%	13,1%
%	13,2%	14,4%	9,3%	8,4%	13,8%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	3,8%	1,1%	1,1%	0,4%	2,3%
Médiane	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7
q_{25} - q_{75}	3,8- 5,5	3,7- 5,5	3,6- 5,5	3,6- 5,4	3,8- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	38,2%	32,4%	26,2%	10,2%	8,3%
%	0,0 %	1,1%	0,0 %	1,2%	0,8%
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	38,8%	33,2%	27,0%	12,4%	10,2%
%	0,0 %	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%
Traitement ARV initié	96,8%	98,5%	97,5%	97,2%	94,8%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,4%	0,7%	0,4%	0,0 %
Bithérapie	4,6%	14,1%	11,2%	9,6%	16,2%
Trithérapie	91,8%	82,2%	87,0%	87,1%	83,0%
Plus de 3 ARVs	2,0%	1,9%	1,1%	2,5%	0,8%
Inconnu	1,6%	1,5%	0,0 %	0,4%	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	43,8%	42,3%	51,9%	56,2%	58,4%
8 - 30 jours	37,0%	43,6%	34,1%	33,4%	30,4%
1 - 3 mois	16,2%	12,1%	10,2%	6,7%	7,7%
> 3 mois	3,0%	2,0%	3,8%	3,7%	3,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	51,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	24,0%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	5,0%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	3,3%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	2,3%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,7%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	1,7%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					

BIC/FTC/TAF	–	50,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	16,2%	–	–	–
3TC/DTG	–	13,6%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	4,5%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	1,9%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	1,9%	–	–	–
BIC/DTG/FTC/TAF	–	1,1%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,1%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	62,3%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	12,7%	–	–
3TC/DTG	–	–	10,1%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	2,5%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	2,2%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	1,8%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,5%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,1%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	0,7%	–	–
DRV/RTV	–	–	0,7%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	69,9%	–
3TC/DTG	–	–	–	9,3%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	5,0%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	4,3%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	3,2%	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	–	1,4%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,4%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,1%	–
3TC/DTG/TDF	–	–	–	0,7%	–
FTC/RAL/T20/TDF	–	–	–	0,7%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	66,0%
3TC/DTG	–	–	–	–	16,2%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	5,5%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	5,1%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,6%
EFV/FTC/TDF	–	–	–	–	1,2%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,2%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	0,8%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	0,8%
3TC/DRV/ETV/RTV	–	–	–	–	0,4%

Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	43,1%	49,2%	49,9%	55,8%	64,1%
3 - 6 mois	25,4%	24,0%	17,5%	24,4%	28,2%
6 - 9 mois	11,3%	9,6%	12,6%	10,7%	.
9 - 12 mois	4,6%	5,5%	9,5%	3,5%	.
> 12 mois	15,7%	11,8%	10,4%	5,6%	.
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	68,4%	73,2%	67,5%	80,2%	92,3%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	79,3%	88,9%	84,2%	93,9%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	66,2%	69,7%	58,5%	71,2%	78,0%
≥500 000 copies/ml	40,6%	41,7%	47,2%	60,2%	83,9%

14.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	95	82	83	83	58
Age					
Médiane	43,6	40,5	39,9	42,7	38,5
q_{25} - q_{75}	32,9 - 51,9	32,6 - 48,7	33,4 - 49,9	32,6 - 48,3	34,5 - 50,6
≥ 60 ans	8,4%	9,8%	9,6%	3,6%	8,6%
≥ 75 ans	0,0 %	1,2%	1,2%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	66,3%	54,9%	55,4%	57,8%	60,3%
Femme cis	33,7%	42,7%	39,8%	38,6%	37,9%
Transgenre	0,0 %	2,4%	4,8%	3,6%	1,7%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	26,3%	20,7%	21,7%	15,7%	19,0%
Femme cis France	5,3%	2,4%	2,4%	2,4%	3,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	19,5%	16,9%	26,5%	19,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	20,0%	36,6%	28,9%	30,1%	25,9%
Homme cis Autres pays	20,0%	14,6%	16,9%	15,7%	22,4%
Femme cis Autres pays	8,4%	3,7%	8,4%	6,0%	8,6%
Autres	0,0 %	2,4%	4,8%	3,6%	1,7%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	39,7%	37,8%	39,1%	27,1%	31,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	30,2%	35,6%	30,4%	45,8%	31,4%
Homme cis Autres pays	30,2%	26,7%	30,4%	27,1%	37,1%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	15,6%	5,7%	6,1%	6,3%	9,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	59,4%	85,7%	72,7%	78,1%	68,2%
Femme cis Autres pays	25,0%	8,6%	21,2%	15,6%	22,7%
Groupe d'acquisition					

HSH	29,5%	18,3%	24,1%	24,1%	17,2%
UDI	2,1%	0,0 %	1,2%	1,2%	0,0 %
Hétérosexuel	60,0%	76,8%	57,8%	60,2%	72,4%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	2,4%	1,2%	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	8,4%	2,4%	14,5%	14,5%	10,3%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	35,4%	22,6%	14,5%	14,7%	6,7%
Médiane	2016	2017	2021	2019	2021
q_{25} - q_{75}	2001 - 2019	2004 - 2020	2013 -2022	2003-2022	2013 - 2023
IMC kg/m²					
Manquant	50,5%	41,5%	56,6%	45,8%	56,9%
Médiane	22,4	23,3	22,5	22,4	21,2
q_{25} - q_{75}	20,1 - 26,4	20,7 - 27,1	21,1 - 24,8	20,7 - 25,2	18,4 - 23,4
Maigre (<18.5)	14,9%	10,4%	13,9%	15,6%	28,0%
Normal [18.5-25[	53,2%	52,1%	63,9%	57,8%	60,0%
Surpoids [25-30[	25,5%	25,0%	16,7%	22,2%	12,0%
Obèse (≥ 30)	6,4%	12,5%	5,6%	4,4%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	34,7%	32,9%	37,4%	32,5%	34,5%
1 - 7 jours	22,1%	23,2%	18,1%	31,3%	20,7%
8 - 15 jours	17,9%	18,3%	19,3%	16,9%	17,2%
16 - 30 jours	10,5%	6,1%	8,4%	7,2%	12,1%
1 - 3 mois	5,3%	11,0%	6,0%	4,8%	5,2%
> 3 mois	9,5%	8,5%	10,8%	7,2%	10,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	3,2%	2,4%	0,0 %	0,0 %	5,2%
Médiane	5,2	5,4	5,4	5,4	5,3
q_{25} - q_{75}	4,8- 5,8	4,9- 5,8	4,9- 6,1	4,8- 5,8	5,0- 5,8
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	24,6%	29,0%	31,8%	40,1%	47,8%
3 - 6 mois	28,5%	29,5%	19,9%	33,3%	31,8%
6 - 9 mois	20,6%	16,1%	16,1%	13,3%	.
9 - 12 mois	4,6%	8,5%	12,0%	2,8%	.
> 12 mois	21,7%	17,0%	20,2%	10,5%	.

14.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	14 526	14 354	14 280	14 383	14 390
Age					
Médiane	50,4	51,0	51,7	52,3	53,0
q_{25} - q_{75}	41,8 - 58,2	42,4 - 58,9	42,8 - 59,7	43,3 - 60,4	43,8 - 61,1
≥ 60 ans	20,3%	22,0%	24,0%	26,3%	28,3%
≥ 75 ans	2,4%	2,5%	2,8%	3,3%	3,8%
Genre					
Homme cis	52,8%	52,1%	52,2%	52,0%	51,5%
Femme cis	43,3%	43,8%	43,4%	43,6%	44,0%
Transgenre	3,9%	4,2%	4,5%	4,4%	4,5%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	25,1%	24,8%	24,7%	24,1%	23,5%
Femme cis France	7,6%	7,7%	7,5%	7,2%	7,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	16,3%	16,0%	15,9%	16,2%	16,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	29,9%	30,2%	30,1%	30,5%	30,8%
Homme cis Autres pays	11,4%	11,3%	11,6%	11,7%	11,9%
Femme cis Autres pays	5,8%	5,9%	5,8%	5,9%	6,0%
Autres	3,9%	4,2%	4,5%	4,4%	4,5%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	47,6%	47,6%	47,3%	46,3%	45,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	30,8%	30,7%	30,4%	31,1%	31,3%
Homme cis Autres pays	21,6%	21,7%	22,3%	22,6%	23,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	17,5%	17,5%	17,2%	16,6%	16,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	69,0%	69,0%	69,5%	69,8%	70,1%
Femme cis Autres pays	13,5%	13,5%	13,3%	13,6%	13,6%
Groupe d'acquisition					
HSH	26,5%	26,5%	27,2%	26,9%	26,9%
UDI	5,2%	4,9%	4,8%	4,6%	4,4%
Hétérosexuel	63,1%	63,2%	62,4%	62,9%	63,0%
Hémophilie/Transfusion	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
Périnatal	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%
Autre ou inconnu	3,4%	3,4%	3,7%	3,8%	3,8%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	11,3%	11,4%	11,2%	11,0%	10,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	42,0%	41,9%	41,5%	42,0%	42,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	3,5%	3,6%	3,5%	3,5%	3,5%
Hétérosexuel Autres pays	6,4%	6,4%	6,2%	6,5%	6,5%
HSH France	16,1%	16,0%	15,9%	15,4%	15,1%
HSH Afrique subsaharienne	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	1,8%
HSH Afrique du Nord	1,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,5%

HSH Autre pays	7,5%	7,6%	8,1%	8,4%	8,4%
Autre France	5,5%	5,3%	5,3%	5,1%	5,0%
Autre Afrique subsaharienne	2,7%	2,8%	2,9%	3,0%	3,1%
Autre Afrique du Nord	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Autre Autres pays	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%
IMC kg/m²					
Manquant	32,9%	32,1%	32,1%	29,9%	29,9%
Médiane	26,4	26,4	26,4	26,6	26,8
q_{25} - q_{75}	23,3 - 30,1	23,4 - 30,3	23,4 - 30,1	23,5 - 30,4	23,7 - 30,5
Maigre (<18.5)	2,7%	2,4%	2,6%	2,7%	2,3%
Normal [18.5-25[	36,4%	35,9%	35,5%	34,6%	33,8%
Surpoids [25-30[	34,7%	35,0%	35,7%	35,9%	35,4%
Obèse (≥ 30)	26,3%	26,7%	26,2%	26,8%	28,5%
Prise en charge au stade de la primo-infection	4,5%	4,5%	4,5%	4,6%	4,6%
Stade SIDA	21,8%	21,7%	21,5%	21,3%	21,1%
Ag HBs +	6,7%	6,6%	6,7%	6,7%	6,6%
Ac VHC +	9,9%	9,7%	9,6%	9,3%	9,2%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2005	2006	2006	2007
q_{25} - q_{75}	1998 -2012	1999 -2013	1999 - 2013	1999 - 2014	2000 - 2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0 %	0,0%	0,0%	0,0%
≤ 1996	20,4%	19,7%	19,2%	18,6%	17,9%
1997-2004	27,0%	26,6%	26,0%	25,2%	24,7%
2005-2012	27,8%	27,6%	26,8%	26,2%	26,1%
≥ 2013	24,8%	26,1%	28,1%	29,9%	31,4%
Traitement ARV					
En cours	97,5%	97,4%	97,5%	97,2%	97,0%
Antécédents	1,8%	1,9%	1,9%	2,1%	2,4%
Jamais traité	0,8%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%
Type de traitement					
Monothérapie	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%
Bithérapie	14,0%	17,5%	22,7%	26,6%	29,7%
Trithérapie	81,6%	78,5%	73,6%	70,0%	67,1%
Plus de 3 ARVs	3,4%	3,2%	2,9%	2,7%	2,4%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	15,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	12,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	11,4%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	8,2%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	7,4%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	6,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	4,6%	–	–	–	–

3TC/DTG	4,4%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	3,6%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TDF	1,7%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	18,8%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	11,0%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	10,7%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,7%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	7,0%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	6,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	6,4%	–	–	–
DTG/RPV	–	5,3%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,0%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,7%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	22,0%	–	–
3TC/DTG	–	–	10,8%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	9,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,1%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	6,3%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	5,5%	–	–
DTG/RPV	–	–	5,5%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	5,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	3,8%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,5%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	24,0%	–
3TC/DTG	–	–	–	13,3%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	8,4%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	7,9%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	6,0%	–
DTG/RPV	–	–	–	5,6%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	4,5%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	4,5%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	4,1%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	4,0%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	25,5%
3TC/DTG	–	–	–	–	15,7%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	7,9%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	7,2%
DTG/RPV	–	–	–	–	5,7%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	5,5%

CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	5,0%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,9%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	3,6%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	3,3%
Charge virale					
Manquant	8,4%	6,9%	7,3%	8,0%	7,5%
< 200 copies/mL	95,3%	95,5%	95,4%	95,8%	96,3%
< 50 copies/mL	90,1%	91,2%	90,3%	91,8%	92,5%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	95,7%	95,8%	95,7%	96,0%	96,5%
< 50 copies/mL	90,5%	91,6%	90,6%	92,1%	92,6%
CD4(/mm^3)					
Manquant	9,6%	7,3%	8,5%	9,5%	9,2%
Médiane	654	650	670	680	696
q_{25} - q_{75}	467 - 872	472 - 870	481 - 895	486 - 909	500 - 930
CD4>500/mm^3	70,6%	71,2%	72,5%	73,1%	74,5%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	17,6%	18,3%	17,3%	16,2%	17,4%
%	41,5%	43,3%	44,6%	46,5%	47,7%

15.CORESS ÎLE-DE-FRANCE SUD

15.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	199	193	200	168	186
Age					
Médiane	37,4	38,5	35,5	36,0	35,9
q_{25} - q_{75}	28,3 - 47,1	30,8 - 47,8	28,0 - 44,9	29,3 - 48,2	27,8 - 46,6
≥ 60 ans	9,6%	7,3%	8,0%	8,9%	10,8%
≥ 75 ans	0,5%	1,0%	1,0%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	63,3%	66,8%	72,5%	68,5%	73,1%
Femme cis	35,7%	31,1%	27,0%	31,6%	25,3%
Transgenre	1,0%	2,1%	0,5%	0,0 %	1,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	27,1%	34,2%	36,5%	29,2%	30,7%
Femme cis France	4,0%	3,1%	1,5%	1,8%	3,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	19,1%	15,0%	18,0%	19,6%	18,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	27,6%	21,2%	21,5%	28,6%	18,8%
Homme cis Autres pays	17,1%	17,6%	18,0%	19,6%	23,7%
Femme cis Autres pays	4,0%	6,7%	4,0%	1,2%	3,2%
Autres	1,0%	2,1%	0,5%	0,0 %	1,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	42,9%	51,2%	50,3%	42,6%	41,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	30,2%	22,5%	24,8%	28,7%	25,7%
Homme cis Autres pays	27,0%	26,4%	24,8%	28,7%	32,4%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	11,3%	10,0%	5,6%	5,7%	12,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	77,5%	68,3%	79,6%	90,6%	74,5%
Femme cis Autres pays	11,3%	21,7%	14,8%	3,8%	12,8%
Groupe d'acquisition					
HSH	41,7%	40,9%	46,0%	42,9%	46,8%
UDI	0,5%	1,0%	0,5%	0,6%	1,1%
Hétérosexuel	51,3%	53,4%	46,5%	47,6%	43,6%
Hémophilie/Transfusion	0,5%	0,0 %	0,0 %	1,8%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,5%	0,0 %	0,5%
Autre ou inconnu	6,0%	4,7%	6,5%	7,1%	8,1%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	8,0%	9,8%	8,5%	7,1%	9,7%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	36,7%	30,6%	31,5%	35,7%	24,7%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,0%	4,2%	2,0%	1,8%	3,2%
Hétérosexuel Autres pays	5,5%	8,8%	4,5%	3,0%	5,9%
HSH France	21,1%	26,9%	26,5%	21,4%	21,0%

HSH Afrique subsaharienne	7,5%	3,1%	5,5%	7,7%	8,1%
HSH Afrique du Nord	4,0%	2,1%	4,0%	4,8%	5,4%
HSH Autre pays	9,1%	8,8%	10,0%	8,9%	12,4%
Autre France	2,5%	1,6%	3,5%	2,4%	3,2%
Autre Afrique subsaharienne	2,5%	2,6%	2,5%	4,8%	4,8%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	1,0%	0,0 %	1,1%
Autre Autres pays	2,0%	1,6%	0,5%	2,4%	0,5%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	36,0%	33,6%	24,4%	18,1%	13,0%
Médiane	2018	2018	2020	2021	2022
q_{25} - q_{75}	2009 - 2019	2009 -2020	2012 - 2022	2009 - 2023	2014 - 2023
IMC kg/m²					
Manquant	31,7%	35,8%	36,5%	31,0%	33,3%
Médiane	23,8	23,1	23,5	23,5	22,6
q_{25} - q_{75}	21,2 - 26,8	20,8 - 26,7	21,2 - 25,9	20,8 - 26,2	20,2 - 25,3
Maigre (<18.5)	5,9%	7,3%	7,1%	4,3%	10,5%
Normal [18.5-25[	53,7%	59,7%	59,8%	66,4%	62,1%
Surpoids [25-30[	26,5%	25,8%	21,3%	20,7%	15,3%
Obèse (≥ 30)	14,0%	7,3%	11,8%	8,6%	12,1%
Statut fumeur					
Inconnu	55,3%	49,7%	41,8%	36,9%	39,3%
Non-fumeur	40,5%	36,1%	40,7%	43,4%	44,3%
Ex-fumeur	30,3%	33,0%	28,3%	28,3%	22,1%
Fumeur actuel	29,2%	30,9%	31,0%	28,3%	33,6%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	11,5%	6,7%	11,4%	13,3%	15,8%
Médiane	5,0	15,0	5,0	6,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 5,0	5,0 - 20,0	5,0 - 10,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	10,6%	9,3%	15,5%	10,1%	16,7%
Stade SIDA	11,1%	16,6%	10,5%	11,9%	14,0%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Candidose de l'œsophage	22,7%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	18,2%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	18,2%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium Avium ou Kansasii, disséminée ou extrapulmonaire	9,1%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	9,1%	–	–	–	–
Candidose	4,6%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose de l'œsophage	–	28,1%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	15,6%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	12,5%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	9,4%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	6,3%	–	–	–
Infections multiples	–	6,3%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	14,3%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	14,3%	–	–
Infection mycobactérienne	–	–	9,5%	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	9,5%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	9,5%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	9,5%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	35,0%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	25,0%	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	–	5,0%	–
Infection mycobactérienne	–	–	–	5,0%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	5,0%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	5,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	30,8%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	19,2%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	19,2%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	15,4%
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	3,9%
Infection à Mycobacterium Avium ou Kansasii, disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	–	3,9%
Ag HBs +	5,0%	4,2%	4,5%	7,1%	3,8%
Ac VHC +	5,5%	4,2%	2,5%	1,2%	3,2%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	1,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	32,5%	24,9%	32,5%	26,8%	30,7%
1 - 7 jours	22,3%	28,5%	28,5%	34,5%	30,7%
8 - 15 jours	13,7%	20,2%	13,5%	19,1%	17,2%
16 - 30 jours	10,2%	14,5%	6,5%	7,7%	6,5%
1 - 3 mois	11,2%	5,7%	8,0%	4,8%	4,3%
> 3 mois	10,2%	6,2%	11,0%	7,1%	10,8%
Statut à la prise en charge					
Manquant	3,0%	4,7%	4,0%	3,0%	1,6%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	31,1%	34,2%	32,8%	35,6%	36,1%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	16,1%	12,0%	17,2%	16,0%	12,6%

200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	21,2%	17,4%	18,2%	21,5%	18,0%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	31,6%	36,4%	31,8%	27,0%	33,3%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	4,0%	4,7%	4,5%	4,2%	3,2%
Médiane	302	298	325	340	296
q_{25} - q_{75}	153 - 486	123 - 549	160 - 505	161 - 531	165 - 475
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	15,6%	14,5%	16,0%	10,1%	11,3%
%	11,9%	9,1%	11,3%	9,3%	10,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	4,0%	0,5%	1,5%	0,6%	0,0 %
Médiane	4,8	4,8	5,0	4,9	4,9
q_{25} - q_{75}	4,0- 5,5	3,8- 5,6	4,0- 5,6	4,1- 5,7	4,2- 5,6
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	31,2%	30,1%	22,0%	13,1%	3,2%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4%	1,7%
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	31,2%	30,1%	22,0%	15,7%	3,8%
%	0,0 %	0,7%	0,0 %	1,4%	1,1%
Traitement ARV initié	93,5%	96,9%	99,0%	98,8%	99,5%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,5%	1,0%	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	2,2%	3,2%	1,0%	1,8%	7,0%
Trithérapie	90,9%	93,6%	96,0%	97,0%	89,7%
Plus de 3 ARVs	4,3%	2,7%	2,0%	0,6%	2,2%
Inconnu	2,7%	0,0 %	0,0 %	0,6%	0,5%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	54,2%	55,6%	50,9%	61,5%	61,9%
8 - 30 jours	31,9%	28,3%	33,8%	26,5%	33,1%
1 - 3 mois	9,3%	10,6%	11,6%	9,0%	4,4%
> 3 mois	4,7%	5,6%	3,7%	3,0%	0,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	66,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	9,9%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	3,3%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	2,8%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	2,2%	–	–	–	–
3TC/DTG	2,2%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	2,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	2,2%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,7%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	1,1%	–	–	–	–

Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	60,4%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	11,2%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	3,7%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	3,7%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	3,7%	–	–	–
3TC/DTG	–	2,7%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,7%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	2,1%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	2,1%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	77,3%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	5,1%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	5,1%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	2,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	1,5%	–	–
3TC/DTG	–	–	1,0%	–	–
AZT	–	–	1,0%	–	–
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	–	–	1,0%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	1,0%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,0%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	81,8%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	6,7%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	2,4%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	1,8%	–
3TC/DTG	–	–	–	1,2%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,2%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,2%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	0,6%	–
3TC/DRV/RTV	–	–	–	0,6%	–
3TC/DTG/TDF	–	–	–	0,6%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	79,4%
3TC/DTG	–	–	–	–	7,1%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	5,4%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	2,2%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,1%
3TC/DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	1,1%
3TC/DTG/TDF	–	–	–	–	1,1%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	0,5%
AZT/BIC/DOR/FTC/TAF	–	–	–	–	0,5%

BIC/DTG/FTC/TAF	–	–	–	–	0,5%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	52,6%	49,3%	49,6%	60,3%	70,4%
3 - 6 mois	26,3%	24,9%	26,6%	20,8%	19,3%
6 - 9 mois	12,6%	9,3%	10,7%	8,3%	8,4%
9 - 12 mois	2,3%	4,1%	3,4%	5,3%	1,9%
> 12 mois	6,3%	12,4%	9,7%	5,3%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	78,9%	74,2%	76,2%	81,1%	89,7%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	88,6%	85,0%	87,3%	90,0%	96,3%
[100 000 - 500 000[copies/ml	84,6%	78,0%	74,8%	81,8%	77,7%
≥500 000 copies/ml	44,4%	47,5%	65,6%	65,0%	83,5%

15.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	61	67	61	44	61
Age					
Médiane	40,3	42,6	40,0	46,8	42,1
q_{25} - q_{75}	33,7 - 48,2	35,1 - 53,1	31,9 - 52,8	37,6 - 57,8	35,6 - 58,6
≥ 60 ans	9,8%	13,4%	14,8%	18,2%	24,6%
≥ 75 ans	0,0 %	3,0%	3,3%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	59,0%	64,2%	68,9%	61,4%	65,6%
Femme cis	41,0%	32,8%	29,5%	38,6%	32,8%
Transgenre	0,0 %	3,0%	1,6%	0,0 %	1,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	19,7%	23,9%	26,2%	18,2%	18,0%
Femme cis France	1,6%	1,5%	1,6%	2,3%	4,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	27,9%	28,4%	19,7%	25,0%	26,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	34,4%	26,9%	19,7%	34,1%	24,6%
Homme cis Autres pays	11,5%	11,9%	23,0%	18,2%	21,3%
Femme cis Autres pays	4,9%	4,5%	8,2%	2,3%	3,3%
Autres	0,0 %	3,0%	1,6%	0,0 %	1,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	33,3%	37,2%	38,1%	29,6%	27,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	47,2%	44,2%	28,6%	40,7%	40,0%
Homme cis Autres pays	19,4%	18,6%	33,3%	29,6%	32,5%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	4,0%	4,6%	5,6%	5,9%	15,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	84,0%	81,8%	66,7%	88,2%	75,0%
Femme cis Autres pays	12,0%	13,6%	27,8%	5,9%	10,0%

Groupe d'acquisition					
HSH	21,3%	23,9%	32,8%	25,0%	14,8%
UDI	1,6%	1,5%	0,0 %	2,3%	3,3%
Hétérosexuel	70,5%	70,2%	55,7%	61,4%	68,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,6%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	6,6%	4,5%	9,8%	6,8%	13,1%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	37,5%	42,9%	20,9%	11,4%	14,9%
Médiane	2018	2016	2019	2016	2019
q_{25} - q_{75}	2013 - 2019	2002 -2020	2005 -2022	1994 -2022	2010 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	32,8%	25,4%	27,9%	18,2%	23,0%
Médiane	23,3	22,2	21,8	22,2	22,1
q_{25} - q_{75}	21,1 - 25,3	19,8 - 25,1	19,4 - 24,8	20,3 - 26,0	19,5 - 24,2
Maigre (<18.5)	7,3%	6,0%	18,2%	11,1%	17,0%
Normal [18.5-25[	63,4%	68,0%	61,4%	61,1%	61,7%
Surpoids [25-30[	19,5%	22,0%	15,9%	19,4%	12,8%
Obèse (≥ 30)	9,8%	4,0%	4,6%	8,3%	8,5%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	42,6%	28,4%	41,0%	38,6%	39,3%
1 - 7 jours	21,3%	38,8%	23,0%	31,8%	24,6%
8 - 15 jours	8,2%	13,4%	8,2%	13,6%	13,1%
16 - 30 jours	8,2%	9,0%	8,2%	4,6%	6,6%
1 - 3 mois	6,6%	3,0%	3,3%	4,6%	4,9%
> 3 mois	13,1%	7,5%	16,4%	6,8%	11,5%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,6%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,4	5,5	5,4	5,4	5,5
q_{25} - q_{75}	4,9- 5,9	4,8- 6,1	4,8- 5,9	4,9- 6,1	4,8-5,8
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	45,0%	43,7%	41,0%	42,5%	61,4%
3 - 6 mois	25,7%	18,8%	34,3%	35,0%	21,7%
6 - 9 mois	20,2%	12,5%	13,3%	7,9%	16,9%
9 - 12 mois	0,0%	4,7%	1,9%	3,7%	0,0%
> 12 mois	9,2%	20,3%	9,5%	10,9%	0,0%

15.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	10 858	10 708	10 565	10 298	10 205
Age					
Médiane	52,7	53,4	53,9	54,6	55,1
q_{25} - q_{75}	43,4 - 59,8	44,0 - 60,5	44,1 - 61,2	44,6 - 62,1	45,0 - 62,8
≥ 60 ans	24,4%	26,7%	28,9%	31,7%	34,3%
≥ 75 ans	2,4%	2,7%	3,1%	3,5%	3,9%
Genre					
Homme cis	62,3%	61,9%	62,2%	62,0%	61,6%
Femme cis	37,4%	37,7%	37,3%	37,6%	38,1%
Transgenre	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	37,1%	36,5%	36,2%	35,8%	35,1%
Femme cis France	9,4%	9,1%	8,8%	8,7%	8,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,6%	13,6%	13,7%	14,1%	14,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	23,8%	24,3%	24,2%	24,6%	25,0%
Homme cis Autres pays	11,6%	11,8%	12,3%	12,1%	12,1%
Femme cis Autres pays	4,3%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%
Autres	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	59,6%	59,0%	58,1%	57,7%	57,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	21,8%	21,9%	22,1%	22,8%	23,3%
Homme cis Autres pays	18,7%	19,1%	19,8%	19,5%	19,7%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	25,1%	24,1%	23,4%	23,1%	22,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	63,6%	64,4%	64,9%	65,3%	65,8%
Femme cis Autres pays	11,4%	11,5%	11,7%	11,6%	11,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	34,3%	34,4%	34,9%	34,5%	34,4%
UDI	6,4%	5,9%	5,6%	5,3%	5,2%
Hétérosexuel	51,6%	51,9%	51,8%	52,0%	52,4%
Hémophilie/Transfusion	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%
Périnatal	1,9%	2,0%	2,1%	2,4%	2,4%
Autre ou inconnu	3,7%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	12,1%	11,8%	11,7%	11,6%	11,5%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	33,0%	33,5%	33,4%	33,7%	34,3%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,1%	2,2%	2,1%	2,2%	2,1%
Hétérosexuel Autres pays	4,3%	4,4%	4,6%	4,5%	4,6%
HSH France	26,0%	25,9%	25,8%	25,4%	25,0%
HSH Afrique subsaharienne	1,5%	1,6%	1,6%	1,9%	2,0%
HSH Afrique du Nord	1,5%	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%

HSH Autre pays	5,4%	5,4%	5,9%	5,8%	5,8%
Autre France	8,5%	8,1%	7,6%	7,6%	7,4%
Autre Afrique subsaharienne	2,8%	2,9%	3,0%	3,2%	3,1%
Autre Afrique du Nord	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%
Autre Autres pays	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
IMC kg/m²					
Manquant	37,4%	31,3%	28,1%	23,0%	22,6%
Médiane	25,3	25,4	25,4	25,5	25,8
q_{25} - q_{75}	22,5 - 28,7	22,5 - 28,7	22,6 - 28,9	22,7 - 29,1	22,9 - 29,4
Maigre (<18.5)	3,6%	3,6%	3,5%	3,3%	3,0%
Normal [18.5-25[	44,1%	43,6%	42,8%	42,5%	40,9%
Surpoids [25-30[	32,8%	33,6%	34,1%	33,3%	33,9%
Obèse (≥ 30)	19,6%	19,2%	19,6%	20,9%	22,3%
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,7%	5,7%	5,9%	5,9%	6,0%
Stade SIDA	21,7%	22,0%	21,7%	21,5%	21,4%
Ag HBs +	6,5%	6,4%	6,5%	6,4%	6,2%
Ac VHC +	12,7%	12,5%	12,1%	11,8%	11,6%
Année de diagnostic					
Médiane	2003	2003	2003	2004	2004
q_{25} - q_{75}	1994 - 2011	1995 - 2011	1995 -2012	1995 -2012	1996 -2013
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%
≤ 1996	30,8%	29,8%	28,6%	27,8%	26,8%
1997-2004	25,4%	25,0%	24,6%	24,6%	24,2%
2005-2012	23,4%	23,2%	22,9%	22,6%	22,4%
≥ 2013	20,4%	21,9%	24,0%	25,0%	26,7%
Traitement ARV					
En cours	97,8%	97,8%	97,7%	97,8%	97,7%
Antécédents	1,6%	1,6%	1,8%	1,8%	2,0%
Jamais traité	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%
Type de traitement					
Monothérapie	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,1%
Bithérapie	14,6%	17,9%	21,6%	24,4%	26,9%
Trithérapie	81,1%	78,2%	74,9%	72,5%	70,1%
Plus de 3 ARVs	2,8%	2,6%	2,2%	1,9%	1,8%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	16,8%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	12,1%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	11,8%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	9,8%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	5,5%	–	–	–	–
DTG/RPV	4,6%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	4,2%	–	–	–	–

EFV/FTC/TDF	4,0%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,9%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	20,3%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	11,5%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	10,7%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	8,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,1%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	5,2%	–	–	–
DTG/RPV	–	4,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,6%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	3,3%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	2,1%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	24,9%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	11,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	9,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,2%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	6,9%	–	–
DTG/RPV	–	–	5,2%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	4,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,7%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	2,5%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,0%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	28,1%	–
3TC/DTG	–	–	–	11,5%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	11,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	8,6%	–
DTG/RPV	–	–	–	5,3%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	5,2%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	3,6%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,5%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	2,4%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	30,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	13,1%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,8%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	8,1%
DTG/RPV	–	–	–	–	5,3%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	4,5%

CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	3,5%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	3,0%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,8%
EFV/FTC/TDF	–	–	–	–	1,7%
Charge virale					
Manquant	9,6%	5,8%	6,2%	4,7%	5,3%
< 200 copies/mL	96,2%	96,2%	96,3%	96,6%	97,3%
< 50 copies/mL	92,4%	92,9%	92,2%	93,5%	94,6%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,6%	96,5%	96,6%	96,8%	97,4%
< 50 copies/mL	93,0%	93,3%	92,6%	93,7%	94,7%
CD4(/mm^3)					
Manquant	9,2%	5,5%	6,5%	5,0%	5,6%
Médiane	627	630	648	647	660
q_{25} - q_{75}	451 - 832	453 - 836	464 - 851	468 - 857	476 - 869
CD4>500/mm^3	68,3%	69,0%	70,2%	70,8%	72,1%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	16,4%	13,4%	13,8%	11,1%	10,2%
%	43,2%	44,7%	45,1%	47,2%	47,9%

16.CORESS LYON – VALLÉE DU RHÔNE

16.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	99	104	108	107	70
Age					
Médiane	38,8	37,0	36,2	36,5	37,8
q_{25} - q_{75}	31,1 -50,1	26,4 -45,9	28,8 -49,1	27,6 -47,3	29,4 - 49,6
≥ 60 ans	6,1%	6,7%	7,4%	6,5%	10,0%
≥ 75 ans	0,0 %	1,0%	1,9%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	71,7%	73,1%	68,5%	60,8%	70,0%
Femme cis	27,3%	26,0%	29,6%	37,4%	27,1%
Transgenre	1,0%	1,0%	1,9%	1,9%	2,9%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	46,5%	48,1%	38,0%	33,6%	47,1%
Femme cis France	7,1%	8,7%	7,4%	4,7%	5,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	16,2%	13,5%	12,0%	14,0%	15,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	17,2%	16,4%	18,5%	29,0%	21,4%
Homme cis Autres pays	9,1%	11,5%	18,5%	13,1%	7,1%
Femme cis Autres pays	3,0%	1,0%	3,7%	3,7%	0,0 %
Autres	1,0%	1,0%	1,9%	1,9%	2,9%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	64,8%	65,8%	55,4%	55,4%	67,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	22,5%	18,4%	17,6%	23,1%	22,5%
Homme cis Autres pays	12,7%	15,8%	27,0%	21,5%	10,2%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	25,9%	33,3%	25,0%	12,5%	21,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	63,0%	63,0%	62,5%	77,5%	79,0%
Femme cis Autres pays	11,1%	3,7%	12,5%	10,0%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	50,5%	51,9%	45,4%	36,5%	50,0%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,9%	0,9%	1,4%
Hétérosexuel	42,4%	34,6%	41,7%	56,1%	42,9%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	1,0%	0,9%	0,0 %	1,4%
Autre ou inconnu	7,1%	12,5%	11,1%	6,5%	4,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	11,1%	12,5%	13,0%	12,2%	11,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	25,3%	20,2%	23,2%	38,3%	30,0%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,0%	1,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	5,1%	1,0%	5,6%	5,6%	1,4%
HSH France	40,4%	41,4%	28,7%	23,4%	37,1%

HSH Afrique subsaharienne	6,1%	4,8%	2,8%	3,7%	4,3%
HSH Afrique du Nord	1,0%	1,0%	5,6%	1,9%	4,3%
HSH Autre pays	3,0%	4,8%	8,3%	7,5%	4,3%
Autre France	3,0%	3,9%	4,6%	2,8%	4,3%
Autre Afrique subsaharienne	2,0%	4,8%	4,6%	0,9%	2,9%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	1,0%	0,9%	1,9%	0,0 %
Autre Autres pays	2,0%	3,9%	2,8%	1,9%	0,0 %
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	15,6%	15,9%	19,0%	16,7%	12,1%
Médiane	2019	2019	2021	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2017-2020	2014-2021	2016-2022	2022-2023	2020-2024
IMC kg/m²					
Manquant	28,3%	24,0%	34,3%	28,0%	27,1%
Médiane	22,8	22,8	23,2	23,0	24,5
q_{25} - q_{75}	20,2 - 27,2	19,9 - 25,1	20,3 - 26,9	20,9 - 26,4	21,3 - 26,1
Maigre (<18.5)	9,9%	7,6%	9,9%	6,5%	9,8%
Normal [18.5-25[	57,8%	67,1%	54,9%	59,7%	49,0%
Surpoids [25-30[	19,7%	19,0%	22,5%	23,4%	29,4%
Obèse (≥ 30)	12,7%	6,3%	12,7%	10,4%	11,8%
Statut fumeur					
Inconnu	11,6%	10,8%	19,8%	19,6%	14,3%
Non-fumeur	3,6%	2,2%	3,5%	2,3%	0,0 %
Ex-fumeur	70,2%	72,5%	62,4%	79,1%	76,7%
Fumeur actuel	26,2%	25,3%	34,1%	18,6%	23,3%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	5,0	5,0	15,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	19,2%	8,7%	12,0%	17,8%	17,1%
Stade SIDA	15,2%	18,3%	15,7%	9,4%	10,0%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Candidose de l'œsophage	26,7%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	26,7%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	13,3%	–	–	–	–
Sarcome de Kaposi	13,3%	–	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	6,7%	–	–	–	–
Leuco-encéphalopathie multifocale progressive	6,7%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	36,8%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	26,3%	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	10,5%	–	–	–
Encéphalopathie due au VIH	–	5,3%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	5,3%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	5,3%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Candidose de l'œsophage	–	–	35,3%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	11,8%	–	–
Sarcome de Kaposi	–	–	11,8%	–	–
Candidose	–	–	5,9%	–	–
Leuco-encéphalopathie multifocale progressive	–	–	5,9%	–	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	5,9%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	50,0%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	20,0%	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	10,0%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	10,0%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	10,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	28,6%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	28,6%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	14,3%
Infections multiples	–	–	–	–	14,3%
Syndrome cachectique inaugural du sida	–	–	–	–	14,3%
Ag HBs +	5,1%	1,9%	0,9%	2,8%	2,9%
Ac VHC +	1,0%	0,0 %	5,6%	3,7%	2,9%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	14,1%	24,0%	20,4%	22,4%	28,6%
1 - 7 jours	39,4%	39,4%	35,2%	32,7%	38,6%
8 - 15 jours	25,3%	15,4%	19,4%	17,8%	17,1%
16 - 30 jours	5,1%	9,6%	8,3%	12,2%	11,4%
1 - 3 mois	6,1%	4,8%	3,7%	4,7%	2,9%
> 3 mois	10,1%	6,7%	13,0%	10,3%	1,4%
Statut à la prise en charge					
Manquant	1,0%	4,8%	4,6%	3,7%	1,4%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	40,8%	33,3%	32,0%	42,7%	44,9%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	12,2%	13,1%	15,5%	17,5%	7,3%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	15,3%	18,2%	20,4%	15,5%	21,7%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	31,6%	35,4%	32,0%	24,3%	26,1%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	1,0%	4,8%	6,5%	5,6%	4,3%
Médiane	341	334	308	404	342
q_{25} - q_{75}	165 - 523	97 - 508	166 - 498	253 - 561	191 - 550

CD4/CD8 >= 1					
Manquant	11,1%	8,7%	13,0%	7,5%	10,0%
%	13,6%	9,5%	11,7%	17,2%	9,5%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	1,0%	1,0%	0,0 %	0,0 %	1,4%
Médiane	5,0	5,0	4,8	4,5	5,0
q_{25} - q_{75}	4,5- 5,6	4,0- 5,7	3,8- 5,7	3,0- 5,2	3,8- 5,6
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	1,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	1,0%	0,9%	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	99,0%	99,0%	99,1%	98,1%	100,0%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	2,0%	3,9%	1,9%	9,5%	8,6%
Trithérapie	96,9%	95,2%	98,1%	89,5%	91,4%
Plus de 3 ARVs	1,0%	1,0%	0,0 %	1,0%	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	44,3%	46,5%	57,6%	51,0%	60,3%
8 - 30 jours	43,3%	40,6%	33,7%	32,4%	38,2%
1 - 3 mois	9,3%	9,9%	7,7%	12,1%	1,5%
> 3 mois	3,1%	3,0%	1,0%	4,6%	0,0%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	58,2%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	15,3%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	6,1%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	6,1%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	6,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	2,0%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	2,0%	–	–	–	–
3TC/ABC/DRV/DTG/RTV	1,0%	–	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	1,0%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	1,0%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	75,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	5,8%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	2,9%	–	–	–
3TC/DTG	–	2,9%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	2,9%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	2,9%	–	–	–

3TC/DOR/TDF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	1,9%	–	–	–
BIC/DOR/FTC/TAF	–	1,0%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	1,0%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	83,2%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	5,6%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	3,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	1,9%	–	–
3TC/DTG	–	–	1,9%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,9%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	0,9%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	0,9%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	76,2%	–
3TC/DTG	–	–	–	9,5%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	4,8%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,9%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	1,9%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,9%	–
3TC/DTG/FTC/TDF	–	–	–	1,0%	–
3TC/DTG/TDF	–	–	–	1,0%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,0%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	82,9%
3TC/DTG	–	–	–	–	7,1%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	5,7%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	2,9%
FTC/TDF	–	–	–	–	1,4%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	57,1%	56,8%	57,3%	72,1%	75,0%
3 - 6 mois	24,1%	26,8%	16,1%	15,4%	20,2%
6 - 9 mois	8,4%	8,3%	12,2%	5,0%	4,8%
9 - 12 mois	2,1%	2,1%	5,6%	4,3%	0,0%
> 12 mois	8,4%	6,2%	8,9%	3,2%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	81,1%	83,5%	73,4%	87,5%	95,2%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	86,7%	93,2%	93,2%	94,7%	91,6%
[100 000 - 500 000[copies/ml	91,3%	83,3%	68,2%	76,5%	95,5%
≥500 000 copies/ml	58,3%	63,0%	45,7%	80,0%	100,0%

16.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	31	35	33	25	18
Age					
Médiane	46,5	42,9	44,4	40,5	43,9
q_{25} - q_{75}	34,3 - 54,1	36,5 - 52,3	36,2 - 54,7	35,0 - 54,1	37,6 - 50,8
≥ 60 ans	6,5%	11,4%	18,2%	12,0%	11,1%
≥ 75 ans	0,0 %	2,9%	3,0%	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	77,4%	77,1%	66,7%	72,0%	66,7%
Femme cis	22,6%	22,9%	30,3%	28,0%	33,3%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	3,0%	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	41,9%	40,0%	24,2%	28,0%	55,6%
Femme cis France	6,5%	8,6%	6,1%	4,0%	5,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	19,4%	22,9%	15,2%	16,0%	5,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,9%	14,3%	18,2%	20,0%	27,8%
Homme cis Autres pays	16,1%	14,3%	27,3%	28,0%	5,6%
Femme cis Autres pays	3,2%	0,0 %	6,1%	4,0%	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	3,0%	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	54,2%	51,9%	36,4%	38,9%	83,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	25,0%	29,6%	22,7%	22,2%	8,3%
Homme cis Autres pays	20,8%	18,5%	40,9%	38,9%	8,3%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	28,6%	37,5%	20,0%	14,3%	16,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	57,1%	62,5%	60,0%	71,4%	83,3%
Femme cis Autres pays	14,3%	0,0 %	20,0%	14,3%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	41,9%	45,7%	39,4%	32,0%	44,4%
UDI	0,0 %	0,0 %	3,0%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	41,9%	28,6%	48,5%	56,0%	50,0%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	2,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	16,1%	22,9%	9,1%	12,0%	5,6%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	12,5%	11,1%	22,7%	23,5%	0,0 %
Médiane	2019	2015	2020	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2017 - 2020	2003 - 2019	2017 - 2022	2021 - 2023	2022 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	19,4%	14,3%	18,2%	16,0%	22,2%

Médiane	21,6	22,7	22,0	21,6	23,2
q_{25} - q_{75}	19,6 - 24,2	19,8 - 24,9	18,3 - 26,3	19,9 - 22,5	20,9 - 26,0
Maigre (<18.5)	16,0%	6,7%	25,9%	19,1%	14,3%
Normal [18.5-25[	64,0%	70,0%	44,4%	66,7%	42,9%
Surpoids [25-30[	20,0%	20,0%	22,2%	9,5%	35,7%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	3,3%	7,4%	4,8%	7,1%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	16,1%	34,3%	27,3%	32,0%	44,4%
1 - 7 jours	45,2%	37,1%	33,3%	48,0%	16,7%
8 - 15 jours	19,4%	11,4%	18,2%	0,0 %	16,7%
16 - 30 jours	0,0 %	5,7%	0,0 %	4,0%	16,7%
1 - 3 mois	9,7%	2,9%	3,0%	8,0%	5,6%
> 3 mois	9,7%	8,6%	18,2%	8,0%	0,0 %
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,3	5,7	5,7	5,1	5,5
q_{25} - q_{75}	4,7- 6,0	5,0- 6,2	5,1- 6,1	4,7- 6,0	5,3 - 5,7
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	51,6%	38,2%	33,5%	56,0%	76,8%
3 - 6 mois	16,1%	27,7%	25,4%	16,0%	23,2%
6 - 9 mois	16,1%	18,6%	14,9%	8,0%	0,0%
9 - 12 mois	0,0%	3,1%	7,5%	10,0%	0,0%
> 12 mois	16,1%	12,4%	18,7%	10,0%	0,0%

16.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	5 162	5 150	5 188	5 031	5 019
Age					
Médiane	51,6	52,3	52,8	53,5	54,1
q_{25} - q_{75}	42,2 - 59,8	42,5 - 60,6	42,8 - 61,1	43,4 -61,7	43,8 - 62,4
≥ 60 ans	24,4%	26,5%	27,4%	29,1%	31,6%
≥ 75 ans	3,0%	3,4%	3,9%	4,6%	5,1%
Genre					
Homme cis	70,5%	69,8%	69,6%	69,3%	69,2%
Femme cis	29,1%	29,7%	29,8%	30,2%	30,2%
Transgenre	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	53,8%	52,7%	51,8%	51,2%	51,0%
Femme cis France	8,7%	8,8%	8,6%	8,6%	8,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	7,4%	7,6%	7,9%	8,1%	8,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	17,5%	17,9%	18,1%	18,8%	19,0%
Homme cis Autres pays	9,3%	9,5%	9,9%	9,9%	9,8%
Femme cis Autres pays	2,8%	2,9%	3,1%	2,8%	3,0%
Autres	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	76,4%	75,5%	74,4%	74,0%	73,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	10,5%	10,9%	11,4%	11,7%	12,1%
Homme cis Autres pays	13,1%	13,6%	14,2%	14,3%	14,2%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	30,0%	29,7%	29,0%	28,4%	27,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	60,3%	60,4%	60,8%	62,2%	63,0%
Femme cis Autres pays	9,7%	9,9%	10,2%	9,4%	9,9%
Groupe d'acquisition					
HSH	48,2%	47,8%	47,6%	47,5%	47,5%
UDI	3,6%	3,4%	3,3%	3,2%	3,0%
Hétérosexuel	41,4%	41,8%	41,2%	42,1%	42,2%
Hémophilie/Transfusion	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Périnatal	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%
Autre ou inconnu	4,9%	5,0%	5,7%	5,2%	5,2%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	15,5%	15,4%	14,8%	14,7%	14,3%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	21,1%	21,5%	21,6%	22,5%	22,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,0%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%
Hétérosexuel Autres pays	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	3,1%
HSH France	41,6%	40,8%	40,3%	40,0%	39,8%
HSH Afrique subsaharienne	1,2%	1,3%	1,5%	1,4%	1,5%
HSH Afrique du Nord	1,4%	1,4%	1,6%	1,7%	1,6%

HSH Autre pays	3,9%	4,3%	4,3%	4,4%	4,6%
Autre France	5,6%	5,5%	5,7%	5,4%	5,4%
Autre Afrique subsaharienne	2,5%	2,7%	3,1%	3,0%	2,9%
Autre Afrique du Nord	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,6%
Autre Autres pays	1,5%	1,5%	1,7%	1,5%	1,4%
IMC kg/m²					
Manquant	22,5%	12,8%	12,9%	10,7%	10,8%
Médiane	25,1	25,0	25,0	25,2	25,4
q_{25} - q_{75}	22,3 - 28,4	22,4 - 28,6	22,5 - 28,5	22,5 - 28,7	22,6 - 28,9
Maigre (<18.5)	3,2%	3,3%	3,1%	3,1%	2,8%
Normal [18.5-25[	46,1%	46,5%	46,4%	45,3%	43,9%
Surpoids [25-30[	33,2%	32,5%	32,3%	33,4%	33,3%
Obèse (≥ 30)	17,6%	17,9%	18,2%	18,2%	20,0%
Prise en charge au stade de la primo-infection	11,1%	11,0%	11,0%	11,2%	11,3%
Stade SIDA	19,0%	19,3%	18,8%	18,6%	18,4%
Ag HBs +	5,5%	5,4%	5,6%	5,4%	5,3%
Ac VHC +	9,4%	8,9%	8,9%	8,6%	9,0%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2005	2006	2006	2006
q_{25} - q_{75}	1997 - 2012	1997 - 2013	1997 - 2013	1998 -2014	1998 -2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,1%	0,0%	0,0%	0,0 %	0,0%
≤ 1996	24,9%	24,1%	23,2%	22,7%	22,1%
1997-2004	23,6%	22,6%	22,1%	21,6%	21,1%
2005-2012	27,4%	27,0%	26,5%	26,1%	25,8%
≥ 2013	24,1%	26,3%	28,2%	29,7%	31,0%
Traitement ARV					
En cours	97,9%	97,7%	97,8%	97,9%	98,6%
Antécédents	1,8%	2,0%	1,9%	1,7%	1,3%
Jamais traité	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%
Type de traitement					
Monothérapie	2,2%	2,1%	1,8%	1,6%	1,5%
Bithérapie	9,7%	12,6%	18,7%	22,9%	26,7%
Trithérapie	85,4%	82,9%	77,5%	73,8%	70,5%
Plus de 3 ARVs	2,7%	2,4%	2,0%	1,7%	1,3%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	21,0%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	19,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	16,5%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	11,0%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,8%	–	–	–	–
DTG/RPV	2,9%	–	–	–	–

FTC/RPV/TDF	1,9%	–	–	–	–
DRV/RTV	1,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	24,2%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	20,4%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	14,0%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	9,2%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,0%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,1%	–	–	–
DTG/RPV	–	3,0%	–	–	–
DRV/RTV	–	1,5%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,5%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,4%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	28,8%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	17,8%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	11,9%	–	–
3TC/DTG	–	–	11,4%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	5,5%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,9%	–	–
DTG/RPV	–	–	2,7%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,4%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,3%	–	–
DRV/RTV	–	–	1,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	31,4%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	16,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	14,8%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	10,2%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	4,0%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	3,5%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	3,2%	–
DTG/RPV	–	–	–	3,0%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,3%	–
DRV/RTV	–	–	–	1,0%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	32,6%
3TC/DTG	–	–	–	–	17,7%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	14,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	9,1%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	5,1%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	4,0%

COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	3,0%
DTG/RPV	–	–	–	–	2,8%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	0,9%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	0,9%
Charge virale					
Manquant	6,7%	4,9%	4,5%	5,4%	6,9%
< 200 copies/mL	97,1%	97,3%	97,3%	98,0%	97,9%
< 50 copies/mL	93,2%	93,9%	93,4%	95,4%	95,0%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,4%	97,8%	97,7%	98,4%	97,9%
< 50 copies/mL	93,7%	94,5%	93,9%	95,8%	95,1%
CD4(/mm^3)					
Manquant	7,4%	5,3%	5,2%	6,5%	8,6%
Médiane	642	643	657	679	694
q_{25} - q_{75}	470 - 855	464 - 847	475 - 861	490 - 882	508 - 902
CD4>500/mm^3	70,6%	70,4%	71,7%	73,8%	75,9%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	11,0%	8,2%	7,7%	9,3%	12,9%
%	44,9%	46,1%	49,3%	51,3%	52,4%

17.CORESS MARTINIQUE

17.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	29	24	26	40	32
Age					
Médiane	32,0	35,6	43,9	37,5	36,0
q_{25} - q_{75}	26,1 - 42,5	27,2 - 44,9	30,3 - 57,2	28,7 - 47,9	29,9 - 50,7
≥ 60 ans	10,3%	8,3%	11,5%	10,0%	15,6%
≥ 75 ans	3,5%	0,0 %	0,0 %	2,5%	0,0 %
Genre					
Homme cis	75,9%	62,5%	84,6%	77,5%	65,6%
Femme cis	24,1%	37,5%	15,4%	22,5%	34,4%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	55,2%	41,7%	65,4%	55,0%	59,4%
Femme cis France	20,7%	16,7%	11,5%	17,5%	25,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	3,9%	0,0 %	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5%	6,3%
Homme cis Autres pays	20,7%	20,8%	15,4%	22,5%	6,3%
Femme cis Autres pays	3,5%	20,8%	3,9%	2,5%	3,1%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	72,7%	66,7%	77,3%	71,0%	90,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	4,6%	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	27,3%	33,3%	18,2%	29,0%	9,5%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	85,7%	44,4%	75,0%	77,8%	72,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,1%	18,2%
Femme cis Autres pays	14,3%	55,6%	25,0%	11,1%	9,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	44,8%	29,2%	42,3%	32,5%	28,1%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	55,2%	54,2%	50,0%	62,5%	62,5%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	3,9%	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	0,0 %	16,7%	3,9%	5,0%	9,4%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	37,9%	20,8%	30,8%	42,5%	50,0%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	3,9%	2,5%	6,3%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	17,2%	33,3%	15,4%	17,5%	6,3%
HSH France	37,9%	29,2%	42,3%	30,0%	25,0%

HSH Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Autre pays	6,9%	0,0 %	0,0 %	2,5%	3,1%
Autre France	0,0 %	8,3%	3,9%	0,0 %	9,4%
Autre Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	0,0 %	8,3%	3,9%	5,0%	0,0 %
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	18,2%	0,0 %
Médiane	2019	2019	2013	2017	2018
q_{25} - q_{75}	2016 - 2019	2017 - 2020	2001 - 2019	2013 -2021	2010 - 2018
IMC kg/m²					
Manquant	44,8%	66,7%	61,5%	55,0%	40,6%
Médiane	23,0	27,3	22,1	22,1	23,4
q_{25} - q_{75}	21,4 - 25,8	21,9 - 32,9	19,5 - 26,8	19,6 - 25,7	20,6 - 32,8
Maigre (<18.5)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,7%	5,3%
Normal [18.5-25[	68,8%	37,5%	60,0%	55,6%	52,6%
Surpoids [25-30[	25,0%	25,0%	30,0%	11,1%	15,8%
Obèse (≥ 30)	6,3%	37,5%	10,0%	16,7%	26,3%
Statut fumeur					
Inconnu	24,1%	20,8%	15,4%	22,5%	21,9%
Non-fumeur	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,0%
Ex-fumeur	86,4%	100,0%	90,9%	83,9%	72,0%
Fumeur actuel	13,6%	0,0 %	9,1%	16,1%	24,0%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 5,0	0,0 - 0,0	5,0 - 5,0	5,0 - 15,0	5,0 - 5,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,9%	8,3%	3,9%	7,5%	15,6%
Stade SIDA	13,8%	20,8%	7,7%	22,5%	9,4%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Autres maladies infectieuses et parasitaires	25,0%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	25,0%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	25,0%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	25,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	60,0%	–	–	–
Infection mycobactérienne	–	20,0%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	20,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	50,0%	–	–

Syndrome cachectique inaugural du sida	–	–	50,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	44,4%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	22,2%	–
Encéphalopathie due au VIH	–	–	–	11,1%	–
Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	11,1%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	11,1%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	33,3%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	33,3%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	33,3%
Ag HBs +	0,0 %	0,0 %	7,7%	2,5%	0,0 %
Ac VHC +	0,0 %	0,0 %	7,7%	0,0 %	3,1%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	4,2%	0,0 %	0,0 %	3,1%
0 jour	17,2%	17,4%	23,1%	12,5%	9,7%
1 - 7 jours	41,4%	34,8%	50,0%	35,0%	29,0%
8 - 15 jours	13,8%	26,1%	15,4%	17,5%	35,5%
16 - 30 jours	10,3%	17,4%	7,7%	15,0%	19,4%
1 - 3 mois	6,9%	0,0 %	0,0 %	10,0%	3,2%
> 3 mois	10,3%	4,4%	3,9%	10,0%	3,2%
Statut à la prise en charge					
Manquant	3,5%	8,3%	0,0 %	0,0 %	3,1%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	39,3%	27,3%	30,8%	32,5%	61,3%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	17,9%	22,7%	19,2%	20,0%	16,1%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	17,9%	22,7%	19,2%	12,5%	6,5%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	25,0%	27,3%	30,8%	35,0%	16,1%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	3,5%	12,5%	0,0 %	0,0 %	3,1%
Médiane	372	337	349	333	507
q_{25} - q_{75}	275 - 581	124 - 464	172 - 568	141 - 540	347 - 641
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	3,5%	12,5%	3,9%	5,0%	3,1%
%	7,1%	9,5%	4,0%	7,9%	12,9%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	4,2%	0,0 %	0,0 %	3,1%
Médiane	4,7	4,3	5,1	4,6	4,4
q_{25} - q_{75}	3,9- 5,2	2,4- 5,1	4,7- 5,5	4,2 - 5,5	3,- 5,1
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	100,0%	91,7%	100,0%	100,0%	96,9%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	6,9%	0,0 %	3,9%	2,5%	16,1%
Trithérapie	86,2%	100,0%	96,2%	95,0%	83,9%
Plus de 3 ARVs	6,9%	0,0 %	0,0 %	2,5%	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	69,0%	50,4%	53,9%	59,0%	83,9%
8 - 30 jours	27,6%	44,6%	42,3%	41,0%	16,1%
1 - 3 mois	3,5%	5,0%	3,9%	0,0%	0,0%
> 3 mois	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	72,4%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	6,9%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	6,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/AZT/BIC/FTC/TAF	3,5%	–	–	–	–
3TC/DTG	3,5%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	3,5%	–	–	–	–
FTC/TDF	3,5%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	90,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	4,6%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	4,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	88,5%	–	–
3TC/DTG	–	–	3,9%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	3,9%	–	–
ETV/FTC/TDF	–	–	3,9%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	85,0%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	10,0%	–
3TC/DTG	–	–	–	2,5%	–
DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,5%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	74,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	16,1%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	6,5%
3TC/DOR/DTG	–	–	–	–	3,2%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					

≤ 3 mois	65,5%	72,7%	63,4%	56,6%	89,3%
3 - 6 mois	10,3%	18,2%	16,3%	31,8%	10,7%
6 - 9 mois	13,8%	0,0%	0,0%	8,7%	0,0%
9 - 12 mois	3,5%	4,6%	4,1%	0,0%	0,0%
> 12 mois	6,9%	4,6%	16,3%	2,9%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	75,9%	90,9%	79,6%	88,4%	100,0%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	85,0%	100,0%	100,0%	88,5%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	57,1%	80,0%	77,8%	80,0%	100,0%
≥500 000 copies/ml	50,0%	100,0%	40,0%	100,0%	100,0%

17.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	7	6	8	14	5
Age					
Médiane	32,4	38,2	56,3	39,8	36,8
q_{25} - q_{75}	26,7 - 41,0	34,3 - 47,2	53,9 - 61,1	34,0 - 44,2	35,6 - 51,7
≥ 60 ans	0,0 %	16,7%	25,0%	7,1%	20,0%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	85,7%	66,7%	87,5%	100,0%	60,0%
Femme cis	14,3%	33,3%	12,5%	0,0 %	40,0%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	42,9%	0,0 %	50,0%	64,3%	60,0%
Femme cis France	14,3%	16,7%	12,5%	0,0 %	20,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,0%
Homme cis Autres pays	42,9%	66,7%	37,5%	35,7%	0,0 %
Femme cis Autres pays	0,0 %	16,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	50,0%	0,0 %	57,1%	64,3%	100,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Homme cis Autres pays	50,0%	100,0%	42,9%	35,7%	0,0 %
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	100,0%	50,0%	100,0%	0,0 %	50,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	50,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	50,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	14,3%	0,0 %	25,0%	35,7%	20,0%

UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	85,7%	50,0%	75,0%	50,0%	60,0%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	0,0 %	50,0%	0,0 %	14,3%	20,0%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	40,0%	0,0 %
Médiane	2019	2019	2001	2021	2023
q_{25} - q_{75}	2016 - 2020	2017 - 2020	1978 -2012	2017 - 2023	2023 - 2023
IMC kg/m²					
Manquant	71,4%	100,0%	50,0%	64,3%	40,0%
Médiane	21,0	.	23,8	20,2	19,3
q_{25} - q_{75}	19,3 - 22,7	. - .	19,7 - 27,0	18,4 - 20,4	14,7 - 35,5
Maigre (<18.5)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	40,0%	33,3%
Normal [18.5-25[	100,0%	0,0 %	50,0%	60,0%	33,3%
Surpoids [25-30[	0,0 %	0,0 %	50,0%	0,0 %	0,0 %
Obèse (≥ 30)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	33,3%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	42,9%	50,0%	25,0%	28,6%	20,0%
1 - 7 jours	14,3%	50,0%	50,0%	42,9%	60,0%
8 - 15 jours	14,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,0%
16 - 30 jours	14,3%	0,0 %	12,5%	0,0 %	0,0 %
1 - 3 mois	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1%	0,0 %
> 3 mois	14,3%	0,0 %	12,5%	21,4%	0,0 %
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	4,9	5,2	5,5	5,6	4,4
q_{25} - q_{75}	4,7- 5,4	4,8- 6,0	4,9- 6,5	5,1- 6,3	2,9- 5,9
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	42,9%	80,0%	50,0%	50,0%	100,0%
3 - 6 mois	14,3%	0,0%	12,5%	33,3%	0,0%
6 - 9 mois	28,6%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%
9 - 12 mois	14,3%	20,0%	12,5%	0,0%	0,0%
> 12 mois	0,0%	0,0%	25,0%	8,3%	0,0%

17.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	1 072	1 079	1 053	1 083	1 068
Age					
Médiane	55,1	55,8	56,8	57,0	57,8
q_{25} - q_{75}	45,1 - 62,0	44,7 - 62,6	45,5 - 63,4	44,4 - 64,1	45,1 - 65,0
≥ 60 ans	31,4%	33,8%	37,2%	39,0%	41,4%
≥ 75 ans	4,9%	5,5%	6,8%	6,7%	7,4%
Genre					
Homme cis	63,0%	62,6%	63,3%	64,0%	63,6%
Femme cis	36,6%	37,0%	36,3%	35,6%	35,9%
Transgenre	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	56,1%	55,5%	55,5%	55,4%	55,2%
Femme cis France	27,5%	27,3%	26,6%	26,7%	26,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	0,8%
Homme cis Autres pays	6,5%	6,7%	7,3%	8,1%	7,9%
Femme cis Autres pays	8,2%	8,8%	9,1%	8,3%	8,3%
Autres	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	89,0%	88,7%	87,7%	86,6%	86,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,6%	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%
Homme cis Autres pays	10,4%	10,7%	11,6%	12,7%	12,4%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	75,3%	73,9%	73,3%	75,1%	74,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	2,3%	2,3%	1,6%	1,6%	2,1%
Femme cis Autres pays	22,5%	23,8%	25,1%	23,4%	23,2%
Groupe d'acquisition					
HSH	29,6%	30,2%	30,8%	31,4%	31,5%
UDI	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%
Hétérosexuel	67,4%	66,4%	65,6%	65,0%	65,0%
Hémophilie/Transfusion	0,8%	0,8%	1,0%	0,9%	0,8%
Périnatal	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%
Autre ou inconnu	0,4%	0,7%	0,7%	0,7%	0,9%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	53,5%	51,9%	50,5%	50,0%	49,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	1,0%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Hétérosexuel Autres pays	12,8%	13,4%	14,2%	14,1%	14,0%
HSH France	27,8%	28,5%	29,0%	29,6%	29,7%
HSH Afrique subsaharienne	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

HSH Autre pays	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Autre France	2,8%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%
Autre Afrique subsaharienne	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Autre Afrique du Nord	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Autre Autres pays	0,0 %	0,2%	0,3%	0,4%	0,2%
IMC kg/m²					
Manquant	18,2%	17,6%	18,0%	8,7%	13,4%
Médiane	25,7	25,2	25,2	25,0	25,2
q_{25} - q_{75}	22,3 - 29,4	22,3 - 29,2	22,1 - 29,2	21,7 - 28,7	22,0 - 28,9
Maigre (<18.5)	4,7%	4,6%	5,2%	6,0%	6,1%
Normal [18.5-25[	40,9%	44,2%	42,8%	43,9%	42,8%
Surpoids [25-30[	31,8%	29,3%	29,6%	29,6%	30,3%
Obèse (≥ 30)	22,6%	21,9%	22,3%	20,5%	20,9%
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,1%	5,2%	5,4%	5,3%	5,4%
Stade SIDA	26,4%	26,8%	26,3%	26,6%	26,0%
Ag HBs +	3,7%	3,6%	4,0%	4,1%	3,8%
Ac VHC +	4,4%	4,5%	4,6%	4,3%	4,2%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2005	2006	2006	2007
q_{25} - q_{75}	1997 - 2013	1997 - 2014	1997 - 2014	1998 -2015	1998-2015
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,1%	0,0 %	0,0 %	0,1%
≤ 1996	24,4%	23,3%	23,1%	21,7%	21,4%
1997-2004	23,2%	23,0%	22,3%	21,5%	20,6%
2005-2012	26,5%	26,1%	24,4%	24,6%	23,3%
≥ 2013	25,9%	27,6%	30,2%	32,2%	34,7%
Traitement ARV					
En cours	95,0%	95,3%	96,5%	97,4%	97,6%
Antécédents	4,4%	4,1%	3,0%	2,3%	2,0%
Jamais traité	0,7%	0,7%	0,5%	0,3%	0,5%
Type de traitement					
Monothérapie	2,0%	1,8%	1,9%	1,7%	1,9%
Bithérapie	25,0%	30,3%	34,5%	35,9%	40,8%
Trithérapie	72,1%	67,1%	63,0%	61,9%	56,9%
Plus de 3 ARVs	1,0%	0,9%	0,7%	0,5%	0,4%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
3TC/ABC/DTG	31,5%	–	–	–	–
3TC/DTG	16,7%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	12,3%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	9,1%	–	–	–	–
DTG/RPV	6,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	5,2%	–	–	–	–

DRV/FTC/RTV/TDF	2,7%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/RPV	1,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	1,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
3TC/ABC/DTG	–	26,5%	–	–	–
3TC/DTG	–	21,5%	–	–	–
BIC/FTC/TAF	–	16,4%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	9,7%	–	–	–
DTG/RPV	–	6,9%	–	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	4,7%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,4%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	1,1%	–	–	–
3TC/ABC/RPV	–	1,0%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
3TC/DTG	–	–	23,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	22,1%	–	–
BIC/FTC/TAF	–	–	20,1%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	8,9%	–	–
DTG/RPV	–	–	7,3%	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	3,6%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,1%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,4%	–	–
3TC/ABC/RPV	–	–	1,3%	–	–
3TC/ABC/NVP	–	–	1,0%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	25,8%	–
3TC/DTG	–	–	–	23,5%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	19,1%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	8,1%	–
DTG/RPV	–	–	–	7,0%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	4,1%	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	–	2,3%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,0%	–
3TC/ABC/RPV	–	–	–	1,0%	–
3TC/ABC/NVP	–	–	–	0,9%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
3TC/DTG	–	–	–	–	27,5%
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	26,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	16,0%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	7,2%
DTG/RPV	–	–	–	–	6,7%

CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	5,3%
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	–	–	1,5%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,0%
3TC/ABC/NVP	–	–	–	–	0,8%
3TC/ABC/RPV	–	–	–	–	0,8%
Charge virale					
Manquant	5,3%	4,4%	4,6%	4,5%	5,4%
< 200 copies/mL	92,9%	93,5%	93,3%	92,9%	94,9%
< 50 copies/mL	87,6%	89,7%	88,3%	88,9%	90,5%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	94,7%	94,8%	94,0%	93,7%	94,9%
< 50 copies/mL	89,8%	91,2%	88,8%	89,7%	90,5%
CD4(/mm^3)					
Manquant	8,9%	6,5%	7,1%	7,9%	9,3%
Médiane	660	670	679	689	710
q_{25} - q_{75}	460 - 871	457 - 882	461 - 882	464 - 926	504 - 939
CD4>500/mm^3	70,3%	69,9%	71,0%	71,2%	75,3%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	9,1%	6,8%	8,2%	8,6%	9,7%
%	43,7%	43,3%	46,6%	48,2%	49,8%

18.CORESS MAYOTTE

18.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	31	43	77	86	70
Age					
Médiane	29,7	29,5	28,5	29,5	31,5
q_{25} - q_{75}	24,6 - 37,0	25,0 -37,5	23,9 - 34,9	24,5 - 36,4	25,8 - 36,3
≥ 60 ans	0,0 %	4,7%	1,3%	2,3%	1,4%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	29,0%	53,5%	37,7%	34,9%	47,1%
Femme cis	71,0%	46,5%	62,3%	64,0%	52,9%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	6,5%	18,6%	7,8%	8,1%	12,9%
Femme cis France	3,2%	2,3%	2,6%	3,5%	0,0 %
Homme cis Afrique subsaharienne	19,4%	34,9%	29,9%	26,7%	34,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	67,7%	44,2%	59,7%	60,5%	52,9%
Homme cis Autres pays	3,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	22,2%	34,8%	20,7%	23,3%	27,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	66,7%	65,2%	79,3%	76,7%	72,7%
Homme cis Autres pays	11,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	4,6%	5,0%	4,2%	5,5%	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	95,5%	95,0%	95,8%	94,6%	100,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	6,5%	16,3%	10,4%	14,0%	14,3%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	93,6%	76,7%	84,4%	77,9%	65,7%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	4,7%	1,3%	1,2%	5,7%
Autre ou inconnu	0,0 %	2,3%	3,9%	5,8%	14,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	9,7%	14,0%	7,8%	5,8%	7,1%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	83,9%	62,8%	76,6%	72,1%	58,6%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH France	0,0 %	7,0%	1,3%	5,8%	5,7%

HSH Afrique subsaharienne	3,2%	9,3%	9,1%	8,1%	8,6%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Autre pays	3,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre France	0,0 %	0,0 %	1,3%	0,0 %	0,0 %
Autre Afrique subsaharienne	0,0 %	7,0%	3,9%	8,1%	20,0%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	21,4%	2,9%	2,9%	14,5%	23,0%
Médiane	2019	2021	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2016 - 2020	2020 -2021	2020 -2022	2021 -2023	2021 -2023
IMC kg/m²					
Manquant	67,7%	74,4%	49,4%	44,2%	71,4%
Médiane	21,9	22,7	23,5	24,1	22,9
q_{25} - q_{75}	20,2 - 24,2	19,2 - 30,4	21,0 - 26,8	21,1 - 27,2	20,3 - 28,8
Maigre (<18.5)	10,0%	0,0 %	12,8%	6,3%	10,0%
Normal [18.5-25[	70,0%	63,6%	51,3%	54,2%	60,0%
Surpoids [25-30[	0,0 %	9,1%	18,0%	25,0%	5,0%
Obèse (≥ 30)	20,0%	27,3%	18,0%	14,6%	25,0%
Statut fumeur					
Inconnu	100,0%	95,4%	96,1%	97,7%	100,0%
Non-fumeur	0,0 %	100,0%	66,7%	100,0%	0,0 %
Ex-fumeur	0,0 %	0,0 %	33,3%	0,0 %	0,0 %
Fumeur actuel	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
q_{25} - q_{75}	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	0,0 %	4,7%	3,9%	1,2%	1,4%
Stade SIDA	9,7%	9,3%	13,0%	9,3%	10,0%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	33,3%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	33,3%	–	–	–	–
Sarcome de Kaposi	33,3%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose de l'œsophage	–	25,0%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	25,0%	–	–	–
Infection à mycobactérie, identifiée ou non disséminée ou extrapulmonaire	–	25,0%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	25,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					

Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	40,0%	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	10,0%	–	–
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	–	10,0%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	10,0%	–	–
Infections multiples	–	–	10,0%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	10,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	37,5%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	25,0%	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	12,5%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	12,5%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	12,5%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Autres infections bactériennes	–	–	–	–	14,3%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	14,3%
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	14,3%
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	–	–	–	14,3%
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	–	14,3%
Infections multiples	–	–	–	–	14,3%
Ag HBs +	0,0 %	2,3%	6,5%	3,5%	2,9%
Ac VHC +	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	25,8%	32,6%	9,1%	20,9%	31,4%
1 - 7 jours	32,3%	23,3%	28,6%	16,3%	18,6%
8 - 15 jours	12,9%	27,9%	24,7%	11,6%	15,7%
16 - 30 jours	9,7%	7,0%	13,0%	23,3%	4,3%
1 - 3 mois	6,5%	4,7%	9,1%	10,5%	8,6%
> 3 mois	12,9%	4,7%	15,6%	17,4%	21,4%
Statut à la prise en charge					
Manquant	12,9%	18,6%	6,5%	17,4%	14,3%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	48,2%	22,9%	26,4%	38,0%	26,7%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	7,4%	31,4%	25,0%	19,7%	23,3%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	22,2%	17,1%	22,2%	21,1%	21,7%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	22,2%	28,6%	26,4%	21,1%	28,3%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	12,9%	18,6%	6,5%	17,4%	17,1%

Médiane	418	357	366	371	368
q_{25} - q_{75}	261 - 617	172 - 471	221 - 497	247 - 598	217 - 567
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	12,9%	18,6%	9,1%	17,4%	17,1%
%	18,5%	11,4%	10,0%	9,9%	10,3%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	3,7	4,3	4,2	4,0	4,5
q_{25} - q_{75}	2,2- 5,1	3,3-5,5	3,2- 4,9	2,5- 4,8	2,7- 5,4
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	1,3%	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	100,0%	100,0%	98,7%	97,7%	94,3%
Type de traitement					
Monothérapie	3,2%	0,0 %	1,3%	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %
Trithérapie	96,8%	95,4%	94,7%	97,6%	97,0%
Plus de 3 ARVs	0,0 %	4,7%	4,0%	1,2%	3,0%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	30,0%	19,1%	17,8%	32,7%	24,8%
8 - 30 jours	30,0%	61,9%	50,1%	52,6%	63,2%
1 - 3 mois	33,3%	16,7%	30,7%	9,8%	8,6%
> 3 mois	6,7%	2,4%	1,4%	4,9%	3,4%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	51,6%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	12,9%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	12,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/TDF	9,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	9,7%	–	–	–	–
DRV	3,2%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	62,8%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	25,6%	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	4,7%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	4,7%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	2,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	56,6%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	11,8%	–	–

FTC/RPV/TAF	–	–	11,8%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	10,5%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	2,6%	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	2,6%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	1,3%	–	–
DRV	–	–	1,3%	–	–
FTC/RAL/RPV/TDF	–	–	1,3%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	69,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	9,5%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	8,3%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	6,0%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	3,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	1,2%	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	–	1,2%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	69,7%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	9,1%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	7,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	6,1%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	3,0%
BIC/DTG/FTC/TAF	–	–	–	–	1,5%
BIC/FTC/TAF/TDF	–	–	–	–	1,5%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,5%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	51,6%	57,1%	59,2%	62,1%	74,7%
3 - 6 mois	32,3%	14,3%	23,7%	22,2%	17,6%
6 - 9 mois	6,5%	21,4%	7,9%	10,5%	.
9 - 12 mois	6,5%	2,4%	2,6%	2,6%	.
> 12 mois	3,2%	4,8%	6,6%	2,6%	.
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	83,9%	71,4%	82,9%	84,3%	92,3%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	94,4%	81,0%	89,6%	85,6%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	100,0%	50,0%	72,7%	100,0%	85,7%
≥500 000 copies/ml	0,0%	50,0%	0,0%	60,0%	33,3%

18.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	6	10	19	15	17
Age					

Médiane	28,9	29,6	34,9	32,8	33,2
q_{25} - q_{75}	25,3 - 30,4	25,6 - 33,3	26,7 - 43,7	24,5 - 39,9	31,2 - 38,1
≥ 60 ans	0,0 %	0,0 %	5,3%	6,7%	0,0 %
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	33,3%	80,0%	47,4%	33,3%	58,8%
Femme cis	66,7%	20,0%	52,6%	66,7%	41,2%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	0,0 %	0,0 %	5,3%	13,3%	17,7%
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,3%	0,0 %
Homme cis Afrique subsaharienne	33,3%	80,0%	42,1%	20,0%	41,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	66,7%	20,0%	52,6%	53,3%	41,2%
Homme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	0,0 %	0,0 %	11,1%	40,0%	30,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	100,0%	100,0%	88,9%	60,0%	70,0%
Homme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,0%	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	100,0%	100,0%	100,0%	80,0%	100,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	0,0 %	10,0%	15,8%	13,3%	0,0 %
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	100,0%	70,0%	73,7%	80,0%	82,4%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	10,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	0,0 %	10,0%	10,5%	6,7%	17,7%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	16,7%	10,0%	0,0 %	9,1%	28,6%
Médiane	2019	2021	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2016 - 2020	2021-2021	2019-2022	2020 -2023	2021 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	66,7%	90,0%	63,2%	53,3%	82,4%
Médiane	22,3	19,2	23,1	21,9	18,4
q_{25} - q_{75}	20,8 - 23,8	19,2 - 19,2	18,1 - 30,0	19,1 - 31,6	17,8 - 22,4
Maigre (<18.5)	0,0 %	0,0 %	28,6%	14,3%	66,7%
Normal [18.5-25[	100,0%	100,0%	28,6%	57,1%	33,3%
Surpoids [25-30[	0,0 %	0,0 %	14,3%	0,0 %	0,0 %
Obèse (≥ 30)	0,0 %	0,0 %	28,6%	28,6%	0,0 %

Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	33,3%	60,0%	5,3%	20,0%	35,3%
1 - 7 jours	16,7%	10,0%	36,8%	20,0%	17,7%
8 - 15 jours	16,7%	20,0%	31,6%	6,7%	17,7%
16 - 30 jours	33,3%	10,0%	10,5%	33,3%	0,0 %
1 - 3 mois	0,0 %	0,0 %	10,5%	6,7%	11,8%
> 3 mois	0,0 %	0,0 %	5,3%	13,3%	17,7%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,6	4,6	4,6	4,9	5,5
q_{25} - q_{75}	2,2- 6,2	4,0-5,5	4,0- 5,1	2,4- 5,4	4,5- 5,8
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	16,7%	44,4%	44,4%	28,6%	59,3%
3 - 6 mois	50,0%	11,1%	27,8%	35,7%	0,0%
6 - 9 mois	0,0%	11,1%	16,7%	21,4%	.
9 - 12 mois	16,7%	11,1%	0,0%	14,3%	.
> 12 mois	16,7%	22,2%	11,1%	0,0%	.

19.CORESS NORMANDIE

19.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	58	58	87	85	75
Age					
Médiane	36,3	33,7	35,2	35,8	37,1
q_{25} - q_{75}	25,8 - 51,1	26,4 - 42,2	29,6 - 45,5	27,6 - 46,2	29,9 - 47,2
≥ 60 ans	8,6%	3,5%	5,8%	10,6%	2,7%
≥ 75 ans	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	74,1%	62,1%	62,1%	64,7%	73,3%
Femme cis	20,7%	37,9%	35,6%	34,1%	22,7%
Transgenre	5,2%	0,0 %	2,3%	1,2%	4,0%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	58,6%	44,8%	42,5%	37,7%	45,3%
Femme cis France	8,6%	17,2%	4,6%	4,7%	2,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	8,6%	12,1%	9,2%	18,8%	17,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,1%	15,5%	23,0%	25,9%	13,3%
Homme cis Autres pays	6,9%	5,2%	10,3%	8,2%	10,7%
Femme cis Autres pays	0,0 %	5,2%	8,1%	3,5%	6,7%
Autres	5,2%	0,0 %	2,3%	1,2%	4,0%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	79,1%	72,2%	68,5%	58,2%	61,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	11,6%	19,4%	14,8%	29,1%	23,6%
Homme cis Autres pays	9,3%	8,3%	16,7%	12,7%	14,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	41,7%	45,5%	12,9%	13,8%	11,8%
Femme cis Afrique subsaharienne	58,3%	40,9%	64,5%	75,9%	58,8%
Femme cis Autres pays	0,0 %	13,6%	22,6%	10,3%	29,4%
Groupe d'acquisition					
HSH	58,6%	34,5%	43,7%	36,5%	46,7%
UDI	0,0 %	1,7%	0,0 %	2,4%	0,0 %
Hétérosexuel	32,8%	55,2%	47,1%	51,8%	37,3%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,2%	0,0 %
Autre ou inconnu	8,6%	6,9%	8,1%	8,2%	16,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	15,5%	29,3%	8,1%	14,1%	8,0%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	17,2%	20,7%	26,4%	32,9%	21,3%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	1,7%	3,5%	0,0 %	4,0%
Hétérosexuel Autres pays	0,0 %	3,5%	9,2%	4,7%	4,0%
HSH France	46,6%	31,0%	33,3%	25,9%	36,0%

HSH Afrique subsaharienne	1,7%	3,5%	3,5%	8,2%	6,7%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	2,3%	0,0 %	0,0 %
HSH Autre pays	10,3%	0,0 %	4,6%	2,4%	4,0%
Autre France	5,2%	1,7%	5,8%	2,4%	5,3%
Autre Afrique subsaharienne	1,7%	3,5%	2,3%	3,5%	2,7%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	1,7%	0,0 %	0,0 %	1,3%
Autre Autres pays	1,7%	3,5%	1,2%	5,9%	6,7%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	15,8%	18,2%	17,4%	20,4%	21,1%
Médiane	2019	2021	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2019 -2020	2016 -2021	2021 -2022	2021 -2023	2022 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	32,8%	31,0%	32,2%	45,9%	49,3%
Médiane	22,0	24,3	25,3	23,5	23,3
q_{25} - q_{75}	19,7 - 26,3	21,5 - 27,2	20,8 - 27,8	21,1 - 26,8	20,7 - 25,6
Maigre (<18.5)	5,1%	10,0%	8,5%	13,0%	7,9%
Normal [18.5-25[	53,9%	52,5%	40,7%	45,7%	63,2%
Surpoids [25-30[	35,9%	25,0%	37,3%	30,4%	21,1%
Obèse (≥ 30)	5,1%	12,5%	13,6%	10,9%	7,9%
Statut fumeur					
Inconnu	27,6%	50,0%	42,5%	28,2%	30,7%
Non-fumeur	4,8%	6,9%	4,0%	14,8%	1,9%
Ex-fumeur	66,7%	75,9%	68,0%	59,0%	71,2%
Fumeur actuel	28,6%	17,2%	28,0%	26,2%	26,9%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	15,0	10,0	5,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 20,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	17,2%	12,1%	17,2%	11,8%	13,3%
Stade SIDA	8,6%	8,6%	13,8%	12,9%	5,3%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	40,0%	–	–	–	–
Candidose de l'oesophage	20,0%				
Encéphalopathie due au VIH	20,0%	–	–	–	–
Sarcome de Kaposi	20,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose de l'œsophage	–	20,0%	–	–	–
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	20,0%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	20,0%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	20,0%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	20,0%	–	–	–

Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Toxoplasmose cérébrale	–	–	33,3%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	16,7%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	16,7%	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	8,3%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	8,3%	–	–
Pneumopathie bactérienne récurrente	–	–	8,3%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	27,3%	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	27,3%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	18,2%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	18,2%	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	9,1%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Infection herpétique, ulcères chroniques > 1mois ; ou infection herpétique bronchique, pulmonaire ou oesophagienne	–	–	–	–	25,0%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	–	25,0%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	25,0%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	25,0%
Ag HBs +	1,7%	1,7%	3,5%	8,2%	5,3%
Ac VHC +	1,7%	3,5%	1,2%	2,4%	2,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7%
0 jour	32,8%	22,4%	35,6%	27,1%	31,5%
1 - 7 jours	22,4%	20,7%	23,0%	21,2%	26,0%
8 - 15 jours	15,5%	22,4%	16,1%	20,0%	17,8%
16 - 30 jours	12,1%	15,5%	8,1%	11,8%	9,6%
1 - 3 mois	6,9%	12,1%	5,8%	5,9%	4,1%
> 3 mois	10,3%	6,9%	11,5%	14,1%	11,0%
Statut à la prise en charge					
Manquant	1,7%	6,9%	6,9%	3,5%	2,7%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	45,6%	37,0%	32,1%	34,2%	43,8%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	12,3%	9,3%	16,1%	15,9%	24,7%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	15,8%	27,8%	23,5%	18,3%	8,2%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	26,3%	25,9%	28,4%	31,7%	23,3%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	3,5%	10,3%	8,1%	4,7%	5,3%
Médiane	377	310	308	352	416
q_{25} - q_{75}	195 - 579	201 - 505	170 - 481	164 - 543	208 - 622
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	5,2%	15,5%	11,5%	12,9%	6,7%

%	16,4%	10,2%	7,8%	10,8%	11,4%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	1,2%	0,0 %	5,3%
Médiane	4,9	4,4	4,5	4,8	4,8
q_{25} - q_{75}	4,0- 5,5	3,2- 5,7	3,1- 5,5	3,8- 5,4	3,9- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	1,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,3%
Traitement ARV initié	100,0%	100,0%	98,9%	96,5%	94,7%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	5,2%	17,2%	10,5%	1,2%	4,2%
Trithérapie	94,8%	82,8%	89,5%	97,6%	94,4%
Plus de 3 ARVs	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%	1,4%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	41,4%	30,9%	34,3%	34,9%	40,4%
8 - 30 jours	39,7%	47,3%	45,4%	46,7%	46,6%
1 - 3 mois	13,8%	16,4%	15,5%	15,7%	11,6%
> 3 mois	5,2%	5,5%	4,8%	2,7%	1,5%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	67,2%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	8,6%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	6,9%	–	–	–	–
3TC/DTG	5,2%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	1,7%	–	–	–	–
3TC/DOR/DTG	1,7%	–	–	–	–
DRV/ETV/RAL/RTV	1,7%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	1,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	1,7%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	41,4%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	19,0%	–	–	–
3TC/DTG	–	13,8%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	6,9%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	3,5%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,5%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	3,5%	–	–	–
FTC/TDF	–	3,5%	–	–	–

DRV/FTC/TDF	–	1,7%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	1,7%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	30,2%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	23,3%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	11,6%	–	–
3TC/DTG	–	–	9,3%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	7,0%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	7,0%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	3,5%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	3,5%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	2,3%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,2%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	52,4%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	23,2%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	9,8%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	6,1%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	2,4%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	2,4%	–
3TC/DOR/DTG/TDF	–	–	–	1,2%	–
3TC/DTG	–	–	–	1,2%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	63,4%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	18,3%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	4,2%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	2,8%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	2,8%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,4%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	1,4%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	51,7%	62,1%	63,2%	73,3%	76,0%
3 - 6 mois	32,8%	17,8%	23,3%	17,8%	16,5%
6 - 9 mois	10,3%	9,2%	10,4%	1,3%	3,8%
9 - 12 mois	1,7%	5,5%	1,5%	2,9%	3,8%
> 12 mois	3,5%	5,5%	1,5%	4,8%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	84,5%	79,9%	86,5%	91,1%	92,5%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	100,0%	93,1%	90,1%	97,6%	93,5%
[100 000 - 500 000[copies/ml	92,9%	83,3%	90,0%	92,8%	100,0%

≥500 000 copies/ml	46,2%	56,0%	68,8%	75,0%	.

19.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	15	14	23	26	17
Age					
Médiane	47,5	45,0	37,7	43,8	42,4
q_{25} - q_{75}	31,2 - 52,5	37,3 - 55,9	30,5 - 48,1	29,6 - 54,5	36,1 - 48,1
≥ 60 ans	20,0%	14,3%	8,7%	23,1%	11,8%
≥ 75 ans	6,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	66,7%	57,1%	65,2%	53,9%	82,4%
Femme cis	26,7%	42,9%	34,8%	46,2%	17,7%
Transgenre	6,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	66,7%	42,9%	34,8%	38,5%	35,3%
Femme cis France	26,7%	28,6%	13,0%	7,7%	0,0 %
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	14,3%	8,7%	11,5%	29,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	14,3%	13,0%	34,6%	11,8%
Homme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	21,7%	3,9%	17,7%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	8,7%	3,9%	5,9%
Autres	6,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	100,0%	75,0%	53,3%	71,4%	42,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	25,0%	13,3%	21,4%	35,7%
Homme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	33,3%	7,1%	21,4%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	100,0%	66,7%	37,5%	16,7%	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	33,3%	37,5%	75,0%	66,7%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	25,0%	8,3%	33,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	46,7%	21,4%	39,1%	34,6%	41,2%
UDI	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,9%	0,0 %
Hétérosexuel	40,0%	71,4%	47,8%	57,7%	35,3%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	7,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,9%	0,0 %
Autre ou inconnu	13,3%	0,0 %	13,0%	0,0 %	23,5%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	0,0 %	0,0 %	8,3%	28,6%	18,2%
Médiane	2019	2010	2022	2022	2024
q_{25} - q_{75}	2019 - 2019	1999 -2019	2007-2022	2021 - 2023	2022 - 2024
IMC kg/m²					

Manquant	40,0%	42,9%	21,7%	46,2%	41,2%
Médiane	21,7	25,2	22,5	22,5	21,6
q_{25} - q_{75}	19,3 - 26,9	24,5 - 28,5	19,8 - 25,5	19,0 - 26,2	19,4 - 24,7
Maigre (<18.5)	11,1%	0,0 %	16,7%	21,4%	20,0%
Normal [18.5-25[	44,4%	37,5%	55,6%	50,0%	70,0%
Surpoids [25-30[	33,3%	37,5%	16,7%	14,3%	10,0%
Obèse (≥ 30)	11,1%	25,0%	11,1%	14,3%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	33,3%	21,4%	34,8%	15,4%	11,8%
1 - 7 jours	33,3%	14,3%	34,8%	30,8%	23,5%
8 - 15 jours	6,7%	28,6%	17,4%	23,1%	23,5%
16 - 30 jours	20,0%	14,3%	4,4%	3,9%	17,7%
1 - 3 mois	0,0 %	7,1%	8,7%	15,4%	11,8%
> 3 mois	6,7%	14,3%	0,0 %	11,5%	11,8%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	4,4%	0,0 %	5,9%
Médiane	5,7	5,5	5,2	5,2	5,4
q_{25} - q_{75}	5,4- 6,2	4,4- 6,3	4,6- 5,8	4,5- 5,6	4,7- 6,0
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	26,7%	35,7%	60,0%	69,2%	47,0%
3 - 6 mois	46,7%	31,6%	20,0%	17,6%	.
6 - 9 mois	13,3%	16,3%	12,5%	0,0%	.
9 - 12 mois	6,7%	0,0%	7,5%	4,4%	.
> 12 mois	6,7%	16,3%	0,0%	8,8%	.

19.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	2 742	2 782	2 874	2 943	2 900
Age					
Médiane	52,2	52,7	53,1	53,8	54,1
q_{25} - q_{75}	42,4 - 60,4	42,7 - 60,9	43,1 - 61,6	43,6 - 62,4	43,5 - 62,9
≥ 60 ans	25,8%	28,0%	29,8%	32,1%	33,6%
≥ 75 ans	3,1%	3,2%	4,0%	4,5%	4,5%
Genre					
Homme cis	63,1%	63,3%	62,6%	62,8%	62,8%
Femme cis	35,2%	34,9%	35,7%	35,5%	35,5%
Transgenre	1,7%	1,8%	1,7%	1,7%	1,8%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	50,8%	50,4%	49,5%	49,2%	49,2%
Femme cis France	14,7%	14,6%	14,7%	14,4%	14,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	8,2%	8,8%	8,8%	9,2%	9,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	18,8%	18,5%	19,0%	19,0%	19,1%
Homme cis Autres pays	4,1%	4,1%	4,3%	4,4%	4,4%
Femme cis Autres pays	1,6%	1,8%	2,0%	2,1%	2,3%
Autres	1,7%	1,8%	1,7%	1,7%	1,8%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	80,4%	79,7%	79,1%	78,3%	78,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,1%	13,9%	14,1%	14,7%	14,7%
Homme cis Autres pays	6,5%	6,4%	6,9%	7,0%	7,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	41,8%	41,7%	41,3%	40,6%	39,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	53,5%	53,0%	53,2%	53,4%	54,0%
Femme cis Autres pays	4,7%	5,3%	5,6%	5,9%	6,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	37,2%	37,6%	37,7%	37,7%	38,8%
UDI	5,4%	5,3%	4,7%	4,5%	4,4%
Hétérosexuel	51,9%	51,4%	52,0%	51,8%	50,6%
Hémophilie/Transfusion	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%
Périnatal	0,7%	0,7%	0,7%	0,9%	0,9%
Autre ou inconnu	2,7%	2,8%	2,8%	3,0%	3,2%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	24,5%	23,8%	23,7%	23,5%	22,3%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	24,7%	24,8%	25,2%	25,2%	25,0%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	1,1%
Hétérosexuel Autres pays	1,9%	1,9%	2,1%	2,2%	2,2%
HSH France	33,5%	33,7%	33,5%	33,3%	34,0%
HSH Afrique subsaharienne	0,4%	0,6%	0,8%	1,1%	1,3%
HSH Afrique du Nord	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%

HSH Autre pays	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,8%
Autre France	7,7%	7,6%	7,2%	7,0%	7,1%
Autre Afrique subsaharienne	2,0%	1,9%	1,8%	2,0%	2,1%
Autre Afrique du Nord	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Autre Autres pays	0,9%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%
IMC kg/m²					
Manquant	11,9%	10,8%	9,9%	11,0%	17,3%
Médiane	25,7	25,7	25,7	25,8	26,0
q_{25} - q_{75}	22,6 - 29,1	22,8 - 29,3	22,8 - 29,4	22,7 - 29,4	22,9 - 29,7
Maigre (<18.5)	3,7%	3,3%	3,7%	4,2%	4,3%
Normal [18.5-25[	40,8%	40,2%	40,4%	39,9%	37,5%
Surpoids [25-30[	35,3%	35,5%	34,1%	33,8%	34,2%
Obèse (≥ 30)	20,2%	21,0%	21,9%	22,1%	24,0%
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,5%	6,7%	7,0%	7,0%	7,6%
Stade SIDA	17,4%	17,3%	17,6%	17,1%	17,1%
Ag HBs +	4,5%	4,6%	4,4%	4,7%	4,7%
Ac VHC +	9,2%	9,3%	8,5%	8,4%	8,4%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2005	2006	2006	2007
q_{25} - q_{75}	1996 - 2012	1996 - 2013	1997 - 2014	1997 - 2014	1997 - 2015
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1%
≤ 1996	26,2%	25,7%	24,6%	24,0%	23,0%
1997-2004	22,8%	22,4%	21,7%	21,1%	20,6%
2005-2012	26,4%	25,7%	25,0%	24,2%	23,8%
≥ 2013	24,7%	26,2%	28,7%	30,7%	32,6%
Traitement ARV					
En cours	96,9%	97,8%	97,6%	97,8%	98,1%
Antécédents	2,2%	1,8%	1,7%	1,7%	1,3%
Jamais traité	0,8%	0,4%	0,7%	0,5%	0,6%
Type de traitement					
Monothérapie	0,6%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%
Bithérapie	11,1%	16,8%	21,7%	25,9%	29,8%
Trithérapie	85,0%	79,4%	74,8%	71,1%	67,3%
Plus de 3 ARVs	3,3%	3,4%	3,0%	2,5%	2,5%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	14,6%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	12,6%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	12,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	12,0%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	5,1%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	4,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	4,2%	–	–	–	–

3TC/DTG	3,8%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,3%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	2,8%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
FTC/RPV/TAF	–	13,6%	–	–	–
BIC/FTC/TAF	–	12,4%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	11,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	10,4%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,6%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	5,8%	–	–	–
DTG/RPV	–	4,7%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	4,2%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	4,1%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	3,2%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	13,8%	–	–
3TC/DTG	–	–	12,6%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	12,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	9,6%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	8,4%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	6,7%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	6,0%	–	–
DTG/RPV	–	–	5,0%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	3,5%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	3,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	16,9%	–
3TC/DTG	–	–	–	15,7%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	10,8%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	9,0%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	8,5%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	6,1%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	5,7%	–
DTG/RPV	–	–	–	5,1%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	2,9%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	2,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	18,3%
3TC/DTG	–	–	–	–	18,1%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,2%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	9,9%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	8,0%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	5,4%

DTG/RPV	–	–	–	–	5,2%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	4,3%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	3,3%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	2,7%
Charge virale					
Manquant	6,8%	4,8%	7,3%	7,3%	10,5%
< 200 copies/mL	96,4%	96,7%	97,1%	97,4%	97,1%
< 50 copies/mL	93,3%	94,3%	94,9%	95,2%	94,7%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,9%	97,0%	97,5%	97,7%	97,3%
< 50 copies/mL	93,9%	94,6%	95,3%	95,5%	94,9%
CD4(/mm^3)					
Manquant	7,1%	5,6%	9,3%	10,0%	13,7%
Médiane	641	648	654	668	689
q_{25} - q_{75}	458 - 869	467 - 851	472 - 869	488 - 895	493 - 925
CD4>500/mm^3	70,2%	70,6%	71,3%	73,1%	74,2%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	8,2%	6,5%	10,8%	11,0%	15,4%
%	45,1%	46,4%	46,8%	47,4%	48,8%

20.CORESS NOUVELLE-AQUITAINE

20.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	83	37	48	64	52
Age					
Médiane	37,1	39,5	39,7	37,2	43,2
q_{25} - q_{75}	26,5 - 49,8	29,4 - 46,5	33,0 - 46,2	28,8 - 45,5	31,1 - 55,4
≥ 60 ans	10,8%	5,4%	2,1%	12,5%	19,2%
≥ 75 ans	1,2%	0,0 %	0,0 %	1,6%	0,0 %
Genre					
Homme cis	75,9%	62,2%	66,7%	71,9%	67,3%
Femme cis	21,7%	37,8%	33,3%	28,1%	30,8%
Transgenre	2,4%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	55,4%	56,8%	45,8%	48,4%	48,1%
Femme cis France	9,6%	21,6%	6,3%	9,4%	3,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,3%	0,0 %	14,6%	15,6%	13,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,1%	13,5%	16,7%	15,6%	23,1%
Homme cis Autres pays	7,2%	5,4%	6,3%	7,8%	5,8%
Femme cis Autres pays	0,0 %	2,7%	10,4%	3,1%	3,9%
Autres	2,4%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	73,0%	91,3%	68,8%	67,4%	71,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	17,5%	0,0 %	21,9%	21,7%	20,0%
Homme cis Autres pays	9,5%	8,7%	9,4%	10,9%	8,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	44,4%	57,1%	18,8%	33,3%	12,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	55,6%	35,7%	50,0%	55,6%	75,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	7,1%	31,3%	11,1%	12,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	39,8%	48,7%	41,7%	45,3%	36,5%
UDI	0,0 %	5,4%	4,2%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	47,0%	43,2%	54,2%	46,9%	46,2%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9%
Périnatal	0,0 %	2,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	13,3%	0,0 %	0,0 %	7,8%	15,4%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	26,5%	27,0%	20,8%	21,9%	17,3%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	19,3%	13,5%	25,0%	21,9%	25,0%
Hétérosexuel Afrique du Nord	1,2%	0,0 %	4,2%	1,6%	1,9%
Hétérosexuel Autres pays	0,0 %	2,7%	4,2%	1,6%	1,9%
HSH France	32,5%	48,7%	31,3%	34,4%	28,9%

HSH Afrique subsaharienne	3,6%	0,0 %	6,3%	3,1%	3,9%
HSH Afrique du Nord	1,2%	0,0 %	2,1%	3,1%	0,0 %
HSH Autre pays	2,4%	0,0 %	2,1%	4,7%	3,9%
Autre France	8,4%	2,7%	0,0 %	1,6%	5,8%
Autre Afrique subsaharienne	2,4%	0,0 %	0,0 %	6,3%	7,7%
Autre Afrique du Nord	1,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9%
Autre Autres pays	1,2%	5,4%	4,2%	0,0 %	1,9%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	59,3%	0,0 %	13,0%	11,1%	24,0%
Médiane	2019	2020	2021	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2016 - 2020	2011 - 2021	2013 - 2022	2020 - 2023	2022 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	37,4%	56,8%	35,4%	32,8%	32,7%
Médiane	21,8	25,7	25,1	22,1	23,9
q_{25} - q_{75}	19,3 - 24,9	21,2 - 28,4	22,4 - 27,8	20,1 - 24,9	19,8 - 27,3
Maigre (<18.5)	17,3%	18,8%	3,2%	9,3%	8,6%
Normal [18.5-25[	57,7%	25,0%	45,2%	69,8%	60,0%
Surpoids [25-30[	23,1%	37,5%	38,7%	18,6%	14,3%
Obèse (≥ 30)	1,9%	18,8%	12,9%	2,3%	17,1%
Statut fumeur					
Inconnu	83,1%	48,7%	47,9%	39,1%	57,7%
Non-fumeur	35,7%	5,3%	16,0%	28,2%	36,4%
Ex-fumeur	14,3%	52,6%	52,0%	33,3%	22,7%
Fumeur actuel	50,0%	42,1%	32,0%	38,5%	40,9%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	14,3%	0,0 %	25,0%	26,7%	0,0 %
Médiane	10,0	12,5	10,0	5,0	15,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0	5,0 - 8,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	8,4%	2,7%	8,3%	12,5%	3,9%
Stade SIDA	9,6%	13,5%	8,3%	4,7%	11,5%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	37,5%	–	–	–	–
Candidose	12,5%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Infection à mycobactérie, identifiée ou non disséminée ou extrapulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	12,5%	–	–	–	–
Sarcome de Kaposi	12,5%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose	–	20,0%	–	–	–

Candidose de l'œsophage	–	20,0%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	20,0%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	20,0%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	20,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	50,0%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	25,0%	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	25,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	66,7%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	33,3%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	16,7%
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	–	16,7%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	–	16,7%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	16,7%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	16,7%
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	–	16,7%
Ag HBs +	3,6%	2,7%	4,2%	0,0 %	1,9%
Ac VHC +	3,6%	5,4%	6,3%	0,0 %	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	1,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	31,7%	18,9%	12,5%	15,6%	21,2%
1 - 7 jours	31,7%	27,0%	37,5%	31,3%	40,4%
8 - 15 jours	17,1%	18,9%	16,7%	21,9%	23,1%
16 - 30 jours	9,8%	18,9%	18,8%	12,5%	7,7%
1 - 3 mois	1,2%	2,7%	0,0 %	9,4%	3,9%
> 3 mois	8,5%	13,5%	14,6%	9,4%	3,9%
Statut à la prise en charge					
Manquant	3,6%	2,7%	6,3%	9,4%	7,7%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	30,0%	30,6%	44,4%	56,9%	35,4%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	20,0%	25,0%	13,3%	13,8%	18,8%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	18,8%	11,1%	15,6%	12,1%	18,8%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	31,3%	33,3%	26,7%	17,2%	27,1%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	4,8%	5,4%	8,3%	10,9%	7,7%
Médiane	347	359	460	520	360

q_{25} - q_{75}	160 - 520	132 - 542	197 - 681	304 - 654	192 - 569
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	6,0%	5,4%	8,3%	12,5%	9,6%
%	1,3%	14,3%	22,7%	12,5%	6,4%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	2,1%	3,1%	15,4%
Médiane	4,8	4,6	4,7	4,7	5,1
q_{25} - q_{75}	4,0 - 5,8	3,8 - 5,2	1,7 - 5,6	2,7 - 5,5	4,4- 5,5
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	43,4%	16,2%	14,6%	25,0%	13,5%
%	2,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	43,4%	16,2%	14,6%	25,0%	13,5%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	95,2%	97,3%	97,9%	96,9%	98,1%
Type de traitement					
Monothérapie	1,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	8,9%	8,3%	4,3%	4,8%	3,9%
Trithérapie	88,6%	91,7%	95,7%	95,2%	96,1%
Plus de 3 ARVs	1,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	38,9%	48,1%	50,0%	69,4%	62,8%
8 - 30 jours	53,1%	33,6%	37,0%	19,4%	33,3%
1 - 3 mois	5,3%	3,1%	4,4%	5,2%	0,0%
> 3 mois	2,7%	15,3%	8,7%	6,1%	3,9%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	65,8%	–	–	–	–
3TC/DTG	7,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	6,3%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	5,1%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	3,8%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	2,5%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,5%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,5%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF/TDF	1,3%	–	–	–	–
FTC/TDF	1,3%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	77,8%	–	–	–
3TC/DTG	–	8,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	2,8%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,8%	–	–	–
DRV/FTC/TDF	–	2,8%	–	–	–

DTG/FTC/TDF	–	2,8%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	2,8%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	76,6%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	6,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	4,3%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	4,3%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	2,1%	–	–
3TC/DTG/RPV	–	–	2,1%	–	–
DTG/RPV	–	–	2,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	74,2%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	11,3%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	6,5%	–
3TC/DTG	–	–	–	4,8%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	1,6%	–
3TC/DTG/TDF	–	–	–	1,6%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	78,4%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	7,8%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	3,9%
3TC/DTG	–	–	–	–	3,9%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	3,9%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	2,0%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	66,6%	64,8%	65,2%	60,2%	56,2%
3 - 6 mois	26,3%	20,5%	19,6%	21,7%	36,7%
6 - 9 mois	2,9%	11,7%	10,9%	14,1%	7,0%
9 - 12 mois	2,2%	0,0%	4,4%	2,0%	0,0%
> 12 mois	2,2%	2,9%	0,0%	2,0%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	92,8%	85,3%	84,8%	81,9%	93,0%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	97,4%	87,5%	95,0%	91,3%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	93,8%	100,0%	87,5%	64,9%	91,6%
≥500 000 copies/ml	76,6%	100,0%	50,0%	66,7%	.

20.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	25	12	13	10	13
Age					
Médiane	47,6	46,8	45,9	44,6	43,9
q_{25} - q_{75}	37,2 - 58,5	40,1 - 52,8	43,3 - 50,3	36,7 - 58,2	32,3 - 62,2
≥ 60 ans	24,0%	8,3%	7,7%	20,0%	30,8%
≥ 75 ans	4,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	80,0%	33,3%	53,9%	50,0%	53,9%
Femme cis	20,0%	66,7%	46,2%	50,0%	46,2%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	40,0%	25,0%	53,9%	40,0%	30,8%
Femme cis France	12,0%	50,0%	15,4%	10,0%	0,0 %
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	0,0 %	0,0 %	10,0%	7,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	8,0%	8,3%	7,7%	30,0%	46,2%
Homme cis Autres pays	20,0%	8,3%	0,0 %	0,0 %	15,4%
Femme cis Autres pays	0,0 %	8,3%	23,1%	10,0%	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	50,0%	75,0%	100,0%	80,0%	57,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	25,0%	0,0 %	0,0 %	20,0%	14,3%
Homme cis Autres pays	25,0%	25,0%	0,0 %	0,0 %	28,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	60,0%	75,0%	33,3%	20,0%	0,0 %
Femme cis Afrique subsaharienne	40,0%	12,5%	16,7%	60,0%	100,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	12,5%	50,0%	20,0%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	24,0%	16,7%	30,8%	20,0%	30,8%
UDI	0,0 %	0,0 %	7,7%	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel	40,0%	75,0%	61,5%	70,0%	38,5%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,7%
Périnatal	0,0 %	8,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	36,0%	0,0 %	0,0 %	10,0%	23,1%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	58,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	22,2%
Médiane	2019	2016	2022	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2016 - 2020	2003 - 2021	2021 - 2022	2023 - 2023	2021 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	40,0%	66,7%	38,5%	20,0%	46,2%

Médiane	22,1	17,6	22,3	22,4	24,5
q_{25} - q_{75}	18,9 - 25,6	16,3 - 23,1	19,3 - 24,7	19,8 - 26,4	18,5 - 32,1
Maigre (<18.5)	20,0%	50,0%	12,5%	12,5%	14,3%
Normal [18.5-25[	46,7%	25,0%	62,5%	50,0%	42,9%
Surpoids [25-30[	33,3%	25,0%	25,0%	37,5%	0,0 %
Obèse (≥ 30)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	42,9%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	28,0%	25,0%	23,1%	10,0%	38,5%
1 - 7 jours	24,0%	16,7%	38,5%	40,0%	38,5%
8 - 15 jours	24,0%	25,0%	15,4%	30,0%	0,0 %
16 - 30 jours	8,0%	8,3%	15,4%	20,0%	0,0 %
1 - 3 mois	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,7%
> 3 mois	16,0%	25,0%	7,7%	0,0 %	15,4%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,7%
Médiane	5,8	5,1	5,6	5,7	5,4
q_{25} - q_{75}	5,0- 6,3	4,5- 5,5	5,0- 5,8	4,8- 6,1	4,9- 6,2
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	51,1%	62,5%	46,2%	42,9%	50,0%
3 - 6 mois	26,6%	28,1%	23,1%	34,3%	35,0%
6 - 9 mois	5,6%	0,0%	15,4%	11,4%	15,0%
9 - 12 mois	8,4%	0,0%	15,4%	0,0%	0,0%
> 12 mois	8,4%	9,4%	0,0%	11,4%	0,0%

20.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	7 957	7 958	7 909	8 082	7 640
Age					
Médiane	54,7	55,5	56,3	56,9	57,5
q_{25} - q_{75}	46,2 - 61,6	46,9 - 62,4	47,5 - 63,1	47,7 - 63,7	47,9 - 64,5
≥ 60 ans	30,3%	32,7%	35,4%	37,8%	40,9%
≥ 75 ans	4,3%	4,8%	5,4%	5,8%	6,4%
Genre					
Homme cis	71,4%	71,0%	71,5%	71,4%	71,0%
Femme cis	28,5%	28,8%	28,3%	28,4%	28,7%
Transgenre	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	63,2%	63,4%	63,5%	63,0%	62,7%
Femme cis France	17,4%	18,2%	17,8%	17,5%	17,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	3,5%	3,0%	3,2%	3,5%	3,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	9,0%	8,5%	8,6%	8,9%	9,5%
Homme cis Autres pays	4,7%	4,6%	4,8%	4,9%	4,7%
Femme cis Autres pays	2,1%	2,1%	1,9%	2,1%	2,1%
Autres	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	88,5%	89,2%	88,8%	88,3%	88,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	4,9%	4,3%	4,5%	4,9%	4,9%
Homme cis Autres pays	6,6%	6,5%	6,7%	6,8%	6,7%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	61,1%	63,2%	62,8%	61,5%	59,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	31,6%	29,7%	30,4%	31,2%	32,9%
Femme cis Autres pays	7,3%	7,2%	6,7%	7,2%	7,4%
Groupe d'acquisition					
HSH	43,9%	44,6%	45,3%	45,5%	45,5%
UDI	8,4%	8,2%	7,7%	7,4%	7,2%
Hétérosexuel	40,0%	39,7%	39,5%	39,8%	39,8%
Hémophilie/Transfusion	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Périnatal	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%
Autre ou inconnu	5,1%	5,1%	5,1%	4,9%	5,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	26,4%	26,8%	26,6%	26,5%	26,1%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	10,7%	10,0%	10,2%	10,5%	10,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Hétérosexuel Autres pays	2,3%	2,2%	2,1%	2,2%	2,3%
HSH France	41,2%	41,7%	42,1%	42,1%	42,1%
HSH Afrique subsaharienne	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%
HSH Afrique du Nord	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%

HSH Autre pays	1,9%	2,1%	2,2%	2,4%	2,3%
Autre France	13,2%	13,2%	12,7%	12,0%	11,9%
Autre Afrique subsaharienne	1,2%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%
Autre Afrique du Nord	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Autre Autres pays	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
IMC kg/m²					
Manquant	21,1%	13,3%	13,0%	13,0%	14,1%
Médiane	24,6	24,7	24,7	24,8	24,9
q_{25} - q_{75}	21,8 - 27,8	22,0 - 27,9	22,0 - 28,0	22,0 - 28,0	22,1 - 28,2
Maigre (<18.5)	4,9%	4,7%	4,8%	4,8%	4,7%
Normal [18.5-25[	48,6%	48,4%	47,6%	47,8%	46,2%
Surpoids [25-30[	31,6%	32,0%	32,5%	32,0%	32,4%
Obèse (≥ 30)	14,8%	14,9%	15,1%	15,4%	16,8%
Prise en charge au stade de la primo-infection	7,0%	7,2%	7,1%	7,2%	7,0%
Stade SIDA	19,6%	19,4%	19,2%	19,0%	18,9%
Ag HBs +	5,0%	4,9%	4,9%	5,0%	5,0%
Ac VHC +	14,1%	14,0%	13,4%	13,2%	12,9%
Année de diagnostic					
Médiane	2002	2002	2003	2003	2004
q_{25} - q_{75}	1993 - 2010	1993 - 2011	1994 - 2011	1994 - 2012	1994 - 2013
Période de diagnostic					
Manquant	0,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%
≤ 1996	35,0%	34,6%	34,0%	32,8%	31,9%
1997-2004	22,1%	21,6%	21,2%	20,9%	20,4%
2005-2012	23,2%	23,2%	22,7%	22,5%	22,5%
≥ 2013	19,6%	20,6%	22,1%	23,8%	25,2%
Traitement ARV					
En cours	97,9%	98,1%	98,1%	98,1%	97,4%
Antécédents	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	2,4%
Jamais traité	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%
Type de traitement					
Monothérapie	2,1%	1,6%	1,4%	1,0%	0,7%
Bithérapie	18,6%	23,9%	29,3%	31,8%	34,1%
Trithérapie	78,1%	73,4%	68,2%	66,1%	64,0%
Plus de 3 ARVs	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	18,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	15,2%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	12,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	10,4%	–	–	–	–
DTG/RPV	7,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	5,4%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	2,7%	–	–	–	–

FTC/RPV/TDF	2,7%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,3%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,2%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	21,6%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	14,2%	–	–	–
3TC/DTG	–	9,9%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	9,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	8,8%	–	–	–
DTG/RPV	–	8,0%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	3,6%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	2,4%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	1,9%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	23,3%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	12,4%	–	–
3TC/DTG	–	–	11,8%	–	–
DTG/RPV	–	–	8,6%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	7,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	7,2%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	4,7%	–	–
CAB/RPV	–	–	3,3%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	2,1%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,4%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	25,2%	–
3TC/DTG	–	–	–	13,2%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	11,4%	–
DTG/RPV	–	–	–	8,4%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	6,9%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	6,4%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	5,4%	–
CAB/RPV	–	–	–	4,5%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	2,0%	–
EFV/FTC/TDF	–	–	–	1,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	26,4%
3TC/DTG	–	–	–	–	14,8%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,4%
DTG/RPV	–	–	–	–	8,7%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	6,5%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	6,0%

COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	4,9%
CAB/RPV	–	–	–	–	4,8%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,8%
DOR/DTG	–	–	–	–	1,2%
Charge virale					
Manquant	5,6%	3,4%	4,2%	4,8%	6,0%
< 200 copies/mL	97,3%	97,8%	98,0%	98,1%	98,1%
< 50 copies/mL	93,8%	95,0%	94,9%	96,0%	95,1%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,7%	98,2%	98,2%	98,4%	98,2%
< 50 copies/mL	94,3%	95,4%	95,2%	96,4%	95,3%
CD4(/mm^3)					
Manquant	15,7%	15,1%	17,0%	19,0%	20,8%
Médiane	710	714	715	727	737
q_{25} - q_{75}	510 - 948	510 - 945	513 - 947	520 - 967	532 - 978
CD4>500/mm^3	76,0%	75,8%	76,2%	77,6%	78,3%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	17,5%	16,6%	18,2%	20,4%	21,9%
%	46,0%	47,6%	48,3%	49,0%	49,9%

21.CORESS OCCITANIE

21.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	170	158	178	189	165
Age					
Médiane	38,8	39,9	36,8	39,9	38,9
q_{25} - q_{75}	27,4 - 51,8	27,5 - 52,0	29,1 - 49,2	28,9 -52,8	31,2 - 51,0
≥ 60 ans	12,4%	12,7%	9,6%	10,1%	12,7%
≥ 75 ans	0,0 %	1,9%	0,6%	1,1%	1,8%
Genre					
Homme cis	73,5%	75,3%	72,5%	75,1%	72,7%
Femme cis	25,3%	22,8%	27,0%	22,2%	25,5%
Transgenre	1,2%	1,9%	0,6%	2,7%	1,8%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	57,1%	58,2%	43,3%	49,2%	47,3%
Femme cis France	5,9%	7,0%	6,2%	5,3%	9,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,3%	7,6%	12,4%	11,1%	8,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	17,7%	10,8%	15,2%	10,6%	13,9%
Homme cis Autres pays	11,2%	9,5%	16,9%	14,8%	17,0%
Femme cis Autres pays	1,8%	5,1%	5,6%	6,4%	2,4%
Autres	1,2%	1,9%	0,6%	2,7%	1,8%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	77,6%	77,3%	59,7%	65,5%	65,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	7,2%	10,1%	17,1%	14,8%	11,7%
Homme cis Autres pays	15,2%	12,6%	23,3%	19,7%	23,3%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	23,3%	30,6%	22,9%	23,8%	35,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	69,8%	47,2%	56,3%	47,6%	54,8%
Femme cis Autres pays	7,0%	22,2%	20,8%	28,6%	9,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	48,2%	45,6%	34,3%	43,9%	42,4%
UDI	0,6%	0,6%	1,7%	2,1%	1,8%
Hétérosexuel	37,7%	33,5%	34,8%	32,8%	29,7%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%
Périnatal	0,0 %	0,6%	0,6%	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	13,5%	19,0%	28,1%	20,6%	25,5%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	17,7%	13,3%	12,9%	13,8%	16,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	15,9%	12,0%	15,7%	11,6%	9,7%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,6%	3,8%	2,3%	3,2%	1,8%
Hétérosexuel Autres pays	3,5%	4,4%	3,9%	4,2%	1,8%
HSH France	38,2%	38,6%	23,6%	32,8%	29,1%
HSH Afrique subsaharienne	2,9%	1,9%	3,9%	2,1%	2,4%

HSH Afrique du Nord	1,8%	1,9%	1,7%	2,7%	3,0%
HSH Autre pays	5,3%	2,5%	5,1%	5,3%	7,3%
Autre France	7,1%	13,9%	12,9%	9,0%	10,9%
Autre Afrique subsaharienne	4,1%	4,4%	7,9%	9,0%	10,3%
Autre Afrique du Nord	1,2%	1,3%	3,4%	1,6%	0,6%
Autre Autres pays	1,8%	1,9%	6,7%	4,8%	6,7%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	34,9%	18,5%	24,4%	27,4%	23,6%
Médiane	2018	2019	2022	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2013 -2019	2013 -2020	2019 -2022	2015-2023	2022 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	32,9%	37,3%	30,9%	33,3%	44,9%
Médiane	22,5	22,7	23,5	23,7	22,9
q_{25} - q_{75}	20,3 - 25,8	20,3 - 25,8	20,8 - 25,7	20,8 - 25,8	20,8 - 25,4
Maigre (<18.5)	12,3%	10,1%	8,9%	8,7%	3,3%
Normal [18.5-25[	56,1%	55,6%	58,5%	57,9%	65,9%
Surpoids [25-30[	24,6%	25,3%	25,2%	25,4%	23,1%
Obèse (≥ 30)	7,0%	9,1%	7,3%	7,9%	7,7%
Statut fumeur					
Inconnu	37,7%	43,3%	35,3%	44,4%	54,6%
Non-fumeur	7,6%	2,3%	4,5%	20,0%	12,0%
Ex-fumeur	66,0%	64,0%	66,1%	42,9%	53,3%
Fumeur actuel	26,4%	33,7%	29,5%	37,1%	34,7%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	21,2%	13,3%	12,9%	10,6%	9,1%
Stade SIDA	12,4%	15,8%	15,7%	13,8%	7,3%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	28,6%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	19,1%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	14,3%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	9,5%	–	–	–	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	9,5%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	9,5%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	16,0%	–	–	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	16,0%	–	–	–
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	16,0%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	12,0%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	12,0%	–	–	–

Sarcome de Kaposi	–	8,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	35,7%	–	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	14,3%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	10,7%	–	–
Candidose de l'œsophage	–	–	7,1%	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	7,1%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	7,1%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	26,9%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	19,2%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	11,5%	–
Infection mycobactérienne	–	–	–	7,7%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	7,7%	–
Lymphome non Hodgkinien (tumeur de Burkitt, lymphome immunoblastique)	–	–	–	7,7%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	41,7%
Infection mycobactérienne	–	–	–	–	16,7%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	–	16,7%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	16,7%
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	–	8,3%
Ag HBs +	3,5%	1,3%	4,5%	3,7%	3,0%
Ac VHC +	1,8%	1,3%	3,9%	4,2%	3,6%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	22,4%	32,9%	34,3%	27,5%	23,0%
1 - 7 jours	36,5%	27,2%	28,7%	27,0%	34,6%
8 - 15 jours	18,8%	17,7%	12,9%	22,8%	18,2%
16 - 30 jours	8,2%	12,0%	9,6%	10,6%	7,9%
1 - 3 mois	5,3%	3,2%	5,6%	5,3%	6,1%
> 3 mois	8,8%	7,0%	9,0%	6,9%	10,3%
Statut à la prise en charge					
Manquant	4,7%	2,5%	3,9%	4,2%	6,1%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	39,5%	33,8%	36,3%	35,9%	34,8%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	17,9%	19,5%	12,3%	20,4%	20,0%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	12,4%	15,6%	18,7%	16,0%	23,9%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	30,3%	31,2%	32,8%	27,6%	21,3%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	7,7%	4,4%	5,1%	6,4%	6,7%
Médiane	350	355	332	381	372
q_{25} - q_{75}	153 - 508	143 - 510	148 - 531	181 - 531	225 - 542

CD4/CD8 >= 1					
Manquant	28,8%	24,7%	16,9%	25,9%	35,2%
%	7,4%	11,8%	14,2%	11,4%	15,0%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,6%	0,6%	1,7%	2,1%	3,0%
Médiane	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8
q_{25} - q_{75}	4,0- 5,8	4,2- 5,8	4,0- 5,8	3,9- 5,8	3,8- 5,6
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,6%	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	1,2%	1,3%	0,6%	0,5%	0,0 %
Traitement ARV initié	98,8%	99,4%	98,3%	99,5%	94,6%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,6%	0,6%	0,5%	0,0 %
Bithérapie	6,0%	5,7%	7,4%	3,7%	7,7%
Trithérapie	91,1%	93,6%	90,3%	95,7%	91,0%
Plus de 3 ARVs	3,0%	0,0 %	1,7%	0,0 %	0,6%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	49,6%	40,9%	43,7%	58,2%	62,9%
8 - 30 jours	37,8%	46,1%	45,4%	31,5%	31,3%
1 - 3 mois	9,5%	7,8%	9,8%	7,6%	3,9%
> 3 mois	3,2%	5,2%	1,2%	2,7%	2,0%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	61,9%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	10,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,8%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	4,8%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	4,8%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	3,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	3,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	2,4%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	1,2%	–	–	–	–
3TC/ABC/RAL	0,6%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	78,3%	–	–	–
3TC/DTG	–	5,7%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	5,1%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,6%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	2,6%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	2,6%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	0,6%	–	–	–

3TC/DTG/TDF	–	0,6%	–	–	–
ATV/FTC/RTV/TDF	–	0,6%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	0,6%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	70,9%	–	–
3TC/DTG	–	–	6,9%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	5,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	5,1%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	3,4%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	2,3%	–	–
DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	–	–	1,1%	–	–
3TC/DOR/DTG	–	–	0,6%	–	–
3TC/DTG/TDF	–	–	0,6%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	0,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	78,7%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	5,3%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	4,3%	–
3TC/DTG	–	–	–	3,7%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,1%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	1,6%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	1,1%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	1,1%	–
3TC/ABC/RAL	–	–	–	0,5%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	0,5%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	77,4%
3TC/DTG	–	–	–	–	7,7%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	3,2%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,6%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	2,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	1,3%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,3%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	1,3%
3TC/ABC/NVP	–	–	–	–	0,7%
3TC/DOR/DTG	–	–	–	–	0,7%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	49,7%	56,2%	65,1%	60,0%	72,9%
3 - 6 mois	24,1%	23,8%	20,4%	24,9%	15,9%
6 - 9 mois	10,9%	6,4%	5,2%	7,1%	4,5%
9 - 12 mois	9,0%	7,1%	4,1%	2,0%	6,7%
> 12 mois	6,4%	6,4%	5,2%	6,0%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	73,8%	80,0%	85,5%	84,9%	88,8%

Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	86,0%	94,1%	97,3%	95,9%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	75,7%	75,9%	86,1%	91,4%	.
≥500 000 copies/ml	57,0%	62,8%	65,1%	62,9%	66,8%

21.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	49	48	56	50	33
Age					
Médiane	47,6	46,9	42,7	46,5	42,0
q_{25} - q_{75}	35,6 - 56,3	37,7 - 57,1	35,3 - 55,7	37,8 - 53,8	38,0 - 51,0
≥ 60 ans	18,4%	16,7%	19,6%	12,0%	9,1%
≥ 75 ans	0,0 %	6,3%	1,8%	2,0%	3,0%
Genre					
Homme cis	75,5%	68,8%	71,4%	70,0%	75,8%
Femme cis	24,5%	29,2%	28,6%	24,0%	24,2%
Transgenre	0,0 %	2,1%	0,0 %	6,0%	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	61,2%	54,2%	37,5%	46,0%	45,5%
Femme cis France	2,0%	8,3%	8,9%	2,0%	6,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	4,1%	6,3%	17,9%	18,0%	9,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	20,4%	14,6%	17,9%	12,0%	15,2%
Homme cis Autres pays	10,2%	8,3%	16,1%	6,0%	21,2%
Femme cis Autres pays	2,0%	6,3%	1,8%	10,0%	3,0%
Autres	0,0 %	2,1%	0,0 %	6,0%	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	81,1%	78,8%	52,5%	65,7%	60,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,4%	9,1%	25,0%	25,7%	12,0%
Homme cis Autres pays	13,5%	12,1%	22,5%	8,6%	28,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	8,3%	28,6%	31,3%	8,3%	25,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	83,3%	50,0%	62,5%	50,0%	62,5%
Femme cis Autres pays	8,3%	21,4%	6,3%	41,7%	12,5%
Groupe d'acquisition					
HSH	36,7%	31,3%	19,6%	34,0%	27,3%
UDI	0,0 %	0,0 %	1,8%	0,0 %	6,1%
Hétérosexuel	44,9%	41,7%	41,1%	36,0%	33,3%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	2,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	18,4%	25,0%	37,5%	30,0%	33,3%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	33,3%	22,2%	16,7%	32,0%	25,0%
Médiane	2018	2019	2022	2020	2023

q_{25} - q_{75}	2017-2020	2010-2020	2019 -2022	2011 -2023	2020 -2024
IMC kg/m²					
Manquant	26,5%	29,2%	17,9%	40,0%	57,6%
Médiane	21,7	21,8	22,4	22,0	22,7
q_{25} - q_{75}	18,4 - 25,4	18,6 - 24,9	19,4 - 25,3	19,1 - 25,2	20,1 - 23,5
Maigre (<18.5)	25,0%	23,5%	15,2%	16,7%	14,3%
Normal [18.5-25[	50,0%	52,9%	54,4%	53,3%	64,3%
Surpoids [25-30[	16,7%	17,7%	30,4%	23,3%	14,3%
Obèse (≥ 30)	8,3%	5,9%	0,0 %	6,7%	7,1%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	34,7%	39,6%	48,2%	50,0%	24,2%
1 - 7 jours	20,4%	22,9%	32,1%	18,0%	30,3%
8 - 15 jours	16,3%	16,7%	10,7%	14,0%	18,2%
16 - 30 jours	4,1%	10,4%	1,8%	2,0%	9,1%
1 - 3 mois	10,2%	2,1%	1,8%	8,0%	6,1%
> 3 mois	14,3%	8,3%	5,4%	8,0%	12,1%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0%	0,0 %
Médiane	5,6	5,6	5,7	5,7	5,5
q_{25} - q_{75}	5,0 - 6,0	4,7 - 6,2	5,2 - 6,2	5,2 - 6,2	4,7 - 5,7
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	35,4%	39,6%	43,1%	44,3%	50,5%
3 - 6 mois	25,1%	31,3%	29,4%	27,8%	17,7%
6 - 9 mois	15,4%	10,4%	9,2%	17,2%	0,0%
9 - 12 mois	8,8%	10,4%	9,2%	2,7%	31,8%
> 12 mois	15,4%	8,3%	9,2%	8,0%	0,0%

21.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	8 681	8 888	9 042	9 219	9 201
Age					
Médiane	53,7	54,4	55,1	55,7	56,5
q_{25} - q_{75}	45,0 - 60,7	45,3 - 61,4	45,8 - 62,2	46,0 - 62,9	46,6 - 63,7
≥ 60 ans	26,9%	29,6%	32,3%	34,9%	37,8%
≥ 75 ans	3,2%	3,7%	4,2%	4,6%	5,1%
Genre					
Homme cis	71,5%	71,4%	71,0%	71,1%	71,2%
Femme cis	28,0%	28,1%	28,4%	28,3%	28,1%
Transgenre	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	57,7%	57,7%	56,8%	56,5%	56,4%
Femme cis France	14,2%	14,0%	14,1%	13,6%	13,5%

Homme cis Afrique subsaharienne	3,8%	4,0%	4,3%	4,3%	4,5%
Femme cis Afrique subsaharienne	9,9%	10,2%	10,1%	10,5%	10,4%
Homme cis Autres pays	10,1%	9,7%	10,0%	10,3%	10,3%
Femme cis Autres pays	3,9%	3,9%	4,2%	4,2%	4,3%
Autres	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	80,6%	80,8%	79,9%	79,5%	79,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,3%	5,6%	6,0%	6,1%	6,4%
Homme cis Autres pays	14,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	50,8%	49,8%	49,7%	48,2%	48,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	35,3%	36,3%	35,6%	37,0%	36,9%
Femme cis Autres pays	13,9%	14,0%	14,7%	14,8%	15,2%
Groupe d'acquisition					
HSH	45,6%	46,0%	45,5%	45,8%	45,9%
UDI	9,5%	8,8%	8,5%	8,0%	7,7%
Hétérosexuel	36,3%	36,3%	36,1%	36,1%	35,6%
Hémophilie/Transfusion	1,8%	1,7%	1,8%	1,8%	1,7%
Périnatal	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,2%
Autre ou inconnu	5,8%	6,2%	7,1%	7,3%	8,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	20,3%	20,1%	19,8%	19,6%	19,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	10,8%	11,0%	10,9%	11,1%	10,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%
Hétérosexuel Autres pays	3,2%	3,2%	3,4%	3,4%	3,4%
HSH France	39,2%	39,6%	39,0%	38,9%	38,7%
HSH Afrique subsaharienne	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%
HSH Afrique du Nord	1,8%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%
HSH Autre pays	3,8%	3,8%	3,8%	4,0%	4,1%
Autre France	12,7%	12,4%	12,5%	12,0%	12,1%
Autre Afrique subsaharienne	2,1%	2,2%	2,5%	2,7%	2,9%
Autre Afrique du Nord	1,1%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%
Autre Autres pays	2,3%	2,3%	2,6%	2,6%	2,7%
IMC kg/m²					
Manquant	21,0%	18,5%	19,7%	16,7%	18,8%
Médiane	24,2	24,4	24,5	24,6	24,8
q_{25} - q_{75}	21,7 - 27,4	21,8 - 27,5	21,9 - 27,5	22,0 - 27,8	22,1 - 27,8
Maigre (<18.5)	4,8%	5,0%	5,0%	4,9%	4,5%
Normal [18.5-25[	51,9%	51,1%	49,9%	49,0%	47,7%
Surpoids [25-30[	30,7%	30,8%	31,7%	32,3%	33,1%
Obèse (≥ 30)	12,6%	13,1%	13,4%	13,8%	14,7%
Prise en charge au stade de la primo-infection	8,5%	8,9%	8,9%	8,6%	8,8%
Stade SIDA	19,3%	19,1%	19,0%	18,9%	18,6%
Ag HBs +	4,6%	4,6%	4,3%	4,5%	4,5%

Ac VHC +	15,4%	14,7%	14,6%	14,1%	13,8%
Année de diagnostic					
Médiane	2002	2003	2003	2004	2004
q_{25} - q_{75}	1993 -2011	1993 -2012	1994 - 2012	1994 - 2013	1994 - 2013
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
≤ 1996	35,4%	34,0%	33,3%	31,9%	31,6%
1997-2004	20,5%	20,2%	20,1%	19,7%	19,4%
2005-2012	22,6%	22,6%	21,9%	21,7%	21,3%
≥ 2013	21,6%	23,2%	24,7%	26,7%	27,7%
Traitement ARV					
En cours	97,3%	97,5%	97,6%	98,0%	97,9%
Antécédents	2,2%	2,1%	2,0%	1,6%	1,6%
Jamais traité	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%
Type de traitement					
Monothérapie	1,9%	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%
Bithérapie	14,5%	18,3%	22,7%	25,7%	28,4%
Trithérapie	81,0%	77,8%	73,9%	71,1%	68,6%
Plus de 3 ARVs	2,6%	2,3%	1,9%	1,7%	1,5%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
3TC/ABC/DTG	18,8%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	14,9%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	14,6%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	10,4%	–	–	–	–
3TC/DTG	5,6%	–	–	–	–
DTG/RPV	3,6%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,8%	–	–	–	–
EFV/FTC/TDF	2,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/NVP	2,1%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	1,9%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	18,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	17,3%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	14,6%	–	–	–
3TC/DTG	–	9,6%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	8,2%	–	–	–
DTG/RPV	–	4,0%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,3%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	2,0%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,0%	–	–	–
3TC/ABC/NVP	–	1,8%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	20,4%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	15,3%	–	–

FTC/RPV/TAF	–	–	13,6%	–	–
3TC/DTG	–	–	12,8%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	6,7%	–	–
DTG/RPV	–	–	4,2%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,8%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,9%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	1,9%	–	–
EFV/FTC/TDF	–	–	1,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	22,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	14,9%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	13,8%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	12,3%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	5,8%	–
DTG/RPV	–	–	–	4,4%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	3,7%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	2,9%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	1,7%	–
3TC/ABC/NVP	–	–	–	1,4%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	23,8%
3TC/DTG	–	–	–	–	17,0%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	12,8%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	11,8%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,3%
DTG/RPV	–	–	–	–	4,3%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	4,3%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	3,7%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,4%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	1,4%
Charge virale					
Manquant	6,5%	5,6%	6,3%	5,9%	7,4%
< 200 copies/mL	96,6%	97,1%	96,9%	97,0%	97,6%
< 50 copies/mL	93,3%	93,6%	93,5%	93,8%	94,6%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,2%	97,4%	97,2%	97,3%	97,8%
< 50 copies/mL	93,9%	94,0%	93,8%	94,2%	94,9%
CD4(/mm^3)					
Manquant	6,3%	5,5%	6,8%	6,6%	9,5%
Médiane	683	679	682	701	703
q_{25} - q_{75}	494 - 896	488 - 898	495 - 901	509 - 923	513 - 929
CD4>500/mm^3	74,2%	73,6%	74,3%	76,0%	76,5%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	26,6%	26,2%	26,2%	27,4%	30,9%

%	47,6%	49,3%	49,3%	49,6%	51,3%

21.4 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	296	323	392	473	500
Age					
Médiane	38,3	38,3	37,3	36,1	36,0
q_{25} - q_{75}	30,6 - 47,9	30,6 - 48,5	29,2 - 46,7	28,9 - 45,5	29,2 - 45,7
≥ 60 ans	3,4%	4,0%	3,6%	3,8%	4,0%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%	0,2%
Genre					
Homme cis	40,5%	41,5%	40,8%	39,1%	39,4%
Femme cis	59,1%	58,2%	58,9%	60,5%	60,2%
Transgenre	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	18,2%	17,7%	15,8%	14,6%	14,4%
Femme cis France	10,5%	9,9%	8,7%	8,3%	6,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	22,0%	23,8%	25,0%	24,5%	25,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	48,7%	48,3%	50,3%	52,2%	53,2%
Homme cis Autres pays	0,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%
Autres	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	45,0%	42,5%	38,8%	37,3%	36,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	54,2%	57,5%	61,3%	62,7%	63,5%
Homme cis Autres pays	0,8%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	17,7%	17,0%	14,7%	13,6%	11,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	82,3%	83,0%	85,3%	86,4%	88,4%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	8,8%	10,2%	9,4%	11,0%	10,4%
UDI	0,3%	0,3%	0,5%	0,4%	0,2%
Hétérosexuel	86,8%	85,5%	86,5%	84,4%	82,2%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%	0,2%
Périnatal	2,7%	2,8%	2,0%	2,1%	3,2%
Autre ou inconnu	1,4%	1,2%	1,5%	1,9%	3,8%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	23,0%	21,7%	20,2%	17,6%	15,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	63,9%	63,8%	66,3%	66,8%	66,4%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH France	5,1%	5,6%	4,1%	5,1%	5,0%
HSH Afrique subsaharienne	3,4%	4,6%	5,4%	5,9%	5,4%
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

HSH Autre pays	0,3%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre France	1,0%	0,6%	0,5%	0,4%	0,6%
Autre Afrique subsaharienne	3,4%	3,7%	3,6%	4,2%	6,6%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2%
IMC kg/m²					
Manquant	55,7%	50,8%	15,1%	12,1%	29,2%
Médiane	25,3	25,7	26,1	25,8	26,1
q_{25} - q_{75}	22,1 - 30,1	22,6 - 30,4	22,0 - 30,5	22,2 - 30,4	22,2 - 30,7
Maigre (<18.5)	6,1%	5,0%	6,0%	5,3%	5,7%
Normal [18.5-25[	42,0%	42,1%	36,3%	40,6%	38,1%
Surpoids [25-30[	26,7%	27,7%	30,0%	27,6%	29,7%
Obèse (≥ 30)	25,2%	25,2%	27,6%	26,4%	26,6%
Prise en charge au stade de la primo-infection	0,7%	1,2%	2,0%	1,9%	1,6%
Stade SIDA	11,8%	11,8%	13,0%	12,5%	13,0%
Ag HBs +	2,7%	2,8%	3,8%	4,0%	3,8%
Ac VHC +	0,3%	0,6%	0,5%	0,4%	0,6%
Année de diagnostic					
Médiane	2015	2016	2018	2019	2020
q_{25} - q_{75}	2011 - 2018	2011 -2019	2013 -2021	2014-2022	2015 -2023
Période de diagnostic					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
≤ 1996	2,7%	2,5%	2,3%	2,1%	1,6%
1997-2004	8,5%	6,5%	5,4%	4,2%	4,0%
2005-2012	21,6%	19,8%	17,1%	13,5%	12,4%
≥ 2013	67,2%	71,2%	75,3%	80,1%	82,0%
Traitement ARV					
En cours	94,3%	96,9%	95,4%	97,0%	96,0%
Antécédents	3,0%	2,2%	2,6%	1,9%	2,0%
Jamais traité	2,7%	0,9%	2,0%	1,1%	2,0%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	0,7%	0,0 %	1,9%	2,8%	3,3%
Trithérapie	97,9%	98,7%	97,3%	96,7%	96,3%
Plus de 3 ARVs	1,4%	1,3%	0,8%	0,4%	0,4%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
COBI/EVG/FTC/TAF	33,0%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	25,5%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	22,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	5,4%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	4,3%	–	–	–	–
ATV/FTC/RTV/TDF	1,8%	–	–	–	–

EFV/FTC/TDF	1,4%	–	–	–	–
DRV/FTC/TDF	1,1%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	0,7%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	0,7%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	39,9%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	24,6%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	20,1%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	5,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	4,8%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	1,3%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	1,0%	–	–	–
EFV/FTC/TDF	–	0,6%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	0,6%	–	–	–
3TC/ABC/AZT/DTG	–	0,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	52,4%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	20,1%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	15,5%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	3,5%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,9%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	2,4%	–	–
3TC/DTG	–	–	1,3%	–	–
DRV/DTG/RTV	–	–	0,5%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	0,5%	–	–
3TC/ABC/AZT/DTG	–	–	0,3%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	64,9%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	17,0%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	7,4%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	5,2%	–
3TC/DTG	–	–	–	1,7%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	0,9%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	0,9%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	0,7%	–
3TC/BIC/DOR/FTC/TAF/TDF	–	–	–	0,2%	–
3TC/DOR/DRV/RTV/TDF	–	–	–	0,2%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	64,6%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	14,0%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	8,8%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	6,5%
3TC/DTG	–	–	–	–	2,3%

DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	1,0%
FTC/RAL/TDF	–	–	–	–	0,6%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	0,4%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	0,4%
FTC/TDF	–	–	–	–	0,4%
Charge virale					
Manquant	2,0%	1,2%	2,3%	1,5%	2,2%
< 200 copies/mL	89,0%	90,0%	86,4%	89,7%	89,2%
< 50 copies/mL	80,3%	82,1%	81,5%	86,1%	85,9%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	90,5%	90,3%	87,5%	89,9%	89,8%
< 50 copies/mL	81,3%	82,5%	82,3%	86,3%	86,8%
CD4(/mm^3)					
Manquant	2,0%	9,0%	5,6%	3,4%	4,0%
Médiane	654	575	540	611	603
q_{25} - q_{75}	464 - 876	391 - 771	391 - 746	399 - 787	396 - 829
CD4>500/mm^3	71,4%	58,8%	57,6%	64,3%	61,9%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	2,7%	9,6%	5,9%	3,6%	4,2%
%	39,9%	41,8%	37,4%	37,5%	40,3%

22.CORESS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

22.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	179	163	177	218	175
Age					
Médiane	38,0	37,9	39,4	35,3	40,3
q_{25} - q_{75}	30,1 - 48,1	29,9 - 51,2	29,8 - 52,4	27,9 - 47,3	30,7 - 50,5
≥ 60 ans	8,4%	13,5%	13,6%	8,3%	9,7%
≥ 75 ans	1,7%	1,2%	0,6%	0,0 %	1,7%
Genre					
Homme cis	72,6%	76,7%	78,5%	65,1%	75,4%
Femme cis	26,3%	22,1%	20,3%	33,0%	23,4%
Transgenre	1,1%	1,2%	1,1%	1,8%	1,1%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	44,7%	49,1%	46,3%	39,5%	42,3%
Femme cis France	11,2%	4,3%	9,6%	9,2%	10,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	7,8%	9,2%	11,3%	9,2%	8,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	10,1%	12,3%	7,9%	16,5%	8,6%
Homme cis Autres pays	20,1%	18,4%	20,9%	16,5%	24,6%
Femme cis Autres pays	5,0%	5,5%	2,8%	7,3%	4,0%
Autres	1,1%	1,2%	1,1%	1,8%	1,1%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	61,5%	64,0%	59,0%	60,6%	56,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	10,8%	12,0%	14,4%	14,1%	11,4%
Homme cis Autres pays	27,7%	24,0%	26,6%	25,4%	32,6%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	42,6%	19,4%	47,2%	27,8%	46,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	38,3%	55,6%	38,9%	50,0%	36,6%
Femme cis Autres pays	19,2%	25,0%	13,9%	22,2%	17,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	44,7%	48,5%	49,2%	39,0%	38,3%
UDI	3,4%	0,6%	1,7%	2,3%	3,4%
Hétérosexuel	36,9%	41,1%	40,1%	43,6%	43,4%
Hémophilie/Transfusion	1,1%	0,0 %	0,6%	0,5%	0,6%
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6%
Autre ou inconnu	14,0%	9,8%	8,5%	14,7%	13,7%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	14,0%	14,7%	18,1%	15,1%	23,4%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	12,9%	17,2%	13,6%	18,4%	10,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	4,5%	3,7%	2,3%	2,8%	4,6%
Hétérosexuel Autres pays	5,6%	5,5%	6,2%	7,3%	4,6%
HSH France	30,7%	33,7%	31,6%	26,2%	21,7%

HSH Afrique subsaharienne	1,7%	1,8%	4,0%	2,3%	1,7%
HSH Afrique du Nord	2,8%	4,3%	1,7%	2,8%	2,3%
HSH Autre pays	9,5%	8,6%	11,9%	7,8%	12,6%
Autre France	11,2%	4,9%	6,2%	7,8%	9,1%
Autre Afrique subsaharienne	3,4%	2,5%	1,7%	5,1%	4,6%
Autre Afrique du Nord	1,1%	0,0 %	0,6%	1,8%	0,0 %
Autre Autres pays	2,8%	3,1%	2,3%	2,8%	4,6%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	35,4%	39,5%	29,5%	23,4%	26,3%
Médiane	2019	2020	2021	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2016 - 2020	2014 - 2021	2018 - 2022	2021 -2023	2019 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	49,2%	51,5%	58,8%	49,5%	56,6%
Médiane	22,5	24,4	22,9	21,9	23,2
q_{25} - q_{75}	20,4 - 25,6	21,3 - 26,6	20,3 - 25,2	19,7 - 25,2	20,1 - 26,5
Maigre (<18.5)	12,1%	6,3%	11,0%	14,6%	13,2%
Normal [18.5-25[	62,6%	57,0%	60,3%	60,0%	54,0%
Surpoids [25-30[	22,0%	25,3%	20,6%	16,4%	21,1%
Obèse (≥ 30)	3,3%	11,4%	8,2%	9,1%	11,8%
Statut fumeur					
Inconnu	49,7%	49,1%	50,9%	55,5%	58,9%
Non-fumeur	15,7%	16,9%	16,1%	20,6%	15,3%
Ex-fumeur	37,1%	48,2%	39,1%	40,2%	36,1%
Fumeur actuel	47,2%	34,9%	44,8%	39,2%	48,6%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	2,4%	13,8%	2,6%	13,2%	5,7%
Médiane	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	14,5%	11,0%	9,6%	10,1%	8,0%
Stade SIDA	12,3%	12,3%	13,0%	12,4%	12,6%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	31,8%	–	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	18,2%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	9,1%	–	–	–	–
Toxoplasmose cérébrale	9,1%	–	–	–	–
Candidose	4,6%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	4,6%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Candidose	–	15,0%	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	15,0%	–	–	–
Candidose de l'œsophage	–	10,0%	–	–	–

Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	10,0%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	10,0%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	10,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	43,5%	–	–
Encéphalopathie due au VIH	–	–	8,7%	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	8,7%	–	–
Sarcome de Kaposi	–	–	8,7%	–	–
Candidose	–	–	4,4%	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	4,4%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	25,9%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	14,8%	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	–	–	–	14,8%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	–	11,1%	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	7,4%	–
Infections multiples	–	–	–	7,4%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	22,7%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	13,6%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	9,1%
Cryptosporidiose intestinale > 1 mois	–	–	–	–	9,1%
Leuco-encéphalopathie multifocale progressive	–	–	–	–	9,1%
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	–	–	–	4,6%
Ag HBs +	2,8%	1,8%	1,1%	3,7%	0,0 %
Ac VHC +	7,8%	2,5%	4,0%	2,8%	5,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	1,1%	0,0 %	0,6%	0,9%	4,0%
0 jour	19,8%	23,3%	23,9%	20,4%	23,2%
1 - 7 jours	27,1%	26,4%	30,1%	36,6%	36,3%
8 - 15 jours	19,2%	15,3%	17,6%	19,0%	19,6%
16 - 30 jours	10,2%	9,8%	9,1%	8,3%	7,7%
1 - 3 mois	8,5%	14,7%	8,5%	4,6%	3,6%
> 3 mois	15,3%	10,4%	10,8%	11,1%	9,5%
Statut à la prise en charge					
Manquant	11,2%	7,4%	7,9%	7,8%	10,3%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	37,7%	38,4%	36,2%	31,3%	35,0%

350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	13,2%	15,2%	16,0%	15,4%	19,1%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	17,6%	19,2%	17,8%	23,4%	16,6%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	31,5%	27,2%	30,1%	29,9%	29,3%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	11,7%	11,0%	11,3%	8,7%	10,9%
Médiane	338	358	374	294	370
q_{25} - q_{75}	140 - 532	189 - 560	195 - 600	167 - 506	189 - 592
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	15,6%	14,1%	18,1%	13,8%	16,6%
%	13,3%	10,0%	11,7%	10,6%	9,6%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	5,6%	2,5%	0,6%	3,2%	2,3%
Médiane	5,0	4,5	4,9	4,8	4,9
q_{25} - q_{75}	3,6- 5,6	3,5- 5,2	3,9- 5,6	3,7- 5,5	3,6- 5,7
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	8,4%	15,3%	9,0%	6,4%	6,9%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5%	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	8,4%	15,3%	9,0%	6,9%	6,9%
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0%	0,0 %
Traitement ARV initié	95,5%	97,6%	98,3%	99,5%	94,9%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	9,9%	9,4%	6,9%	4,2%	4,2%
Trithérapie	88,3%	86,2%	91,4%	93,1%	92,8%
Plus de 3 ARVs	1,2%	3,8%	1,7%	2,3%	1,8%
Inconnu	0,6%	0,6%	0,0 %	0,5%	1,2%
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	58,4%	65,1%	66,9%	64,3%	56,7%
8 - 30 jours	27,1%	25,4%	21,0%	23,5%	31,1%
1 - 3 mois	6,6%	9,6%	4,2%	10,8%	8,6%
> 3 mois	7,8%	0,0%	7,8%	1,4%	3,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	57,1%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	10,6%	–	–	–	–
3TC/DTG	9,4%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	8,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	4,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,9%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	1,2%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	1,2%	–	–	–	–

3TC/ABC/ATV/RTV	0,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/RAL	0,6%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	60,1%	–	–	–
3TC/DTG	–	9,5%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	9,5%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	4,4%	–	–	–
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	–	3,2%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	1,9%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	1,9%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	1,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	76,4%	–	–
3TC/DTG	–	–	6,3%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	4,0%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,9%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	1,7%	–	–
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	–	–	1,7%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	1,7%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,7%	–	–
3TC/ATV/RTV/TDF	–	–	0,6%	–	–
3TC/DOR/DTG	–	–	0,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	76,9%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	4,6%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	4,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	3,2%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,8%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,3%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	0,9%	–
BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	–	–	–	0,9%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	0,9%	–
3TC/ABC/AZT/COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	0,5%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	75,6%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	6,1%
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	–	4,9%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,3%
3TC/DTG	–	–	–	–	3,1%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	0,6%
AZT/T20	–	–	–	–	0,6%

BIC/DRV/FTC/RTV/TAF	–	–	–	–	0,6%
DRV/FTC/RAL/RTV/T20/TDF	–	–	–	–	0,6%
DTG/FTC/T20/TDF	–	–	–	–	0,6%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	54,6%	58,1%	62,1%	59,8%	55,2%
3 - 6 mois	22,5%	22,6%	18,9%	20,0%	25,5%
6 - 9 mois	9,5%	9,3%	7,3%	10,3%	15,5%
9 - 12 mois	4,7%	3,3%	5,0%	3,5%	3,8%
> 12 mois	8,8%	6,7%	6,7%	6,4%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	77,0%	80,7%	81,0%	79,7%	80,7%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	84,3%	94,1%	88,2%	89,6%	87,8%
[100 000 - 500 000[copies/ml	75,7%	68,8%	86,0%	75,1%	85,7%
≥500 000 copies/ml	58,8%	56,0%	61,1%	58,3%	68,0%

22.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	50	41	49	60	46
Age					
Médiane	45,8	41,9	44,2	42,6	43,8
q_{25} - q_{75}	35,1 - 55,3	32,4 - 51,6	31,9 - 54,7	31,2 - 50,1	34,5 - 51,7
≥ 60 ans	14,0%	7,3%	20,4%	8,3%	13,0%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2%
Genre					
Homme cis	62,0%	68,3%	79,6%	66,7%	73,9%
Femme cis	38,0%	31,7%	20,4%	33,3%	23,9%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	36,0%	31,7%	55,1%	36,7%	43,5%
Femme cis France	16,0%	4,9%	10,2%	11,7%	13,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	12,0%	17,1%	14,3%	15,0%	13,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,0%	26,8%	6,1%	13,3%	6,5%
Homme cis Autres pays	14,0%	19,5%	10,2%	15,0%	17,4%
Femme cis Autres pays	10,0%	0,0 %	4,1%	8,3%	4,4%
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	58,1%	46,4%	69,2%	55,0%	58,8%
Homme cis Afrique subsaharienne	19,4%	25,0%	18,0%	22,5%	17,7%
Homme cis Autres pays	22,6%	28,6%	12,8%	22,5%	23,5%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	42,1%	15,4%	50,0%	35,0%	54,6%

Femme cis Afrique subsaharienne	31,6%	84,6%	30,0%	40,0%	27,3%
Femme cis Autres pays	26,3%	0,0 %	20,0%	25,0%	18,2%
Groupe d'acquisition					
HSH	18,0%	29,3%	38,8%	25,0%	32,6%
UDI	6,0%	0,0 %	0,0 %	5,0%	2,2%
Hétérosexuel	46,0%	53,7%	51,0%	50,0%	45,7%
Hémophilie/Transfusion	2,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	28,0%	17,1%	10,2%	20,0%	19,6%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	50,0%	34,6%	17,7%	41,9%	26,3%
Médiane	2019	2020	2021	2023	2024
q_{25} - q_{75}	2014 - 2020	2016 - 2021	2017 - 2022	2021 - 2023	2023 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	36,0%	58,5%	53,1%	46,7%	71,7%
Médiane	21,9	21,3	20,6	21,2	21,2
q_{25} - q_{75}	18,2 - 24,4	20,3 - 23,9	19,4 - 23,9	17,6 - 25,5	18,8 - 25,2
Maigre (<18.5)	25,0%	11,8%	17,4%	28,1%	7,7%
Normal [18.5-25[	56,3%	82,4%	65,2%	43,8%	61,5%
Surpoids [25-30[	15,6%	5,9%	13,0%	18,8%	23,1%
Obèse (≥ 30)	3,1%	0,0 %	4,4%	9,4%	7,7%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,4%
0 jour	32,0%	26,8%	30,6%	21,7%	27,3%
1 - 7 jours	22,0%	29,3%	22,5%	26,7%	34,1%
8 - 15 jours	18,0%	7,3%	12,2%	16,7%	18,2%
16 - 30 jours	6,0%	7,3%	16,3%	13,3%	9,1%
1 - 3 mois	8,0%	24,4%	6,1%	5,0%	2,3%
> 3 mois	14,0%	4,9%	12,2%	16,7%	9,1%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	4,0%	0,0 %	0,0 %	5,0%	0,0 %
Médiane	5,5	5,0	5,1	5,2	5,5
q_{25} - q_{75}	4,8- 5,9	3,5- 6,0	4,4- 5,7	4,5- 5,7	4,3- 5,8
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	43,2%	34,9%	43,8%	44,5%	32,6%
3 - 6 mois	22,7%	36,4%	28,0%	24,9%	28,3%
6 - 9 mois	13,6%	18,2%	6,5%	13,4%	24,4%
9 - 12 mois	11,4%	5,2%	13,0%	4,9%	14,6%
> 12 mois	9,1%	5,2%	8,7%	12,3%	0,0%

22.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	9 170	9 431	9 438	9 741	9 647
Age					
Médiane	55,1	55,9	56,6	57,2	57,9
q_{25} - q_{75}	47,6 - 60,9	47,9 - 61,7	48,1 - 62,4	47,9 - 63,1	48,2 - 63,8
≥ 60 ans	28,0%	31,1%	33,8%	36,7%	40,4%
≥ 75 ans	3,3%	3,9%	4,6%	5,0%	5,6%
Genre					
Homme cis	69,3%	69,8%	69,7%	70,1%	70,2%
Femme cis	30,2%	29,7%	29,7%	29,4%	29,2%
Transgenre	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	55,3%	55,5%	54,7%	54,8%	54,1%
Femme cis France	20,2%	19,7%	19,3%	18,8%	18,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	3,5%	3,6%	3,9%	4,0%	4,1%
Femme cis Afrique subsaharienne	5,6%	5,6%	5,8%	6,1%	6,2%
Homme cis Autres pays	10,5%	10,7%	11,2%	11,3%	11,9%
Femme cis Autres pays	4,4%	4,4%	4,6%	4,5%	4,5%
Autres	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	79,8%	79,4%	78,4%	78,2%	77,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	5,1%	5,2%	5,5%	5,7%	5,9%
Homme cis Autres pays	15,1%	15,4%	16,1%	16,1%	17,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	66,9%	66,4%	65,0%	64,0%	63,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	18,4%	18,9%	19,4%	20,8%	21,0%
Femme cis Autres pays	14,7%	14,7%	15,6%	15,2%	15,3%
Groupe d'acquisition					
HSH	38,0%	39,0%	39,5%	39,9%	40,3%
UDI	16,1%	15,3%	14,6%	14,3%	13,7%
Hétérosexuel	38,0%	37,4%	37,3%	36,8%	36,8%
Hémophilie/Transfusion	1,9%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Périnatal	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%
Autre ou inconnu	5,1%	5,5%	5,8%	6,2%	6,3%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	24,7%	24,2%	23,6%	23,3%	22,9%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	7,1%	7,2%	7,3%	7,5%	7,6%
Hétérosexuel Afrique du Nord	3,2%	3,0%	3,1%	2,9%	3,0%
Hétérosexuel Autres pays	3,0%	3,0%	3,4%	3,2%	3,3%
HSH France	31,5%	32,0%	32,1%	32,3%	32,1%
HSH Afrique subsaharienne	0,8%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%
HSH Afrique du Nord	1,9%	2,0%	2,0%	1,9%	2,0%

HSH Autre pays	3,8%	4,0%	4,3%	4,5%	5,0%
Autre France	19,6%	19,1%	18,5%	18,2%	17,9%
Autre Afrique subsaharienne	1,1%	1,2%	1,3%	1,5%	1,6%
Autre Afrique du Nord	1,6%	1,7%	1,6%	1,5%	1,5%
Autre Autres pays	1,6%	1,6%	1,9%	2,0%	2,0%
IMC kg/m²					
Manquant	36,1%	32,4%	33,7%	36,2%	38,6%
Médiane	24,1	24,1	24,1	24,2	24,4
q_{25} - q_{75}	21,5 - 27,0	21,6 - 27,0	21,5 - 27,0	21,6 - 27,2	21,7 - 27,3
Maigre (<18.5)	5,5%	5,8%	6,0%	6,0%	5,8%
Normal [18.5-25[	54,1%	53,4%	53,1%	52,3%	50,0%
Surpoids [25-30[	28,9%	29,6%	29,5%	29,7%	31,5%
Obèse (≥ 30)	11,5%	11,2%	11,4%	12,0%	12,7%
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,3%	6,4%	6,3%	6,5%	6,5%
Stade SIDA	18,2%	17,8%	17,7%	17,7%	17,3%
Ag HBs +	4,7%	4,7%	4,4%	4,5%	4,4%
Ac VHC +	22,4%	21,4%	21,1%	20,5%	20,1%
Année de diagnostic					
Médiane	1999	2000	2000	2001	2001
q_{25} - q_{75}	1991 -2010	1991 -2011	1992 - 2012	1992 - 2012	1992 - 2013
Période de diagnostic					
Manquant	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%
≤ 1996	43,0%	42,1%	40,6%	39,5%	38,6%
1997-2004	18,8%	18,6%	18,4%	17,9%	17,7%
2005-2012	18,9%	18,7%	18,7%	18,7%	18,5%
≥ 2013	19,3%	20,6%	22,3%	24,0%	25,3%
Traitement ARV					
En cours	97,7%	97,7%	97,5%	97,5%	97,9%
Antécédents	1,6%	1,9%	2,0%	2,1%	1,7%
Jamais traité	0,6%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%
Type de traitement					
Monothérapie	1,5%	1,4%	1,2%	1,2%	1,2%
Bithérapie	15,1%	22,3%	29,5%	32,3%	35,0%
Trithérapie	80,5%	73,6%	66,9%	64,3%	61,9%
Plus de 3 ARVs	3,0%	2,7%	2,4%	2,2%	1,9%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	19,2%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	16,3%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	12,6%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	6,2%	–	–	–	–
DTG/RPV	5,9%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,3%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,9%	–	–	–	–

DTG/FTC/TDF	2,9%	–	–	–	–
FTC/RPV/TDF	2,7%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	2,7%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	22,0%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	14,9%	–	–	–
3TC/DTG	–	11,3%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	10,5%	–	–	–
DTG/RPV	–	6,5%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	4,8%	–	–	–
FTC/RPV/TDF	–	2,4%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	2,2%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	2,2%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	2,1%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	23,8%	–	–
3TC/DTG	–	–	14,6%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	12,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	8,4%	–	–
DTG/RPV	–	–	6,4%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	4,3%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	3,5%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	2,9%	–	–
FTC/RPV/TDF	–	–	1,9%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	1,7%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	26,5%	–
3TC/DTG	–	–	–	16,5%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	11,1%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	7,2%	–
DTG/RPV	–	–	–	6,3%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	5,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	3,8%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	2,7%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,9%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	1,6%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	28,6%
3TC/DTG	–	–	–	–	18,0%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	10,4%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	6,6%
DTG/RPV	–	–	–	–	6,5%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	5,8%

3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	4,4%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	2,3%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,6%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	1,3%
Charge virale					
Manquant	11,7%	10,6%	9,2%	9,5%	11,7%
< 200 copies/mL	96,3%	96,7%	97,0%	97,1%	97,2%
< 50 copies/mL	92,8%	93,9%	94,5%	94,2%	94,9%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	96,7%	97,0%	97,4%	97,4%	97,5%
< 50 copies/mL	93,3%	94,2%	94,9%	94,6%	95,2%
CD4(/mm^3)					
Manquant	11,6%	11,2%	9,7%	10,5%	12,6%
Médiane	677	689	680	689	710
q_{25} - q_{75}	486 - 901	493 - 912	483 - 903	494 - 920	506 - 940
CD4>500/mm^3	73,2%	73,9%	72,7%	74,1%	75,6%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	15,6%	16,2%	14,7%	14,7%	14,8%
%	43,6%	45,4%	46,9%	47,0%	48,0%

23.CORESS PAYS DE LA LOIRE

23.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	98	81	80	93	85
Age					
Médiane	40,8	36,4	38,9	37,7	39,0
q_{25} - q_{75}	31,7 - 47,5	28,2 - 46,4	29,5 - 48,5	27,8 - 49,5	31,0 - 48,5
≥ 60 ans	5,1%	8,6%	10,0%	9,7%	9,4%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2%
Genre					
Homme cis	71,4%	66,7%	68,8%	50,5%	58,8%
Femme cis	27,6%	33,3%	30,0%	49,5%	41,2%
Transgenre	1,0%	0,0 %	1,3%	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	41,8%	50,6%	38,8%	28,0%	29,4%
Femme cis France	4,1%	6,2%	3,8%	4,3%	9,4%
Homme cis Afrique subsaharienne	21,4%	8,6%	22,5%	11,8%	24,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	20,4%	27,2%	20,0%	41,9%	31,8%
Homme cis Autres pays	8,2%	7,4%	7,5%	10,8%	4,7%
Femme cis Autres pays	3,1%	0,0 %	6,3%	3,2%	0,0 %
Autres	1,0%	0,0 %	1,3%	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	58,6%	75,9%	56,4%	55,3%	50,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	30,0%	13,0%	32,7%	23,4%	42,0%
Homme cis Autres pays	11,4%	11,1%	10,9%	21,3%	8,0%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	14,8%	18,5%	12,5%	8,7%	22,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	74,1%	81,5%	66,7%	84,8%	77,1%
Femme cis Autres pays	11,1%	0,0 %	20,8%	6,5%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	32,7%	48,2%	32,5%	23,7%	35,3%
UDI	3,1%	0,0 %	2,5%	0,0 %	1,2%
Hétérosexuel	55,1%	44,4%	56,3%	65,6%	47,1%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	1,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	9,2%	6,2%	8,8%	9,7%	16,5%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	13,3%	13,6%	15,0%	14,0%	10,6%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	36,7%	28,4%	33,8%	47,3%	36,5%
Hétérosexuel Afrique du Nord	2,0%	1,2%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	3,1%	1,2%	7,5%	4,3%	0,0 %
HSH France	28,6%	40,7%	23,8%	15,1%	24,7%

HSH Afrique subsaharienne	2,0%	3,7%	3,8%	3,2%	8,2%
HSH Afrique du Nord	1,0%	0,0 %	1,3%	2,2%	0,0 %
HSH Autre pays	1,0%	3,7%	3,8%	3,2%	2,4%
Autre France	5,1%	2,5%	3,8%	3,2%	3,5%
Autre Afrique subsaharienne	3,1%	3,7%	5,0%	3,2%	11,8%
Autre Afrique du Nord	1,0%	0,0 %	0,0 %	1,1%	1,2%
Autre Autres pays	3,1%	1,2%	2,5%	3,2%	1,2%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	5,8%	20,0%	4,4%	11,1%	19,2%
Médiane	2019	2020	2022	2023	2023
q_{25} - q_{75}	2015 -2020	2019 -2021	2020 -2022	2021-2023	2022-2024
IMC kg/m²					
Manquant	44,9%	38,3%	42,5%	21,5%	41,2%
Médiane	23,6	23,4	24,4	24,8	24,4
q_{25} - q_{75}	20,9 - 26,6	19,9 - 26,9	21,2 - 28,8	22,1 - 28,1	22,1 - 28,7
Maigre (<18.5)	5,6%	12,0%	2,2%	8,2%	4,0%
Normal [18.5-25[	59,3%	52,0%	56,5%	43,8%	56,0%
Surpoids [25-30[	25,9%	20,0%	19,6%	28,8%	24,0%
Obèse (≥ 30)	9,3%	16,0%	21,7%	19,2%	16,0%
Statut fumeur					
Inconnu	44,9%	45,7%	57,5%	50,5%	50,6%
Non-fumeur	11,1%	25,0%	20,6%	37,0%	31,0%
Ex-fumeur	61,1%	56,8%	58,8%	50,0%	54,8%
Fumeur actuel	27,8%	18,2%	20,6%	13,0%	14,3%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 5,0	5,0 - 5,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	6,1%	14,8%	3,8%	6,5%	4,7%
Stade SIDA	16,3%	12,4%	6,3%	5,4%	8,2%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	18,8%	–	–	–	–
Candidose de l'œsophage	12,5%	–	–	–	–
Cryptococcose extrapulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Infection mycobactérienne	12,5%	–	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	12,5%	–	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	6,3%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	40,0%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	20,0%	–	–	–
Autres maladies infectieuses et parasitaires	–	10,0%	–	–	–
Candidose	–	10,0%	–	–	–

Candidose de l'œsophage	–	10,0%	–	–	–
Syndrome cachectique inaugural du sida	–	10,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	40,0%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	20,0%	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	–	20,0%	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	20,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	40,0%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	20,0%	–
Infection à Mycobacterium Avium ou Kansasii, disséminée ou extrapulmonaire	–	–	–	20,0%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	20,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	42,9%
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	–	28,6%
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	14,3%
Infection à Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonaire	–	–	–	–	14,3%
Ag HBs +	5,1%	3,7%	6,3%	7,5%	4,7%
Ac VHC +	4,1%	2,5%	3,8%	0,0 %	1,2%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	2,0%	0,0 %	0,0 %	1,1%	1,2%
0 jour	17,7%	14,8%	13,8%	13,0%	21,4%
1 - 7 jours	30,2%	34,6%	27,5%	31,5%	26,2%
8 - 15 jours	24,0%	18,5%	20,0%	25,0%	27,4%
16 - 30 jours	14,6%	14,8%	16,3%	13,0%	7,1%
1 - 3 mois	6,3%	9,9%	8,8%	5,4%	8,3%
> 3 mois	7,3%	7,4%	13,8%	12,0%	9,5%
Statut à la prise en charge					
Manquant	5,1%	3,7%	6,3%	7,5%	7,1%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	24,7%	34,6%	29,3%	26,7%	32,9%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	20,4%	11,5%	20,0%	18,6%	16,5%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	17,2%	20,5%	20,0%	26,7%	15,2%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	37,6%	33,3%	30,7%	27,9%	35,4%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	5,1%	4,9%	7,5%	8,6%	8,2%
Médiane	283	324	340	324	334
q_{25} - q_{75}	103 - 471	148 - 503	147 - 506	167 - 482	162 - 511
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	6,1%	7,4%	11,3%	10,8%	10,6%

%	8,7%	9,3%	9,9%	8,4%	13,2%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	2,0%	0,0 %	1,3%	1,1%	7,1%
Médiane	5,0	5,1	4,7	4,8	4,7
q_{25} - q_{75}	4,2 - 5,6	3,9 - 5,8	2,7 - 5,7	3,5 - 5,8	3,2 - 5,3
Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	2,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Traitement ARV initié	99,0%	97,5%	96,3%	100,0%	95,3%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	8,3%	7,6%	7,8%	9,7%	4,9%
Trithérapie	88,7%	92,4%	89,6%	90,3%	93,8%
Plus de 3 ARVs	3,1%	0,0 %	2,6%	0,0 %	1,2%
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	30,3%	25,8%	49,2%	53,3%	52,7%
8 - 30 jours	53,9%	58,6%	39,1%	37,8%	42,2%
1 - 3 mois	13,7%	7,8%	10,4%	7,8%	.
> 3 mois	2,1%	7,8%	1,3%	1,1%	.
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	50,5%	–	–	–	–
FTC/RAL/TDF	11,3%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	10,3%	–	–	–	–
DTG/FTC/TDF	8,3%	–	–	–	–
3TC/DTG	6,2%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	4,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/RAL	2,1%	–	–	–	–
FTC/TDF	2,1%	–	–	–	–
BIC/DOR/FTC/TAF	1,0%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	1,0%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	65,8%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	11,4%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,6%	–	–	–
DTG/FTC/TDF	–	5,1%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	5,1%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	1,3%	–	–	–
3TC/DTG/TDF	–	1,3%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	1,3%	–	–	–

FTC/RPV/TDF	–	1,3%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	64,9%	–	–
DTG/FTC/TDF	–	–	9,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	7,8%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	6,5%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	2,6%	–	–
3TC/ABC/AZT/DTG	–	–	1,3%	–	–
3TC/ABC/DRV/RTV	–	–	1,3%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	1,3%	–	–
DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	–	–	1,3%	–	–
FTC/RAL/TDF	–	–	1,3%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	76,3%	–
3TC/DTG	–	–	–	9,7%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	6,5%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	2,2%	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	–	2,2%	–
FTC/RAL/TDF	–	–	–	2,2%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,1%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	80,3%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	9,9%
3TC/DTG	–	–	–	–	4,9%
3TC/ABC/RAL	–	–	–	–	1,2%
BIC/DTG/FTC/TAF	–	–	–	–	1,2%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	1,2%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,2%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	60,9%	61,6%	63,1%	67,5%	77,5%
3 - 6 mois	22,4%	15,9%	15,0%	18,2%	22,5%
6 - 9 mois	3,6%	9,3%	12,5%	7,1%	0,0%
9 - 12 mois	7,1%	5,3%	4,7%	3,6%	0,0%
> 12 mois	6,0%	7,9%	4,7%	3,6%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	83,4%	77,5%	78,1%	85,7%	100,0%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	94,1%	93,6%	92,0%	97,6%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	90,2%	87,5%	93,3%	.	100,0%
≥500 000 copies/ml	65,4%	51,1%	52,9%	64,0%	100,0%

23.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	35	26	23	24	28
Age					
Médiane	44,3	40,5	43,2	41,3	40,5
q_{25} - q_{75}	38,1 - 47,2	33,5 - 53,9	31,4 - 60,0	33,4 - 55,3	34,7 - 51,0
≥ 60 ans	8,6%	11,5%	26,1%	8,3%	17,9%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,6%
Genre					
Homme cis	68,6%	65,4%	73,9%	54,2%	50,0%
Femme cis	31,4%	34,6%	26,1%	45,8%	50,0%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	37,1%	46,2%	30,4%	25,0%	21,4%
Femme cis France	5,7%	7,7%	0,0 %	4,2%	17,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	3,9%	34,8%	20,8%	28,6%
Femme cis Afrique subsaharienne	22,9%	26,9%	21,7%	33,3%	32,1%
Homme cis Autres pays	11,4%	15,4%	8,7%	8,3%	0,0 %
Femme cis Autres pays	2,9%	0,0 %	4,4%	8,3%	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	54,2%	70,6%	41,2%	46,2%	42,9%
Homme cis Afrique subsaharienne	29,2%	5,9%	47,1%	38,5%	57,1%
Homme cis Autres pays	16,7%	23,5%	11,8%	15,4%	0,0 %
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	18,2%	22,2%	0,0 %	9,1%	35,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	72,7%	77,8%	83,3%	72,7%	64,3%
Femme cis Autres pays	9,1%	0,0 %	16,7%	18,2%	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	17,1%	38,5%	21,7%	16,7%	25,0%
UDI	0,0 %	0,0 %	4,4%	0,0 %	3,6%
Hétérosexuel	74,3%	50,0%	65,2%	75,0%	50,0%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,2%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	3,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	8,6%	7,7%	8,7%	4,2%	21,4%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	5,0%	16,7%	0,0 %	5,9%	41,2%
Médiane	2019	2021	2021	2022	2023
q_{25} - q_{75}	2014-2020	2019-2021	2014 -2022	2022 -2023	2018 -2023
IMC kg/m²					
Manquant	57,1%	42,3%	39,1%	20,8%	53,6%
Médiane	23,3	22,5	24,2	24,6	23,0

q_{25} - q_{75}	19,5 - 28,1	19,9 - 26,1	21,8 - 27,4	19,1 - 27,8	22,1 - 28,7
Maigre (<18.5)	6,7%	13,3%	7,1%	10,5%	0,0 %
Normal [18.5-25[	46,7%	53,3%	50,0%	52,6%	69,2%
Surpoids [25-30[	33,3%	20,0%	21,4%	26,3%	15,4%
Obèse (≥ 30)	13,3%	13,3%	21,4%	10,5%	15,4%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	31,4%	26,9%	8,7%	4,2%	28,6%
1 - 7 jours	22,9%	34,6%	21,7%	29,2%	25,0%
8 - 15 jours	20,0%	19,2%	17,4%	33,3%	28,6%
16 - 30 jours	11,4%	15,4%	13,0%	8,3%	3,6%
1 - 3 mois	8,6%	0,0 %	21,7%	8,3%	3,6%
> 3 mois	5,7%	3,9%	17,4%	16,7%	10,7%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	4,4%	0,0 %	7,1%
Médiane	5,3	5,8	5,6	5,8	5,1
q_{25} - q_{75}	5,0- 5,8	5,1- 6,4	4,6- 6,2	4,8- 6,1	4,1- 5,7
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	50,5%	52,6%	60,8%	54,2%	69,7%
3 - 6 mois	31,7%	17,2%	19,6%	25,0%	30,3%
6 - 9 mois	3,6%	12,9%	13,1%	8,3%	0,0%
9 - 12 mois	7,2%	12,9%	0,0%	4,2%	0,0%
> 12 mois	7,2%	4,3%	6,5%	8,3%	0,0%

23.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Effectif	4 662	4 755	4 844	4 939	4 985
Age					
Médiane	51,3	51,8	52,7	53,4	54,0
q_{25} - q_{75}	41,6 - 58,9	42,1 - 59,7	42,8 - 60,5	43,3 - 61,3	43,8 - 62,0
≥ 60 ans	22,3%	23,9%	26,3%	28,8%	31,4%
≥ 75 ans	2,6%	2,9%	3,3%	3,8%	4,5%
Genre					
Homme cis	64,7%	64,7%	64,6%	63,9%	63,7%
Femme cis	34,8%	34,9%	34,9%	35,6%	35,9%
Transgenre	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	51,5%	51,5%	50,9%	50,0%	49,7%
Femme cis France	14,0%	13,8%	13,5%	13,4%	13,2%
Homme cis Afrique subsaharienne	8,9%	8,6%	8,9%	8,9%	9,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	18,3%	18,5%	18,9%	19,5%	20,1%
Homme cis Autres pays	4,2%	4,5%	4,8%	5,1%	5,0%
Femme cis Autres pays	2,5%	2,6%	2,6%	2,8%	2,6%

Autres	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	79,7%	79,7%	78,7%	78,2%	78,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	13,8%	13,4%	13,8%	13,9%	14,2%
Homme cis Autres pays	6,5%	7,0%	7,4%	7,9%	7,8%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	40,3%	39,5%	38,5%	37,6%	36,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	52,6%	53,0%	54,0%	54,7%	56,0%
Femme cis Autres pays	7,2%	7,5%	7,5%	7,7%	7,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	40,0%	40,3%	40,2%	39,7%	39,6%
UDI	5,0%	4,9%	4,8%	4,8%	4,4%
Hétérosexuel	49,3%	49,3%	49,1%	49,3%	49,5%
Hémophilie/Transfusion	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,7%
Périnatal	1,4%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
Autre ou inconnu	2,4%	2,1%	2,5%	2,7%	3,2%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	22,0%	21,8%	21,2%	20,9%	20,9%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	23,8%	23,9%	24,2%	24,6%	24,9%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Hétérosexuel Autres pays	2,9%	3,0%	3,1%	3,3%	3,0%
HSH France	36,5%	36,7%	36,3%	35,5%	35,5%
HSH Afrique subsaharienne	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%
HSH Afrique du Nord	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%
HSH Autre pays	1,8%	1,9%	2,2%	2,3%	2,4%
Autre France	7,3%	7,1%	7,0%	7,1%	6,6%
Autre Afrique subsaharienne	2,3%	2,1%	2,3%	2,5%	2,9%
Autre Afrique du Nord	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%
Autre Autres pays	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,0%
IMC kg/m²					
Manquant	12,4%	9,9%	12,2%	9,1%	9,1%
Médiane	25,0	25,1	25,1	25,3	25,5
q_{25} - q_{75}	22,2 - 28,4	22,4 - 28,5	22,3 - 28,6	22,4 - 28,7	22,6 - 29,2
Maigre (<18.5)	3,7%	3,5%	3,8%	3,7%	3,7%
Normal [18.5-25[	46,6%	45,7%	44,9%	44,4%	42,1%
Surpoids [25-30[	32,4%	33,0%	32,5%	32,7%	33,2%
Obèse (≥ 30)	17,4%	17,8%	18,8%	19,2%	21,0%
Prise en charge au stade de la primo-infection	5,9%	6,2%	6,2%	6,1%	6,2%
Stade SIDA	15,8%	15,7%	15,2%	14,8%	14,9%
Ag HBs +	5,8%	5,6%	5,6%	5,8%	5,8%
Ac VHC +	9,9%	9,6%	9,5%	9,7%	9,1%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2006	2006	2006	2007

q_{25} - q_{75}	1996 - 2013	1997 - 2013	1997 - 2014	1997 - 2014	1998 - 2014
Période de diagnostic					
Manquant	0,1%	0,0 %	0,0%	0,1%	0,2%
≤ 1996	25,2%	24,8%	24,5%	24,2%	23,3%
1997-2004	21,7%	21,1%	20,6%	20,2%	19,7%
2005-2012	27,3%	27,0%	26,3%	25,7%	25,9%
≥ 2013	25,8%	27,2%	28,7%	29,9%	31,2%
Traitement ARV					
En cours	97,8%	97,7%	97,9%	97,9%	98,2%
Antécédents	1,7%	1,8%	1,8%	1,7%	1,5%
Jamais traité	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%
Type de traitement					
Monothérapie	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%
Bithérapie	17,2%	21,4%	27,3%	30,5%	33,0%
Trithérapie	80,1%	76,4%	70,6%	67,7%	65,2%
Plus de 3 ARVs	1,8%	1,6%	1,4%	1,2%	1,1%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
FTC/RPV/TAF	19,5%	–	–	–	–
BIC/FTC/TAF	15,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	11,1%	–	–	–	–
3TC/DTG	7,2%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	6,1%	–	–	–	–
3TC/ABC/NVP	5,3%	–	–	–	–
DTG/RPV	4,7%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	3,9%	–	–	–	–
3TC/DOR/TDF	3,4%	–	–	–	–
FTC/NVP/TDF	2,9%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	18,7%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	18,1%	–	–	–
3TC/DTG	–	11,6%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	9,5%	–	–	–
3TC/ABC/NVP	–	4,9%	–	–	–
DTG/RPV	–	4,8%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	4,7%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	4,5%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,0%	–	–	–
FTC/NVP/TDF	–	2,4%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	22,1%	–	–
3TC/DTG	–	–	15,9%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	15,8%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	7,1%	–	–

3TC/DOR/TDF	–	–	5,7%	–	–
DTG/RPV	–	–	4,6%	–	–
3TC/ABC/NVP	–	–	3,9%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	3,0%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	2,6%	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	–	2,1%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	24,3%	–
3TC/DTG	–	–	–	18,4%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	14,7%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	6,9%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	6,0%	–
DTG/RPV	–	–	–	4,3%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	3,9%	–
3TC/ABC/NVP	–	–	–	3,2%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	2,1%	–
FTC/RPV/TDF	–	–	–	1,8%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	26,8%
3TC/DTG	–	–	–	–	20,7%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	13,3%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	6,6%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	5,7%
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	4,7%
DTG/RPV	–	–	–	–	4,0%
3TC/ABC/NVP	–	–	–	–	2,6%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	1,6%
FTC/RPV/TDF	–	–	–	–	1,6%
Charge virale					
Manquant	17,3%	16,9%	20,5%	19,8%	30,9%
< 200 copies/mL	96,9%	97,4%	97,2%	97,4%	96,1%
< 50 copies/mL	94,2%	95,3%	95,0%	95,8%	92,5%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,4%	97,9%	97,6%	97,7%	96,4%
< 50 copies/mL	94,8%	95,8%	95,5%	96,1%	92,8%
CD4(/mm^3)					
Manquant	11,9%	20,2%	12,6%	18,1%	17,3%
Médiane	648	641	662	669	669
q_{25} - q_{75}	461 - 867	467 - 850	479 - 881	482 - 895	489 - 889
CD4>500/mm^3	70,1%	71,1%	72,3%	72,8%	73,4%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	13,7%	21,9%	14,0%	18,8%	17,9%
%	46,1%	50,1%	49,8%	51,3%	50,6%

24.CORESS REUNION

24.1 Nouveaux patients pris en charge (et jamais pris en charge ailleurs antérieurement) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024- Description globale

Nouveaux patients	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	25	29	36	46	55
Age					
Médiane	33,8	29,1	43,0	43,7	38,0
q_{25} - q_{75}	30,4 - 41,8	23,4 - 41,3	34,1 - 53,0	30,7 - 53,2	28,6 - 54,5
≥ 60 ans	12,0%	10,3%	13,9%	19,6%	14,6%
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	2,8%	0,0 %	3,6%
Genre					
Homme cis	68,0%	86,2%	75,0%	58,7%	74,6%
Femme cis	32,0%	10,3%	22,2%	41,3%	25,5%
Transgenre	0,0 %	3,5%	2,8%	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	48,0%	69,0%	69,4%	54,4%	58,2%
Femme cis France	20,0%	10,3%	11,1%	26,1%	5,5%
Homme cis Afrique subsaharienne	20,0%	13,8%	5,6%	4,4%	12,7%
Femme cis Afrique subsaharienne	12,0%	0,0 %	11,1%	15,2%	18,2%
Homme cis Autres pays	0,0 %	3,5%	0,0 %	0,0 %	3,6%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,8%
Autres	0,0 %	3,5%	2,8%	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	70,6%	80,0%	92,6%	92,6%	78,1%
Homme cis Afrique subsaharienne	29,4%	16,0%	7,4%	7,4%	17,1%
Homme cis Autres pays	0,0 %	4,0%	0,0 %	0,0 %	4,9%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	62,5%	100,0%	50,0%	63,2%	21,4%
Femme cis Afrique subsaharienne	37,5%	0,0 %	50,0%	36,8%	71,4%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1%
Groupe d'acquisition					
HSH	40,0%	65,5%	44,4%	17,4%	38,2%
UDI	4,0%	0,0 %	2,8%	2,2%	3,6%
Hétérosexuel	48,0%	34,5%	50,0%	73,9%	54,6%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2%	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2%	0,0 %
Autre ou inconnu	8,0%	0,0 %	2,8%	2,2%	3,6%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	32,0%	31,0%	36,1%	54,4%	21,8%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	16,0%	3,5%	13,9%	19,6%	29,1%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,6%
HSH France	28,0%	51,7%	41,7%	17,4%	38,2%

HSH Afrique subsaharienne	12,0%	10,3%	2,8%	0,0 %	0,0 %
HSH Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HSH Autre pays	0,0 %	3,5%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre France	8,0%	0,0 %	5,6%	8,7%	3,6%
Autre Afrique subsaharienne	4,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,8%
Autre Afrique du Nord	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,8%
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	25,0%	40,0%	83,3%	44,4%	45,0%
Médiane	2017	2018	2022	2018	2023
q_{25} - q_{75}	2010 - 2019	1995 -2021	2022 -2022	2010 - 2021	2002 - 2024
IMC kg/m²					
Manquant	56,0%	41,4%	63,9%	47,8%	56,4%
Médiane	22,8	21,9	22,0	24,4	24,1
q_{25} - q_{75}	20,1 - 24,7	21,2 - 23,1	18,5 - 27,1	22,0 - 28,2	21,1 - 26,3
Maigre (<18.5)	9,1%	0,0 %	30,8%	12,5%	8,3%
Normal [18.5-25[	72,7%	82,4%	30,8%	45,8%	54,2%
Surpoids [25-30[	9,1%	5,9%	23,1%	20,8%	29,2%
Obèse (≥ 30)	9,1%	11,8%	15,4%	20,8%	8,3%
Statut fumeur					
Inconnu	56,0%	55,2%	75,0%	50,0%	65,5%
Non-fumeur	9,1%	7,7%	0,0 %	21,7%	36,8%
Ex-fumeur	45,5%	61,5%	66,7%	39,1%	21,1%
Fumeur actuel	45,5%	30,8%	33,3%	39,1%	42,1%
Nombre de cigarettes/jour chez fumeur actuel					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,0	10,0	5,0	15,0	10,0
q_{25} - q_{75}	5,0 - 15,0	5,0 - 25,0	5,0 - 15,0	5,0 - 15,0	5,0 - 20,0
Prise en charge au stade de la primo-infection	12,0%	6,9%	2,8%	23,9%	20,0%
Stade SIDA	16,0%	13,8%	13,9%	21,7%	7,3%
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2020					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	50,0%	–	–	–	–
Infection à CMV autre que foie, rate ou ganglions	25,0%	–	–	–	–
Pneumopathie bactérienne récurrente	25,0%	–	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2021					
Cryptococcose extrapulmonaire	–	25,0%	–	–	–
Infection à Mycobacterium tuberculosis, pulmonaire	–	25,0%	–	–	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	25,0%	–	–	–
Sarcome de Kaposi	–	25,0%	–	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2022					
Candidose de l'œsophage	–	–	60,0%	–	–

Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	40,0%	–	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2023					
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	40,0%	–
Candidose de l'œsophage	–	–	–	20,0%	–
Leuco-encéphalopathie multifocale progressive	–	–	–	10,0%	–
Maladies multiples classées ailleurs ou sida avéré, sans précision	–	–	–	10,0%	–
Syndrome cachectique inaugural du sida	–	–	–	10,0%	–
Toxoplasmose cérébrale	–	–	–	10,0%	–
Pathologies SIDA les plus fréquentes en 2024					
Candidose de l'œsophage	–	–	–	–	25,0%
Cryptococcose extrapulmonaire	–	–	–	–	25,0%
Pneumonie à pneumocystis jiroveci	–	–	–	–	25,0%
Sarcome de Kaposi	–	–	–	–	25,0%
Ag HBs +	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ac VHC +	16,0%	0,0 %	5,6%	4,4%	5,5%
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	4,0%	0,0 %	2,8%	0,0 %	1,8%
0 jour	20,8%	27,6%	31,4%	26,1%	33,3%
1 - 7 jours	37,5%	31,0%	31,4%	37,0%	31,5%
8 - 15 jours	25,0%	24,1%	8,6%	19,6%	20,4%
16 - 30 jours	8,3%	6,9%	11,4%	4,4%	7,4%
1 - 3 mois	8,3%	6,9%	8,6%	2,2%	3,7%
> 3 mois	0,0 %	3,5%	8,6%	10,9%	3,7%
Statut à la prise en charge					
Manquant	8,0%	0,0 %	11,1%	2,2%	5,5%
CD4 > 500/mm^3 ou primo-infection	39,1%	37,9%	34,4%	51,1%	57,7%
350 ≤ CD4 ≤ 500 sans SIDA ni primo-infection	13,0%	27,6%	12,5%	8,9%	19,2%
200 ≤ CD4 < 350 sans SIDA ni primo-infection	26,1%	13,8%	31,3%	11,1%	11,5%
CD4 < 200/mm^3 ou SIDA et sans primo-infection	21,7%	20,7%	21,9%	28,9%	11,5%
CD4 (/mm^3)					
Manquant	8,0%	0,0 %	13,9%	2,2%	9,1%
Médiane	393	408	347	472	481
q_{25} - q_{75}	202 - 665	324 - 544	222 - 585	186 - 624	365 - 687
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	16,0%	0,0 %	25,0%	4,4%	12,7%
%	14,3%	10,3%	11,1%	13,6%	16,7%
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	8,0%	0,0 %	2,8%	0,0 %	5,5%
Médiane	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4
q_{25} - q_{75}	3,0- 5,6	4,0- 5,5	3,1- 5,2	3,6- 5,3	3,4- 4,9

Antécédent traitement pré-exposition VIH (PrEP)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antécédent traitement post-exposition VIH (TPE)					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,8%
Traitement ARV initié	92,0%	100,0%	94,4%	97,8%	92,7%
Type de traitement					
Monothérapie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bithérapie	0,0 %	6,9%	5,9%	4,4%	3,9%
Trithérapie	100,0%	86,2%	94,1%	95,6%	96,1%
Plus de 3 ARVs	0,0 %	6,9%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Délai entre prise en charge et initiation du traitement ARV					
≤ 7 jours	63,2%	42,9%	62,1%	67,4%	67,9%
8 - 30 jours	27,6%	53,6%	34,7%	21,7%	22,6%
1 - 3 mois	9,2%	3,6%	0,0%	2,2%	1,9%
> 3 mois	0,0%	0,0%	3,2%	8,7%	7,6%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	87,0%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	8,7%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	4,4%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	75,9%	–	–	–
3TC/DTG	–	6,9%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	3,5%	–	–	–
3TC/DOR/DTG/TDF	–	3,5%	–	–	–
BIC/COBI/EVG/FTC/TAF/TDF	–	3,5%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	3,5%	–	–	–
FTC/RAL/TDF	–	3,5%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	91,2%	–	–
3TC/DTG	–	–	5,9%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	2,9%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	95,6%	–
3TC/DTG	–	–	–	4,4%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	92,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	3,9%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	2,0%
DTG/FTC/TDF	–	–	–	–	2,0%
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					

≤ 3 mois	54,6%	64,3%	58,8%	67,6%	70,4%
3 - 6 mois	22,7%	14,3%	35,3%	27,8%	22,2%
6 - 9 mois	22,7%	10,7%	2,9%	0,0%	7,4%
9 - 12 mois	0,0%	3,6%	2,9%	2,3%	0,0%
> 12 mois	0,0%	7,1%	0,0%	2,3%	0,0%
CV < 50 copies/mL à 6 mois après l'initiation du traitement	77,3%	78,6%	94,1%	95,4%	92,6%
Selon CV à l'initiation du traitement					
<100 000 copies/ml	87,5%	77,8%	100,0%	100,0%	100,0%
[100 000 - 500 000[copies/ml	71,4%	100,0%	90,0%	87,5%	100,0%
≥500 000 copies/ml	66,7%	33,3%	66,7%	80,0%	100,0%

24.2 Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé de l'infection VIH (CD4<200/mm3 ou SIDA et sans primo-infection) en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Nouveaux patients pris en charge à un stade avancé	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	5	6	7	13	6
Age					
Médiane	36,3	54,0	51,0	44,2	35,7
q_{25} - q_{75}	35,8 - 57,2	46,9 - 64,2	42,4 - 56,0	39,8 - 53,2	26,3 - 45,5
≥ 60 ans	20,0%	50,0%	0,0 %	23,1%	0,0 %
≥ 75 ans	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre					
Homme cis	100,0%	100,0%	71,4%	38,5%	66,7%
Femme cis	0,0 %	0,0 %	28,6%	61,5%	33,3%
Transgenre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	60,0%	83,3%	71,4%	30,8%	33,3%
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	14,3%	30,8%	16,7%
Homme cis Afrique subsaharienne	40,0%	16,7%	0,0 %	7,7%	33,3%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	14,3%	30,8%	16,7%
Homme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autres	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	60,0%	83,3%	100,0%	80,0%	50,0%
Homme cis Afrique subsaharienne	40,0%	16,7%	0,0 %	20,0%	50,0%
Homme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	0,0 %	0,0 %	50,0%	50,0%	50,0%
Femme cis Afrique subsaharienne	0,0 %	0,0 %	50,0%	50,0%	50,0%
Femme cis Autres pays	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Groupe d'acquisition					
HSH	40,0%	33,3%	42,9%	7,7%	33,3%

UDI	20,0%	0,0 %	14,3%	7,7%	16,7%
Hétérosexuel	40,0%	66,7%	42,9%	84,6%	50,0%
Hémophilie/Transfusion	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Périnatal	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Autre ou inconnu	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Année d'arrivée en France si non originaire de France					
Manquant	50,0%	100,0%	0,0 %	60,0%	0,0 %
Médiane	2010	.	2022	2017	2023
q_{25} - q_{75}	2010 - 2010	. - .	2022 -2022	2010 -2023	2022 - 2023
IMC kg/m²					
Manquant	80,0%	50,0%	85,7%	53,9%	50,0%
Médiane	16,8	21,2	27,1	22,5	24,2
q_{25} - q_{75}	16,8 - 16,8	19,9 - 22,1	27,1 - 27,1	16,2 - 30,0	21,3 - 26,4
Maigre (<18.5)	100,0%	0,0 %	0,0 %	33,3%	0,0 %
Normal [18.5-25[	0,0 %	100,0%	0,0 %	33,3%	66,7%
Surpoids [25-30[	0,0 %	0,0 %	100,0%	16,7%	33,3%
Obèse (≥ 30)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,7%	0,0 %
Délai entre diagnostic et prise en charge					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0 jour	20,0%	16,7%	42,9%	53,9%	50,0%
1 - 7 jours	60,0%	66,7%	14,3%	38,5%	33,3%
8 - 15 jours	20,0%	0,0 %	28,6%	0,0 %	16,7%
16 - 30 jours	0,0 %	16,7%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1 - 3 mois	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
> 3 mois	0,0 %	0,0 %	14,3%	7,7%	0,0 %
Charge virale (log(copies/ml))					
Manquant	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Médiane	5,6	5,6	5,1	5,5	5,0
q_{25} - q_{75}	5,5 - 5,7	5,4 - 5,8	4,7 - 5,3	5,1 - 5,8	3,6 - 5,5
Délai entre initiation des ARV et CV < 50 copies/mL					
≤ 3 mois	50,0%	100,0%	57,1%	69,2%	60,0%
3 - 6 mois	0,0%	0,0%	42,9%	23,1%	20,0%
6 - 9 mois	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%
9 - 12 mois	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%
> 12 mois	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

24.3 Description des patients suivis en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024

Patients suivis	2020	2021	2022	2023	2024
Effectif	1 001	1 007	1 026	1 071	1 103
Age					
Médiane	52,9	53,7	53,9	54,7	54,9
q_{25} - q_{75}	43,9 - 59,2	43,3 - 60,0	43,7 - 60,6	44,1 - 61,4	44,4 - 62,1
≥ 60 ans	22,9%	25,3%	27,1%	29,9%	31,3%
≥ 75 ans	2,7%	2,8%	2,4%	2,8%	3,3%
Genre					
Homme cis	71,6%	71,1%	71,0%	69,4%	70,1%
Femme cis	27,9%	28,3%	28,4%	30,0%	29,3%
Transgenre	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%
Genre et Pays de naissance					
Homme cis France	64,0%	63,0%	63,2%	61,6%	61,4%
Femme cis France	19,9%	20,2%	19,8%	20,6%	19,3%
Homme cis Afrique subsaharienne	6,1%	6,7%	6,2%	6,3%	7,2%
Femme cis Afrique subsaharienne	7,2%	7,4%	7,9%	8,7%	9,4%
Homme cis Autres pays	1,5%	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%
Femme cis Autres pays	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,5%
Autres	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%
Hommes cis - Pays de naissance					
Homme cis France	89,4%	88,6%	89,0%	88,8%	87,6%
Homme cis Afrique subsaharienne	8,5%	9,4%	8,8%	9,0%	10,2%
Homme cis Autres pays	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Femmes cis - Pays de naissance					
Femme cis France	71,3%	71,2%	69,8%	68,9%	65,9%
Femme cis Afrique subsaharienne	25,8%	26,0%	27,8%	29,0%	32,2%
Femme cis Autres pays	2,9%	2,8%	2,4%	2,2%	1,9%
Groupe d'acquisition					
HSH	39,4%	40,0%	40,6%	39,0%	39,9%
UDI	4,3%	4,3%	4,0%	3,7%	3,6%
Hétérosexuel	53,9%	53,6%	53,4%	54,7%	54,1%
Hémophilie/Transfusion	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	0,7%
Périnatal	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%
Autre ou inconnu	1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	1,0%
Groupe d'acquisition et Pays de naissance					
Hétérosexuel France	42,7%	42,1%	41,5%	42,2%	40,0%
Hétérosexuel Afrique subsaharienne	10,3%	10,6%	11,0%	11,7%	13,2%
Hétérosexuel Afrique du Nord	0,1%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hétérosexuel Autres pays	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%
HSH France	35,5%	35,8%	36,7%	35,1%	36,2%
HSH Afrique subsaharienne	2,8%	3,2%	2,8%	2,9%	2,9%
HSH Afrique du Nord	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%

HSH Autre pays	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,5%
Autre France	6,3%	5,9%	5,5%	5,6%	5,2%
Autre Afrique subsaharienne	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%
Autre Afrique du Nord	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Autre Autres pays	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
IMC kg/m²					
Manquant	17,6%	11,4%	13,8%	9,9%	10,2%
Médiane	24,0	24,0	24,1	24,0	24,2
q_{25} - q_{75}	21,6 - 27,2	21,5 - 27,2	21,5 - 27,4	21,6 - 27,2	21,7 - 27,5
Maigre (<18.5)	7,8%	6,7%	6,6%	5,5%	5,6%
Normal [18.5-25[	52,2%	52,4%	52,2%	52,3%	50,7%
Surpoids [25-30[	27,4%	28,8%	28,7%	28,9%	30,3%
Obèse (≥ 30)	12,6%	12,1%	12,6%	13,3%	13,5%
Prise en charge au stade de la primo-infection	4,1%	4,7%	4,4%	5,3%	5,9%
Stade SIDA	22,3%	22,1%	21,0%	21,9%	20,9%
Ag HBs +	4,0%	3,7%	3,2%	3,1%	3,0%
Ac VHC +	7,9%	7,6%	7,4%	7,2%	6,7%
Année de diagnostic					
Médiane	2005	2005	2006	2007	2009
q_{25} - q_{75}	1996 -2013	1997 -2014	1997 - 2015	1997 - 2016	1998 - 2017
Période de diagnostic					
Manquant	0,1%	0,0 %	0,1%	0,1%	0,1%
≤ 1996	25,8%	24,6%	23,8%	22,3%	21,1%
1997-2004	23,5%	22,8%	21,3%	21,0%	19,7%
2005-2012	22,6%	22,4%	22,2%	21,1%	19,9%
≥ 2013	28,1%	30,1%	32,8%	35,5%	39,3%
Traitement ARV					
En cours	97,1%	97,0%	96,9%	96,8%	96,4%
Antécédents	2,4%	2,7%	2,7%	2,2%	2,5%
Jamais traité	0,5%	0,3%	0,4%	0,9%	1,1%
Type de traitement					
Monothérapie	2,2%	1,8%	1,1%	1,2%	0,9%
Bithérapie	9,8%	13,5%	16,2%	18,0%	17,8%
Trithérapie	86,4%	83,6%	81,6%	79,9%	80,9%
Plus de 3 ARVs	1,7%	1,0%	1,1%	0,9%	0,5%
Combinaisons les plus utilisées en 2020					
BIC/FTC/TAF	35,1%	–	–	–	–
FTC/RPV/TAF	20,3%	–	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	16,6%	–	–	–	–
3TC/ABC/DTG	6,7%	–	–	–	–
3TC/DTG	4,1%	–	–	–	–
DTG/RPV	3,8%	–	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	2,0%	–	–	–	–

DRV/RTV	1,9%	–	–	–	–
DRV/DTG/RTV	0,9%	–	–	–	–
COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	0,8%	–	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2021					
BIC/FTC/TAF	–	40,4%	–	–	–
FTC/RPV/TAF	–	18,1%	–	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	12,7%	–	–	–
3TC/DTG	–	7,9%	–	–	–
3TC/ABC/DTG	–	5,6%	–	–	–
DTG/RPV	–	4,1%	–	–	–
DRV/FTC/RTV/TDF	–	1,5%	–	–	–
DRV/RTV	–	1,5%	–	–	–
3TC/DOR/TDF	–	1,1%	–	–	–
DRV/DTG/RTV	–	0,7%	–	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2022					
BIC/FTC/TAF	–	–	49,0%	–	–
FTC/RPV/TAF	–	–	15,6%	–	–
3TC/DTG	–	–	8,8%	–	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	8,7%	–	–
3TC/ABC/DTG	–	–	4,2%	–	–
DTG/RPV	–	–	4,1%	–	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	1,9%	–	–
3TC/DOR/TDF	–	–	0,9%	–	–
DRV/RTV	–	–	0,9%	–	–
COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	–	–	0,6%	–	–
Combinaisons les plus utilisées en 2023					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	51,9%	–
FTC/RPV/TAF	–	–	–	13,5%	–
3TC/DTG	–	–	–	10,2%	–
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	6,5%	–
3TC/ABC/DTG	–	–	–	4,0%	–
DTG/RPV	–	–	–	3,8%	–
CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	2,9%	–
3TC/DOR/TDF	–	–	–	1,1%	–
DRV/RTV	–	–	–	0,7%	–
DTG/FTC/TDF	–	–	–	0,7%	–
Combinaisons les plus utilisées en 2024					
BIC/FTC/TAF	–	–	–	–	57,7%
FTC/RPV/TAF	–	–	–	–	12,2%
3TC/DTG	–	–	–	–	10,6%
COBI/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	4,3%
3TC/ABC/DTG	–	–	–	–	3,6%
DTG/RPV	–	–	–	–	3,3%

CAB_LAINJ/RPV_LAINJ	–	–	–	–	2,8%
3TC/DOR/TDF	–	–	–	–	1,2%
COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	–	–	–	–	0,4%
DOR/DTG	–	–	–	–	0,4%
Charge virale					
Manquant	7,0%	5,0%	8,1%	7,3%	5,6%
< 200 copies/mL	96,4%	96,8%	97,2%	96,5%	95,8%
< 50 copies/mL	93,7%	93,9%	95,0%	94,3%	93,7%
Charge virale chez traités					
< 200 copies/mL	97,4%	97,2%	97,9%	97,1%	96,5%
< 50 copies/mL	94,6%	94,4%	95,7%	95,1%	94,5%
CD4(/mm^3)					
Manquant	8,6%	5,4%	7,9%	6,7%	7,1%
Médiane	702	718	771	801	776
q_{25} - q_{75}	510 - 947	519 - 972	562 - 1024	566 - 1046	544 - 1064
CD4>500/mm^3	76,0%	77,7%	81,2%	81,5%	79,1%
CD4/CD8 >= 1					
Manquant	9,7%	7,0%	12,3%	8,3%	8,4%
%	45,0%	44,3%	45,1%	47,1%	47,0%

LISTE DES CENTRES ET FILE ACTIVE PAR CoReSS ET COREVIH

Hôpitaux participant à la cohorte ANRS CO4 FHDH en 2024 par CoReSS	File active dans le rapport*
ARC ALPIN	
CH Alpes Léman (CHAL)	**492**
CH Annecy Genevois (CHANGE)	**637**
CH Pierre Oudot - Bourgoin Jallieu	**145**
CH de Chambéry	**515**
CH de Thonon les Bains	**105**
CH de Vienne	**41**
CH de Voiron	**26**
Hôpital Albert Michallon - CHRU de Grenoble	**1071**
Hôpital de Sallenches	**60**
AUVERGNE LOIRE	
CH Emile Roux - Le Puy-en-Velay	**86**
CH Henri Mondor - Aurillac	**62**
CH J. Lacarin - Vichy	**143**
CH de Montluçon	**115**
CH de Moulins Yzeure	**55**
CH de Roanne	**57**
Hôpital Gabriel Montpied - CHU de Clermont Ferrand	**971**
Hôpital Nord - CHU de Saint Etienne	**842**
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	
CH P. Bérégovoy - Nevers	**119**
CH W. Morey - Chalon sur Saône	**176**
CH de Sens	**138**
CH les Chanaux - Mâcon	**0**
CHI de la Haute-Saône - Vesoul	**0**
CHRU de Besançon	**419**
Hôpital Nord Franche-Comté - Belfort	**0**
Hôpital du Bocage - CHU de Dijon	**875**
BRETAGNE	
CH de Morlaix	**62**
CH de Pontivy	**50**
CH de Saint Brieuc	**474**
CH de St Malo	**142**
CHBA de Vannes	**442**
CHBS de Lorient	**360**
CHIC de Quimper	**494**
CHRU de Brest	**393**
Hôpital de Pontchaillou - CHRU de Rennes	**1650**
CENTRE VAL DE LOIRE	

CH Agglomération Montargoise	**117**
CH Bourges - Jacques Coeur	**253**
CH de Blois - Vendôme	**216**
CH de Chartres	**329**
CH de Chateauroux	**159**
CH de Dreux	**110**
CH de Vierzon	**32**
Hôpital Bretonneau - CHRU de Tours	**1127**
Hôpital La Source - CHR d'Orléans	**1171**
GRAND EST	
CH de Chaumont	**6**
CH de Mulhouse	**590**
CH de Troyes	**373**
CHI Emile Durkheim - Epinal	**146**
CHR Metz-Thionville	**813**
CHRU de Nancy	**910**
Clinique Courlancy - Reims	**30**
Hôpital Manchester – Charleville-Mézières	**154**
Hôpital Robert Debré - CHRU de Reims	**807**
Hôpitaux Civils - Colmar	**291**
Nouvel Hôpital Civil - CHU de Strasbourg	**1643**
GUADELOUPE	
CH de Basse-Terre - Guadeloupe	**258**
CH de Saint-Martin - Guadeloupe	**457**
CHRU de Pointe-à-Pitre - Guadeloupe	**1262**
GUYANE	
CHG de Cayenne - CMC de Kourou - CH Ouest Guyanais	**2051**
HAUTS DE FRANCE	
CH Gustave Dron - Tourcoing	**2317**
CH Laennec - Creil	**298**
CH de Beauvais	**165**
CH de Compiègne	**245**
CH de Laon	**16**
CH de Lens	**417**
CH de Saint-Quentin	**58**
CH de Soissons	**153**
Hôpital Nord - CHU d'Amiens	**521**
ILE-DE-FRANCE-CENTRE CORBEIL	
Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris	**4277**
Hôpital Saint-Antoine - Paris	**3037**

Hôpital Tenon - Paris	**2253**
CH Sud Est Francilien - Corbeil Essonnes	**1271**
CH d'Arpajon	**137**
CH de Longjumeau	**58**
Centre Médical de Bligny - Briis sous Forges	**129**
ILE-DE-FRANCE-EST	
CH A. Grégoire - Montreuil	**613**
CH M. Jacquet - Melun	**720**
CH R. Ballanger - Aulnay sous Bois	**444**
CH de Coulommiers	**30**
CH de Fontainebleau	**107**
CH de Lagny - Marne la Vallée	**747**
CH de Meaux	**125**
CHI Le Raincy - Montfermeil	**343**
Hôpital Avicenne - Bobigny	**1186**
Hôpital Jean Verdier - Bondy	**420**
Hôpital Lariboisière - Paris	**1732**
Hôpital St-Louis - Paris	**4282**
ILE-DE-FRANCE-NORD-OUEST	
CH André Mignot - Le Chesnay	**590**
CH F. Quesnay - Mantes La Jolie	**350**
CH René Dubos - Pontoise	**763**
CH de Gonesse - Hôpital E. Rain	**527**
CHG Delafontaine - St Denis	**1443**
CHI de Meulan les Mureaux	**125**
CHI de Poissy-St-Germain - site de Poissy	**24**
CHI de Poissy-St-Germain - site de St Germain	**481**
GH Simone Veil - Eaubonne	**385**
Hôpital Ambroise Paré - Boulogne	**574**
Hôpital Antoine Béclère - Clamart	**566**
Hôpital Beaujon - Clichy	**288**
Hôpital Bichat-Claude Bernard - Paris	**5101**
Hôpital Foch - Suresnes	**660**
Hôpital Louis Mourier - Colombes	**1260**
Hôpital Max Fourestier - Nanterre	**81**
Hôpital Raymond Poincaré - Garches	**473**
Hôpital Victor Dupouy - Argenteuil	**659**
Institut Hospitalier Franco-Britannique - Levallois-Perret	**190**
ILE-DE-FRANCE-SUD	
CHI de Créteil	**827**

CHI de Villeneuve Saint Georges	**851**
Hôpital de Bicêtre (Mal Inf Trop) - Le Kremlin-Bicêtre	**1685**
Hôpital Cochin - Paris	**722**
Hôpital Européen Georges Pompidou - Paris	**1621**
Hôpital Henri Mondor - Créteil	**1322**
Hôpital Necker - CMIP Pasteur - Paris	**1028**
Hôtel Dieu - Paris	**2211**
Institut Mutualiste Montsouris - Paris	**52**
LYON VALLEE DU RHONE	
CH d'Ardèche Méridionale - Aubenas	**26**
CH d'Ardèche du Nord - Annonay	**36**
CH de Bourg en Bresse	**215**
CH de Valence	**530**
CVI du Tonkin - Villeurbanne	**85**
GH Portes de Provence - Montélimar	**0**
Hospices Civils de Lyon	**3936**
Hôpital Nord Ouest - Villefranche sur Saône	**155**
Hôpital des armées Desgenettes - Bron	**0**
Medipole Lyon - Villeurbanne	**0**
Virages Santé - Lyon	**238**
MARTINIQUE	
Hôpital Pierre Zobda-Quitman - CHRU de Fort-de-France	**1068**
MAYOTTE	
CH de Mayotte	**500**
NORMANDIE	
CH de Dieppe	**58**
CHI Elbeuf-Louviers/Val de Reuil	**50**
CHI Eure-et-Seine - Vernon	**211**
Hôpital C. Nicolle - CHRU de Rouen	**1364**
Hôpital J. Monod - Montivilliers/Le Havre	**321**
Hôpital de la Côte de Nacre - CHU de Caen	**909**
NOUVELLE AQUITAINE	
CH de Brive	**244**
CH de Niort	**400**
CH de la Rochelle - Ré - Aunis - Rochefort-sur-Mer	**563**
CHU Dupuytren - Limoges	**647**
OCCITANIE	
CH Jacques Puel - Rodez	**241**
CH St Clair - Sète	**109**
CH St-Jean - Perpignan	**1144**

CH d'Albi	**197**
CH d'Alès	**113**
CH de Bigorre - Tarbes	**333**
CH de Bézier	**225**
CH de Cahors	**143**
GHU Caremeau - Nîmes	**1098**
Hôpital Gui de Chauliac - Montpellier	**2087**
Hôpital J. Ducuing - Toulouse	**342**
Hôpital Purpan - CHU de Toulouse	**3233**
REUNION	
CHU Félix Guyon - St-Denis	**702**
CHU Sud Réunion	**404**
PACA	
CH Clavary - Grasse	**192**
CH d'Antibes - Juan-Les-Pins	**241**
CH de la Dracénie - Draguignan	**17**
CHI Bonnet - Fréjus	**297**
Hôpital des Broussailles - Cannes	**489**
Hôpital de l'Archet - CHU de Nice	**2350**
CH Henri Duffaut - Avignon	**626**
CH de Digne les Bains	**89**
CH de Martigues	**169**
CH du pays d'Aix	**636**
CHICAS site de Gap	**126**
CHU Sainte Marguerite - AP-HM - Marseille	**1028**
Hôpital Européen - Marseille	**500**
Hôpital Sainte-Musse - Toulon	**765**
Hôpital St Joseph - Marseille	**360**
IHU AP-HM - Marseille (ex-Conception)	**1877**
PAYS DE LA LOIRE	
CH de Cholet	**121**
CH de Laval	**102**
CH de St Nazaire	**395**
CH du Mans	**654**
CHD de la Roche sur Yon	**547**
CHU d'Angers	**862**
Hôpital de l'Hôtel Dieu - CHRU de Nantes	**2329**

*Les effectifs par CoReSS peuvent être différents de la somme des effectifs des centres par CoReSS en raison des patients suivis dans plusieurs centres d'un même CoReSS la même année.

Hôpitaux participant à la cohorte ANRS CO4 FHDH en 2024 par COREVIH	File active dans le rapport*
ARC ALPIN	
CH Alpes Léman (CHAL)	**492**
CH Annecy Genevois (CHANGE)	**637**
CH Pierre Oudot - Bourgoin Jallieu	**145**
CH de Chambéry	**515**
CH de Thonon les Bains	**105**
CH de Vienne	**41**
CH de Voiron	**26**
Hôpital Albert Michallon - CHRU de Grenoble	**1071**
Hôpital de Sallenches	**60**
AUVERGNE LOIRE	
CH Emile Roux - Le Puy-en-Velay	**86**
CH Henri Mondor - Aurillac	**62**
CH J. Lacarin - Vichy	**143**
CH de Montluçon	**115**
CH de Moulins Yzeure	**55**
CH de Roanne	**57**
Hôpital Gabriel Montpied - CHU de Clermont Ferrand	**971**
Hôpital Nord - CHU de Saint Etienne	**842**
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	
CH P. Bérégovoy - Nevers	**119**
CH W. Morey - Chalon sur Saône	**176**
CH de Sens	**138**
CH les Chanaux - Mâcon	**0**
CHI de la Haute-Saône - Vesoul	**0**
CHRU de Besançon	**419**
Hôpital Nord Franche-Comté - Belfort	**0**
Hôpital du Bocage - CHU de Dijon	**875**
BRETAGNE	
CH de Morlaix	**62**
CH de Pontivy	**50**
CH de Saint Brieuc	**474**
CH de St Malo	**142**
CHBA de Vannes	**442**
CHBS de Lorient	**360**
CHIC de Quimper	**494**
CHRU de Brest	**393**
Hôpital de Pontchaillou - CHRU de Rennes	**1650**
CENTRE VAL DE LOIRE	
CH Agglomération Montargoise	**117**

CH Bourges - Jacques Coeur	**253**
CH de Blois - Vendôme	**216**
CH de Chartres	**329**
CH de Chateauroux	**159**
CH de Dreux	**110**
CH de Vierzon	**32**
Hôpital Bretonneau - CHRU de Tours	**1127**
Hôpital La Source - CHR d'Orléans	**1171**
GRAND EST	
CH de Chaumont	**6**
CH de Mulhouse	**590**
CH de Troyes	**373**
CHI Emile Durkheim - Epinal	**146**
CHR Metz-Thionville	**813**
CHRU de Nancy	**910**
Clinique Courlancy - Reims	**30**
Hôpital Manchester – Charleville-Mézières	**154**
Hôpital Robert Debré - CHRU de Reims	**807**
Hôpitaux Civils - Colmar	**291**
Nouvel Hôpital Civil - CHU de Strasbourg	**1643**
GUADELOUPE	
CH de Basse-Terre - Guadeloupe	**258**
CH de Saint-Martin - Guadeloupe	**457**
CHRU de Pointe-à-Pitre - Guadeloupe	**1262**
GUYANE	
CHG de Cayenne - CMC de Kourou - CH Ouest Guyanais	**2051**
HAUTS DE FRANCE	
CH Gustave Dron - Tourcoing	**2317**
CH Laennec - Creil	**298**
CH de Beauvais	**165**
CH de Compiègne	**245**
CH de Laon	**16**
CH de Lens	**417**
CH de Saint-Quentin	**58**
CH de Soissons	**153**
Hôpital Nord - CHU d'Amiens	**521**
ILE-DE-FRANCE-CENTRE	
Hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris	**4277**
Hôpital Saint-Antoine - Paris	**3036**
Hôpital Tenon - Paris	**2253**

ILE-DE-FRANCE-EST	
CH A. Grégoire - Montreuil	**613**
CH M. Jacquet - Melun	**720**
CH R. Ballanger - Aulnay sous Bois	**444**
CH Sud Est Francilien - Corbeil Essonnes	**1271**
CH d'Arpajon	**137**
CH de Coulommiers	**30**
CH de Fontainebleau	**107**
CH de Lagny - Marne la Vallée	**747**
CH de Longjumeau	**58**
CH de Meaux	**125**
CHI Le Raincy - Montfermeil	**343**
Centre Médical de Bligny - Briis sous Forges	**129**
Hôpital Avicenne - Bobigny	**1186**
Hôpital Jean Verdier - Bondy	**420**
Hôpital Lariboisière - Paris	**1732**
Hôpital St-Louis - Paris	**4282**
ILE-DE-FRANCE-NORD	
CH René Dubos - Pontoise	**763**
CH de Gonesse - Hôpital E. Rain	**527**
CHG Delafontaine - St Denis	**1443**
GH Simone Veil - Eaubonne	**385**
Hôpital Beaujon - Clichy	**288**
Hôpital Bichat-Claude Bernard - Paris	**5101**
ILE-DE-FRANCE-OUEST	
CH André Mignot - Le Chesnay	**590**
CH F. Quesnay - Mantes La Jolie	**350**
CHI de Meulan les Mureaux	**125**
CHI de Poissy-St-Germain - site de Poissy	**24**
CHI de Poissy-St-Germain - site de St Germain	**481**
Hôpital Ambroise Paré - Boulogne	**574**
Hôpital Foch - Suresnes	**660**
Hôpital Louis Mourier - Colombes	**1260**
Hôpital Max Fourestier - Nanterre	**81**
Hôpital Raymond Poincaré - Garches	**473**
Hôpital Victor Dupouy - Argenteuil	**659**
Institut Hospitalier Franco-Britannique - Levallois-Perret	**190**
ILE-DE-FRANCE-SUD	
CHI de Créteil	**827**
CHI de Villeneuve Saint Georges	**851**


Hôpital Antoine Béclère - Clamart	**566**
Hôpital de Bicêtre (Mal Inf Trop) - Le Kremlin-Bicêtre	**1685**
Hôpital Cochin - Paris	**722**
Hôpital Européen Georges Pompidou - Paris	**1621**
Hôpital Henri Mondor - Créteil	**1322**
Hôpital Necker - CMIP Pasteur - Paris	**1028**
Hôtel Dieu - Paris	**2211**
Institut Mutualiste Montsouris - Paris	**52**
LYON VALLEE DU RHONE	
CH d'Ardèche Méridionale - Aubenas	**25**
CH d'Ardèche du Nord - Annonay	**36**
CH de Bourg en Bresse	**215**
CH de Valence	**530**
CVI du Tonkin - Villeurbanne	**85**
GH Portes de Provence - Montélimar	**0**
Hospices Civils de Lyon	**3936**
Hôpital Nord Ouest - Villefranche sur Saône	**155**
Hôpital des armées Desgenettes - Bron	**0**
Medipole Lyon - Villeurbanne	**0**
Virages Santé - Lyon	**238**
MARTINIQUE	
Hôpital Pierre Zobda-Quitman - CHRU de Fort-de-France	**1068**
NORMANDIE	
CH de Dieppe	**58**
CHI Elbeuf-Louviers/Val de Reuil	**50**
CHI Eure-et-Seine - Vernon	**211**
Hôpital C. Nicolle - CHRU de Rouen	**1364**
Hôpital J. Monod - Montivilliers/Le Havre	**321**
Hôpital de la Côte de Nacre - CHU de Caen	**909**
NOUVELLE AQUITAINE	
CH de Brive	**244**
CH de Niort	**400**
CH de la Rochelle - Ré - Aunis - Rochefort-sur-Mer	**563**
CHU Dupuytren - Limoges	**647**
OCCITANIE	
CH Jacques Puel - Rodez	**241**
CH St Clair - Sète	**109**
CH St-Jean - Perpignan	**1144**
CH d'Albi	**197**
CH d'Alès	**113**

CH de Bigorre - Tarbes	**333**
CH de Bézier	**225**
CH de Cahors	**143**
GHU Caremeau - Nîmes	**1098**
Hôpital Gui de Chauliac - Montpellier	**2087**
Hôpital J. Ducuing - Toulouse	**342**
Hôpital Purpan - CHU de Toulouse	**3233**
OCEAN INDIEN	
CH de Mayotte	**500**
CHU Félix Guyon - St-Denis	**702**
CHU Sud Réunion	**404**
PACA-EST	
CH Clavary - Grasse	**192**
CH d'Antibes - Juan-Les-Pins	**241**
CH de la Dracénie - Draguignan	**17**
CHI Bonnet - Fréjus	**297**
Hôpital des Broussailles - Cannes	**489**
Hôpital de l'Archet - CHU de Nice	**2350**
PACA-OUEST	
CH Henri Duffaut - Avignon	**626**
CH de Digne les Bains	**89**
CH de Martigues	**169**
CH du pays d'Aix	**636**
CHICAS site de Gap	**126**
CHU Sainte Marguerite - AP-HM - Marseille	**1028**
Hôpital Européen - Marseille	**500**
Hôpital Sainte-Musse - Toulon	**765**
Hôpital St Joseph - Marseille	**360**
IHU AP-HM - Marseille (ex-Conception)	**1877**
PAYS DE LA LOIRE	
CH de Cholet	**121**
CH de Laval	**102**
CH de St Nazaire	**395**
CH du Mans	**654**
CHD de la Roche sur Yon	**547**
CHU d'Angers	**862**
Hôpital de l'Hôtel Dieu - CHRU de Nantes	**2329**

*Les effectifs par COREVIH peuvent être différents de la somme des effectifs des centres par COREVIH en raison des patients suivis dans plusieurs centres d'un même COREVIH la même année.

Hôpitaux participant à la cohorte ANRS CO3-AquiVIH-NA en 2024	File active dans le rapport
NOUVELLE AQUITAINE	
CHU Pellegrin - Bordeaux	**1308**
Centre Hospitalier d'Arcachon	**76**
Centre Hospitalier d'Agen	**195**
Centre Hospitalier d'Orthez	**44**
Centre Hospitalier de Pau	**336**
Centre Hospitalier d'Angoulème	**391**
Centre Hospitalier de Saintes	**143**
Centre Hospitalier de Jonzac	**15**
CHU de St Jean d'Angély	**20**
CHU de Poitiers	**583**
Centre Hospitalier de Royan	**51**
Hôpital Haut-Lévêque - Pessac	**434**
Centre Hospitalier de Châtellerault	**4**
Hôpital Saint-André - Bordeaux	**1055**
Centre Hospitalier de Périgueux	**238**
Centre Hospitalier de Bayonne	**643**
Centre Hospitalier de Dax	**174**
Centre Hospitalier de Villeneuve-sur-Lot	**2**
Centre Hospitalier de Libourne	**83**
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan	**-**


Répartition des files actives selon les hôpitaux en 2024



ANNEXE

Diagramme de flux : processus de traitement

- File active= Patients ayant au moins un recours l'année considérée
- File active brute ANRS CO4 FHDH = File active sans doublon Données de la cohorte ANRS CO4
- File active ANRS CO4 FHDH = File active après vérification (suppression des patients avec des données incohérentes et des doublons)
- File active rapport = file active après prise en compte des critères d'inclusion du rapport
- File active rapport contient les données de la cohorte ANRS CO3 AQUIVIH-NA et de la cohorte ANRS-CO4 FHDH



Synthèse des traitements de données

	File active brute 2024	File active Base FHDH 2024	File active rapport 2024
France	114 590	110 616	**115 970**
Île-de-France	47 876	46 142	**45 994**
CORESS			
Île-de-France-Centre-Essonne	11 925	11 180	**11 113**
Île-de-France-Est	10 862	10 534	**10 495**
Île-de-France-Nord-Ouest	14 844	14 408	**14 390**
Île-de-France-Sud	10 500	10 229	**10 205**
Arc Alpin	3 143	3 082	**3 078**
Auvergne Loire	2 389	2 319	**2 308**
Bourgogne Franche-Comté	1 792	1 734	**1 726**
Bretagne	4 144	4 034	**4 022**
Centre Val de Loire	3 655	3 546	**3 490**
Grand Est	5 909	5 748	**5 727**
Guadeloupe	2 031	1 973	**1 969**
Guyane	2 165	2 063	**2 051**
Hauts de France	4 324	4 180	**4 160**
Lyon Vallée du Rhône	5 219	5 028	**5 019**
Martinique	1 135	1 081	**1 068**
Mayotte	529	502	**500**
Normandie	2 983	2 908	**2 900**
Nouvelle Aquitaine	1 922	1 852	**7 640****
Occitanie	9 558	9 240	**9 201**
Provence-Alpes-Côte d'Azur	10 120	9 677	**9 647**
Pays de la Loire	5 242	5 010	**4 985**
Réunion	1 169	1 115	**1 103**

* Données : ANRS-CO4 FHDH (110 175) + ANRS-CO3 AQUIVIH-NA (5 795)

** 5 795 ANRS-CO3 AQUIVIH-NA + 1 845 ANRS-CO4 FHDH